PRIMERAS INDICACIONES,

medios curativos ùtiles para el Cólera Morbus mientras se consigue un médico, ò para los lugares donde no lo haya, dar pronto socorro á los atacados.

Luego que el enfermo se vea atacado de fuerte dolor de estómago, bascas ó evacuacion, se colocará el enfermo desnudo en su cama entre dos ó mas frazadas que se habrán calentado bien antes y se le dará cada media hora medio posuelo de la bebida núm. 1. *con dos gotas de láudano de sidenham: si no disminuyen los síntomas y los vómitos predominan á las evacuaciones, se ordenarán las cucharadas del número* 2 *tomando una cada cuarto de hora, y se aplicarán sobre el estómago cuatro ó seis docenas de sanguijuelas, segun la edad, fuerza y constitucion del enfermo. Si la diarrea ecsede á los vómitos, se administrarán inmediatamente las labativas contenidas en la fòrmula núm.* 3. *echando una al paciente cada hora, cuidando que cada una no se componga de mas cantidad que un posuelo de líquido y de que este valla frio, y en este caso se hace uso del mismo número de sanguijuelas, muy cerca del ano por la parte de atras, y de un baño de agua caliente en todo el cuerpo. Se procurará dar á los enfermos cuanta agua fria apetezcan, alternando con limonada ó naranjada hecha en agua de arros, y solo teniendo cuidado de que estas bebidas se den en pequeñas cantidades, es decir á cucharadas y frescas con repeticion, aun cuando las bomiten los enfermos, hasta que calme la sed. Como en esta enfermedad desde el principio hay una gran tendencia al frio de los miembros, se procurará mantener el calor por medio de botellas de agua caliente, ladrillos calientes y sinapismos repartidos en los muslos, pantorrillas y plantas de los pies. Si á pesar de este tratamiento los síntomas aumentan particularmente la frialdad de los miembros, se dará caliente la bebida aromática contenida en el número* 4. *en medios posuelos cada media hora é inmediatamente antes de cada toma seis ú ocho gotas de las contenidas en las recetas número* 5. *en una cucharada de agua fria, y esteriormente se daràn frotaciones secas con un cepillo ò franela caliente tambien y se estarà frotando las piernas y brazos y toda la espalda con la friega contenida en el número* 6. *No hallándose el estómago en estado de digerir ninguna clase de alimento de los enfermos del cólera, no se les darán, de ninguna clase mientras los síntomas presenten alguna gravedad y cuando estos fueren leves podrá tomar medio posuelo de atole, no caliente, cada tres horas.*

FORMULAS.

Núm. 1.—*Arros tostado* 2 *onzas.—Polvos de cuerno de ciervo* 4 *onzas.— Goma Arabiga una cuarta de onza—Agua* 2 *cuartillos.*

Hágase cocimiento y despues de colado endúlcese con onza y media de jarabe de limon, medio posuelo cada media hora y si lo vomita, una cucharada cada cuarto de hora.

Núm. 2.—*Carbonato de sosa una octava parte de onza.—Agua de yerba buena.* 6 *onzas.— Láudano líquido* 24 *gotas.— Jarabe de goma* 1 *onza.*

Mézclese y dèse una cucharada cada cuarto de hora, mezclando otra al tiempo de tomarla de agua fria, con 15 *gotas de sumo de limon.*

Núm. 3.—*Linaza* 2 *onzas.—Almidon una cuarta onza.—Agua* 2 *cuartillos.*

Hágase cocimiento y añádase 40 *gotas de láudano para* 6 *labativas una cada hora.*

Núm. 4.—*Infusion de manzanilla y yerba buena ligera con poco dulce, medio posuelo cada media hora con seis ú ocho gotas de la siguiente*

Núm. 5.—*Espíritu de vino media onza.—Amoniáco líquido media dracma.—Aceite de anis* 2 *gotas —Alcanfor* 9 *granos —Làudano líquido* 2 *escrùpulos.— Mésclese.*

Núm. 6 —*Pimienta de Cayena* 4 *dracmas.—Esencia de yerba buena* 1 *escrúpulo.—Alcanfor* 2 *dracmas.=Tintura de valeriana media onza.=Amoniáco líquido* 2 *dracmas.=Alcol* 8 *onzas. =Se echa todo en un frasco y se deja en digestion por tres dias para frotaciones en los miembros. =Matamoros Marzo* 3 *de* 1849.

Esta receta fué bien recibida en Matamoros.

MONTEREY.—1849.
Reimpreso por F. Molina.—callejon de la Tesorería.

PRIMERAS INDICACIONES,

medios curativos útiles para el Cólera Morbus mien-
tras se consigue un médico, o para los lugares donde
no lo haya, dar pronto socorro á los atacados.

Luego que el enfermo se vea atacado de fuerte dolor de estómago, bascas ó evacuacion, se colocará el enfermo desnudo en su cama entre dos ó mas frazadas que se habrán calentado bien antes y se le dará cada media hora medio posuelo de la bebida núm. 1. con dos gotas de láudano de sidenham: si no disminuyen los síntomas y los dolores predominan ó las evacuaciones, se observarán los cucharadas del número 2. tomando una cada cuarto de hora, y se aplicarán sobre el estómago cuatro ó seis docenas de sanguijuelas, segun la edad, fuerza y constitucion del enfermo. Si la diarrea cesase ó los vómitos, se administrarán inmediatamente las lobativas contenidas en la fórmula núm. 3. echando una al pociente cada hora, cuidando que cada una no se componga de mas cantidad que un posuelo de líquido y de que este sea frio, y en este caso se hace uso del mismo número de sanguijuelas, una cerca del ano por la parte de afuera, y de un baño de agua caliente en todo el cuerpo. Se procurará dar á los enfermos cuanta agua fria apetezcan, alternando con limonada ó mezclada hecha en agua de arroz, y solo teniendo cuidado de que estas bebidas se den en pequeñas cantidades, es decir á cucharadas y de seis en seis con repeticion, aun cuando los tomen los enfermos, hasta que cese la sed. Como en este enfermo predomina el principio frio, hay una gran tendencia al frio de los miembros, se procurará mantener el calor por medio de botellas de agua caliente, ladrillos calientes y empajamos repartidos en los muslos, pantorrillas y plantas de los pies. Si á pesar de este tratamiento los síntomas manifiestan perfectamente la frialdad de los miembros, se dará ultimamente la bebida marcada con el número 4. en medios posuelos cada media hora ó inmediatamente antes de cada toma seis ó ocho gotas de las contenidas en las recetas número 5. en una cucharada de agua fria, y exteriormente se darán fricciones secas con un cepillo ó franela caliente tambien y se calentará frotando las piernas y brazos y todo la espalda con la fuerza contenida en el número 6. Y finalmente el enfermo en estado de convalecencia, una clase de el mezcle de los enfermos del cólera, no se les darán. de ninguna clase nutritivo los síntomas presenten alguna gravedad y cuando estos fuesen leves podrá tomar medio posuelo de miele, no caliente, cada tres horas.

FORMULAS.

Núm. 1 — Agua tostado 2 onzas.— Polvos de cuerno de ciervo 4 onzas.— Goma 1 obliga una cuarta de onza.—Agua 2 cuartillos.

Hágase cocimiento y despues de colado endúlcese con onza y media de jarabe de limon, medio posuelo cada media hora y si lo tomita, una cucharada cada cuarto de hora.

Núm. 2 — Carbonato de sosa una octava parte de onza.—Agua de yerba buena. 6 onzas— Láudano líquido 24 gotas.—Jarabe de coma 1 onza.

Mézclese y dese una cucharada cada cuarto de hora, meselando otra el tiempo de tomarla de agua fria, con 15 gotas de sumo de limon.

Núm. 3 — Linaza 2 onzas.—Alimbon una cuarta onza.—Agua 2 cuartillos.
Hágase cocimiento y redúcase 40 gotas de láudano para 6 lobativas una cada hora.

Núm. 4 — Infusion de manzanilla y yerba buena ligera con poco dulce, medio posuelo cada media hora con seis ó ocho gotas de la siguiente

Núm. 5 — Espíritu de vino media onza.— Amoniaco líquido media dracma.—Aceite de anis 2 gotas —Alcanfor 2 granos — Láudano líquido 2 escrupulos.—Mézclese.

Núm. 6 — Pimienta de Cayena 4 dracmas.— Esencia de yerba buena 1 escrúpulo — Alcanfor 2 dracmas.= Tintura de valeriana media onza.=Amoniaco líquido 2 dracmas =Alcohol 8 onzas. =Se echa todo en un frasco y se deja en digestion por tres dias para fricciones en los miembros. =Matamoros 1 enero 3 de 1849.

Este receta fue bien recibida en Matamoros.

MONTERREY — 1849
Reimpreso por E. Molina — calle de la Tesorería.