


WBK
R585^m
1859

ARMY MEDICAL LIBRARY
WASHINGTON

Founded 1836

33
C



ANNEX

Section

Number 380045



1. 1. 13

Este del médico homópata a la cobertura del sistema y la per-
tencia de terapéuticos homopáticos, por el Dr. Hirschel. Traducción al
español por D. S. Badieraux Lopez. Madrid, 1855. Un tomo en 8.^o 16 rs.
Aunque manual de medicina homopática, presenta parte: Ma-
nual de práctica médica, tratamiento de las principales afecciones de los
medicamentos homopáticos, con indicación de las observaciones etio-
lógicas. Segunda parte: Repertorio terapéutico y farmacológico. Si-
milares análogos de las principales afecciones de los medicamentos
homopáticos, con sus síntomas, por el doctor G. H. G. Jahr. Tra-
ducido del francés al castellano de la última edición, por D. S. Badieraux
Lopez. Madrid, 1855. 4 tomos en 8.^o

PATOGENESIA BRASILEÑA.

Los Años del cuerpo, como también las afecciones de los medi-
mentos, por el Dr. Hahnemann. Estudios homopáticos. Oje-
trabado del alemán al francés, por Dr. Molinari, traducido de la
sociedad de medicina homopática de París, Bélgica, Holanda,
de otras sociedades europeas. Versión del francés al castellano, por
el Dr. J. A. Alvarez-Parrilla, traducido de la sociedad Hahnem-
anniana portuguesa de la sociedad Hahnemanniana de París.
1855. Un tomo en 8.^o 16 rs.
por el Dr. Teste, versión al castellano por Dr. Tomás Ferrer, traduc-
ción de D. J. Alvarez-Parrilla (de Puerto-Rico), doctor me-
dico, miembro de la sociedad Hahnemanniana portuguesa. Madrid,
1855. Un tomo en 8.^o 16 rs.
Maximopatia douada, ó guia de las pruebas para que pue-
dan darse por sí mismas homopáticamente en las indicaciones de
las, y prestar socorros eficaces a los enfermos en los casos raras,
hasta la llegada del médico, redactado en forma de las mejores opi-
niones homopáticas y a su propia experiencia, con algunas de las señas
Gallon, Gross y Stapp, por el Dr. Hering; traducido de la última
edición alemana, y contextualizada sobre la de Francia por el doctor
Leon Marchant, versión al castellano por la dirección de D. Tomás
Ferrer, traducido en medicina, séptima edición. Madrid, 1855.
Hahnemanniana portuguesa, de unas 500 páginas,
como en 8.^o propagada de las enfermedades de los niños,
Terapéutica portuguesa de las enfermedades de los niños,
de Dr. Hartmann, traducida del alemán al francés, con notas,
de Dr. Leon Simon, hijo, y del francés al castellano por la
don de D. Roman Fernandez del Rio, doctor en Medicina y Cir-
cujía, socio del número y fundador de la Academia homopática
de Lisboa, etc. Madrid, 1855. Un tomo en 8.^o 16 rs.
De la patogenesia física y moral de la especie humana ocu-
rida por la vacuna, por el Dr. Verbe-Delisle, traducida al castel-
lán por D. Félix Guerrero Vidal, médico-director de aguas minerales
Madrid, 1855. Un tomo en 8.^o propagado

LIBRERÍA DE D. CARLOS BAILLY-BAILLIERE.

LIBRERO DE CÁMARA DE SS. MM. Y DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL

Calle del Príncipe, núm. 41, Madrid.

Guía del médico homeópata á la cabecera del enfermo y Repertorio de terapéutica homeopática, por el Dr. Hirschel. Traducida al español por D. S. Rodríguez Lopez. Madrid, 1859. Un t. en 8.º 46 rs.

Nuevo Manual de medicina homeopática. Primera parte: Manual de materia médica, ó resúmen de los principales efectos de los medicamentos homeopáticos, con indicacion de las observaciones clínicas. Segunda parte: Repertorio terapéutico y sintomatológico ó tablas alfabéticas de los principales síntomas de los medicamentos homeopáticos, con avisos clínicos, por el doctor G. H. G. Jahr. Traducido del francés al castellano de la *última edicion*, por D. Silverio Rodríguez Lopez, médico homeópata. **Segunda edicion española**. Madrid, 1858, 4 tomos en 8.º 80 rs.

Los Lados del cuerpo, como tambien las afinidades de los medicamentos, por el Dr. Bœnninghausen. Estudios homeopáticos. Obra traducida del alemán al francés por Ph. de Molinari, individuo de las sociedades de medicina homeopática de Paris, Bélgica, Holanda, y de otras sociedades científicas. Vertida del francés al castellano, por el Dr. Jph. Ant. Alvarez-Peralta, individuo de la sociedad Hahnemanniana matritense, de la sociedad filantrópico-magnética de Paris. 1857. En 8.º 4 rs.

Sistematizacion práctica de la materia médica homeopática, por el Dr. Teste, vertida al castellano por D. Tomás Pellicer, médico homeópata, y D. J. Alvarez-Peralta (de Puerto-Rico), escritor médico, individuos de la sociedad Hahnemanniana matritense. Madrid, 1855. Un tomo en 4.º 32 rs.

Homeopatía doméstica, ó Guía de las familias para que puedan tratarse por si mismas homeopáticamente en las indisposiciones ligeras, y prestar socorros eficaces á los enfermos en los casos urgentes hasta la llegada del médico, redactada conforme á las mejores obras homeopáticas y á su propia esperiencia, con adiciones de los señores Gullon, Gross y Staph, por el Dr. Hering; traducida de la *última edicion* alemana, y coleccionada sobre la de Filadelfia por el doctor Leon Marchant, vertida al castellano bajo la direccion de D. Tomás Pellicer, licenciado en medicina, sócio de número de la sociedad Hahnemanniana matritense. *Segunda edicion*. Madrid, 1856. Un tomo en 8.º prolongado, de unas 500 páginas 24 rs.

Terapéutica homeopática de las enfermedades de los niños, por el Dr. Hartmann, traducida del alemán al francés, con notas, por el Dr. D. Leon Simon, hijo, y del francés al castellano bajo la direccion de D. Roman Fernandez del Rio, doctor en Medicina y Cirugía, sócio de número y fundador de la Academia homeopática española, etc., etc. Madrid, 1853. Un tomo en 4.º 24 rs.

De la Degeneracion física y moral de la especie humana ocasionada por la vacuna, por el Dr. Verdé-Delisle, traducida al castellano por D. Félix Guerra Vidal, médico-director de aguas minerales, etc. Madrid, 1855. Un tomo en 8.º prolongado 44 rs.

MATERIA MÉDICA HOMEOPÁTICA.

PATOGENESIA
DE
LOS MEDICAMENTOS

LLAMADOS BRASILEÑOS

PUBLICACION

DEL INSTITUTO HOMEOPÁTICO DE RIO JANEIRO^{de}

VERSION CASTELLANA

POR ***



MADRID

CARLOS BAILLY-BAILLIERE

LIBRERO DE CÁMARA DE SS. MM. Y DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL

LIBRERÍA ESTRANJERA Y NACIONAL

Calle del Príncipe, núm. 11.

Paris, J. B. Bailliere et fils.—Londres y New-York, H. Bailliere.

1859.

1500

MATERIA MEDICA HOMEOPATICA

PATOGENIA

DE

LOS MEDICAMENTOS

LLAMADOS ESPECIFICOS

EDICION

WBK

R585m

1859

Film 8305, 2rems 2

MADRID

CARLOS BALLY-BALLIER

LIBRERO DE CAMARA DE SE. MA. Y DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL

LIBRERIA ESTANISLAWA Y NACIONAL

Calle del Príncipe, núm. 11.

Paris, J. B. Ballier et fils - Londres y New-York, H. Ballier.

1859.

1800

Al publicar en castellano las patogenias de los medicamentos, llamados del Brasil, creemos hacer un nuevo servicio á la Homeopatía. Mas de una vez hemos sentido la falta de estos agentes medicinales en la práctica y la conveniencia de que se generalizase el uso de estos preciosos medicamentos. Mas para esto, no solamente era necesario conocer los síntomas puros que desarrollan y los casos de su aplicacion, sino poseer las sustancias medicamentosas, y estas faltaban en España absolutamente. Hoy, que el celoso profesor de Farmacia, D. Cesáreo Martin Somolinos ha establecido, á fuerza de trabajo, entusiasmo y sacrificios, que le honran mucho, la primera botica homeopática especial, que hemos tenido en la Córte, surtida completamente de cuantos medicamentos conoce la medicina homeopática, la publicacion en castellano del libro de la Escuela de Rio Janeiro, no significa mas que la satisfaccion de una necesidad pública.

Respecto á la traduccion, diremos únicamente que está esactamente ajustada al original en su espíritu como en su letra.

Madrid, marzo de 1859.

INDICE.

	Págs.
Clasificacion metódica de las patogenesisias brasileñas.	4
Patogenesisia brasileña.— <i>Pediculus capitis</i>	20
<i>Elais guineensis</i>	35
<i>Mimosa humilis</i>	38
<i>Cervus brasiliicus</i>	40
<i>Guano australis</i>	43
<i>Hyppomane mancinella</i>	45
<i>Hura brasiliensis</i>	53
<i>Lepidium bonariense</i>	93
<i>Panacea</i>	108
<i>Solanum tuberosum ægrotans</i>	110
<i>Plumbago litoralis</i>	130
<i>Solanum oleraceum</i>	134
<i>Paullinia pinnata</i>	135
<i>Blatta americana</i>	143
<i>Delphinus amazonicus</i>	145
<i>Amphisbœna vermicularis</i>	147
<i>Resina itu</i>	149
<i>Janipha manihot</i>	152
<i>Melastoma Akermani</i>	155
<i>Sedinha</i>	156
<i>Spiggurus Martini</i>	158
<i>Jacaranda caroba</i>	161
<i>Tradescantia diurética</i>	170

Murure Leite.	171
Cannabis indica.	173
Petiveria tetrandra.	174
Convolvulus Duartinus.	187
Bufo Sahytiensis.	190
Aristolochia milhomens.	193
Crotallus cascabella.	197
Elaps corallinus.	209
Canna angustifolia.	223
Hedysarum Ildefonsianum.	224
Myristica sebifera.	226
Ocimum canum.	227
Solanum arrebenta.	228

CLASIFICACION METÓDICA

DE LAS

PATOGENESIAS BRASILEÑAS.

La clasificacion de la materia médica homeopática, es una obra larga y penosa, pero que, sin embargo, no vacilamos emprender. Persuadidos de que todos los séres concurren á la unidad de concepcion del universo, ensayaremos estender á las especies sintomatológicas las consecuencias de las leyes que rigen los cuerpos de donde nacen. Tal vez algunos discípulos de Hanhemann temerán que la clasificacion de los agentes patogenéticos nos vuelva á traer la reconstruccion de una patología, y la sustitucion de abstracciones, tan vigorosamente condenadas por el maestro, al estudio de los síntomas bien determinados.

Nosotros no participaremos de estos temores; y concretándonos al estudio de cuadros patogenéticos únicamente, jamás nos separaremos del camino marcado por la misma naturaleza. Las especies naturales, puestas en contacto con el organismo, deben manifestarse por signos tan susceptibles de coordinacion para el médico, como los caracteres exteriores de las mismas lo son para el naturalista. Cada enfermedad, producida por un agente bien determinado, debe ser una entidad distinta de

cualquiera otra. No sucede lo mismo en patologia. Mil causas diversas se reunen para producir el resultado que constantemente observamos, sin que la sagacidad humana pueda preveerlo ni encadenarlo.

¿Cómo podria referirse á un todo sistemático el producto de la confusion y la casualidad? ¿Por qué buscar en los efectos complicados lo que es tan sencillo en su causa original? ¿Por qué basar una de las ciencias accesorias de la homeopatía sobre las lesiones materiales que suceden á largas enfermedades, cuando los cambios de la sensacion alterada, son la mas segura guia de la observacion pura? No olvidemos que el dia se acerca en que la homeopatía curativa y profiláctica generalizada, presentará á los clasificadores patólogos la ocasion de examinar estas terribles lesiones, que la falsa ciencia ha multiplicado por tanto tiempo. ¿Y podrá decirse que es una ciencia la que mañana habrá perdido para siempre el objeto de su exámen?

La patogenesia, por el contrario presenta un campo tan vasto como sencillo de fecundas generalidades. Hanhemann lo ha dicho (*Organon*, § 118); la especie sintomatológica existe y no puede sufrir modificaciones. Esta, para él, es una especie tan evidente como el Azufre, la Belladona y el Acónito. Semejante á la especie natural, que ha provocado su desarrollo, debe poder clasificarse como ella y siguiendo análogos principios.

Para nosotros como para Hanhemann, el organismo no es la causa de la vida, sino su resultado; y como sabemos por la teoría fisiológica, este organismo es una matriz en la cual vienen á refluir todos los cuerpos de los que ha recibido impresion la vitalidad. Asi es como el olor permanente del Azufre, producido á consecuencia de una dosis homeopática de esta sustancia; los sudores de olor semejante al *Solanum tuberosum*, son fenómenos morbosos que constituyen una de las propiedades de la especie natural, que los ha provocado. De esta manera, nosotros consideraremos la especie sintomatológica como una de las formas de la especie natural, creada por el organismo bajo la incitacion de este, no pudiendo desarrollarse mas que

en una condicion especial, que es la esperimentacion pura.

Para esta sistematizacion patogenética, no podemos dirigiarnos á otra fuente mas que á la materia médica pura, sirviéndonos esclusivamente de los signos y los síntomas; en una palabra, de las formas esteriore de la enfermedad producida artificialmente. Nuestra clasificacion necesariamente se apoyará ahora en gran parte sobre los órganos especialmente afectados, no pudiendo establecer suposicion alguna hipotética sobre la naturaleza misma de los síntomas, ni por consiguiente teorías basadas sobre ideas estrañas á los mismos hechos. Guiados por estas consideraciones, hemos dado á nuestro trabajo una direccion completamente distinta de la que se ha dado hasta ahora á los tratados nosológicos.

Todos los medicamentos no atacan al organismo con igual violencia; los unos parece que activan el ejercicio de las funciones vitales, mientras que los otros tienden á perturbar ó destruir la armonia de las fuerzas dinámicas, que es el estado de salud. Tomando entre estos medicamentos, por una parte aquel que mas haga en sentido de la vida, y por otra el que produzca una desarmonia mas profunda en el conjunto del organismo, tendremos dos términos estremos, opuestos el uno al otro, y formando dos limites, entre los cuales vendrán á encerrarse todos los medicamentos en progresion creciente, segun su mayor ó menor afinidad con uno de los dos estremos. Y no solamente deberán los fenómenos orgánicos darnos estos dos términos, sino que han de coincidir exactamente con ellos los caractéres morales, conformándonos en esto perfectamente con el verdadero espíritu de Hanhemann, que tanta importancia concedia á los síntomas morales, hasta el punto de subordinar á ellos todos los demás.

Aplicando estos principios á las patogenesias brasileñas, encontraremos como puntos estremos *Pediculus* y *Elaps corallinus*. El primero, si las reglas que establecemos son verdaderas, debe alejarse lo menos posible del estado normal. En efecto, observamos que obra sobre un órgano muy superficial, sin atacar al organismo en sus partes esenciales. Su ac-

cion se limita casi esclusivamente al tejido celular cutáneo; sus caractéres morales son relativos á esta accion fisica tan poco pronunciada, concretándose á escitar un poco la energia para ejercer las ocupaciones ordinarias, sin producir los sorprendentes fenómenos de *Crotalus* y de *Elaps*. Estos, por el contrario, y el último en particular perturban profundamente la economia y afectan todos los órganos, desde el tejido celular hasta los aparatos sensitivos. Los síntomas morales, que tocan casi hasta la completa pérdida del pensamiento, están perfectamente en armonía con su accion fisica. Para completar este plan general, en que se clasifican los medicamentos segun su accion subersiva y sus recíprocas afinidades, es preciso una ley secundaria que penetre en todos los detalles de los síntomas, y sea un criterio de la clasificacion hecha *á priori*. Esta ley la encontramos en el órden mismo de sucesion de los síntomas. Su cronología ó aparicion sucesiva, no es en efecto una circunstancia indiferente, como hasta ahora se ha creido. Los mismos síntomas, diversamente combinados, pueden constituir enfermedades y patogenesias diferentes; de la misma manera, que con idénticas palabras, dos autores hacen dos obras distintas, y de igual modo, que con los mismos elementos, el químico produce muchos cuerpos isómeros, iguales por sus átomos, diferentes por el órden con que están agrupados. Felizmente para nosotros, estas ideas que por muchos años hemos tenido presentes, nos han hecho conservar originales las notas de las esperimentaciones puras, para ordenar las patogenesias brasileñas, haciéndonos fácil un trabajo, que la antigua materia médica no ha verificado jamás.

En los primeros dias de la esperimentacion, es cuando se manifiestan los principales rasgos que deben dominar todo el conjunto é indicar su lugar en la série. Así, en *Pediculus*, los fenómenos de escitacion moral y fisica aparecen desde los primeros dias, y son seguidos de síntomas secundarios anormales, que se representan en los medicamentos siguientes, tendiendo siempre á hacerse primarios. Es evidente que ningun síntoma puede descender de un lugar á otro de la escala me-

dicamentosa, ocupando un término de cada fórmula, porque ellos no presentan gran alejamiento del estado normal para venir á corresponder directamente á los de *Elaps corallina*. Por consiguiente, nosotros hemos colocado á la cabeza de nuestra clasificacion los medicamentos cuyos síntomas, alejándose del estado normal del organismo, se han manifestado hácia el fin de la experimentacion; y en último lugar aquellos cuyos síntomas mas anormales se precipitan en los primeros dias, disminuyendo gradualmente de intensidad, para ser reemplazados por síntomas normales, á medida que avanza el tiempo de la experimentacion. Y esto no es mas que la confirmacion de lo que nosotros hemos establecido.

En efecto, á medida que los síntomas anormales son cada vez mas primarios, aquellos que se presentan en el curso de la experimentacion, tienden tambien gradualmente á aproximarse al estado normal, hasta que al fin se llega á encontrar una igual excitacion que en los primeros medicamentos de la série. Asi es como el *Bufo sahytiensis*, despues de haber producido primitivamente una estrema postracion de las facultades intelectuales, escita por el contrario en los últimos dias la alegría y la vivacidad del espíritu; estado, que es preciso no confundir con una simple reaccion ó efecto curativo, porque los actos vitales se separen aun del estado normal. La coucentracion de los síntomas de algunos medicamentos sobre los mismos aparatos orgánicos, nos ha hecho establecer muchas divisiones en esta série, no teniendo en cuenta mas que las relaciones de los medicamentos entre sí. Estas divisiones son las mismas que señalaremos en el orden de los aparatos, cuando espougamos la teoría de las dosis, habiéndoles conservado los mismos nombres, á escepcion del primer grupo, que nos ha parecido que se especializa por síntomas del tejido cutáneo.

Hé aquí el orden de estos grupos:

- 1.º Aparato NERVIOSO CUTÁNEO.
- 2.º Aparato LOCOMOTOR.
- 3.º Aparato CIRCULATORIO.
- 4.º Aparato SECRETORIO.

5.º Aparato DIGESTIVO.

6.º Aparato GENITO-URINARIO.

7.º Aparato SENSITIVO.

Estas divisiones nos parecen naturales, y que se efectúan, puede decirse, por sí mismas. Es probable que con el tiempo, y á medida que nuevos medicamentos se vayan introduciendo, cada dia se separarán menos entre sí. En el estado actual, cada una de estas divisiones recorre limites muy distantes el uno del otro. Por ejemplo, para el primer grupo, se parte de un simple prurito en *Pediculus*, para llegar en *Guano* á una insensibilidad completa de la piel. Este sintoma, que á primera vista parece que debia colocar este medicamento mucho mas bajo en la escala, muestra que en un mismo grupo el órgano típico afectado, se aparta del orden de las funciones normales cuanto es posible, y aun en apariencia mucho mas que el primer medicamento del grupo siguiente. Pero elevándonos á consideraciones mas generales, se ve que los medicamentos de este grupo se refieren á órganos mas importantes y mas profundamente alterados, y por consiguiente se encuentran bien colocados en el grupo. Esto nos conduce á considerar todas estas divisiones como paralelas entre sí, miradas individualmente, pero ligándose las unas á las otras linealmente, cuando se las aplica la ley general que al principiar hemos espuesto.

Hé aquí la clasificación metódica de los medicamentos contenidos en este libro, segun los principios establecidos.

PRIMER GRUPO.

APARATO NERVIOSO-CUTÁNEO.

Los caractéres generales de este primer grupo, son las diversas erupciones cutáneas, acompañadas de hinchazones, que muy secundarias al principio, van haciéndose cada vez mas primitivas; gran debilidad de la vista y cefalalgias violentas. En algunas especies, se encuentra la insensibilidad de la piel. Estos síntomas, tan semejantes á los de la lepra, hacen de este

grupo uno de los mas importantes de nuestra serie por su aplicacion al tratamiento de esta enfermedad, tan comun en el Brasil.

PEDICULUS.

La inteligencia y las fuerzas físicas están exaltadas durante los doce primeros dias. A partir de este tiempo, vése disminuir poco á poco la excitacion, viniendo á ser reemplazada por una especie de atonia intelectual. El sistema nervioso concuerda con esta exaltacion, produciendo estremecimientos é insomnios. J. V. Martins, en un trabajo sobre el veneno de las serpientes, ha llamado la atencion sobre el completo desacuerdo que existe entre los sueños y el estado moral del dia; siempre están aquellos en oposicion á este. Tambien nosotros hemos podido verificar la misma observacion en otros muchos medicamentos brasileños, y sobre todo en *Pediculus* la hemos hallado muy notable. Hemos visto que los sintomas morales del dia, se caracterizaban por una extraordinaria actividad, casi febril, con aumento de fuerzas físicas. Los sueños, por el contrario, representaban imágenes de sufrimientos pasivos, ú objetos fuera de la naturaleza. Asi, el sueño de hospital del tercer experimentador, de prisiones en que debe morir de hambre y de sed, de piojos enormes, de hombres que habitan en el agua, están en oposicion absoluta con el estado moral. Es digno de notar, que el sueño de hombres habitando en el agua, se ha repetido en el mismo dia en dos experimentadores.

La accion física desarrolla un violento prurito, acompañado de granos inflamados. Las cefalalgias, los males de garganta y una gran debilidad de la vista, son los principales caracteres de este medicamento. Las hinchazones, que han aparecido al fin de la experimentacion, son muy notables por la importancia que van á adquirir en los dos medicamentos siguientes, á los cuales parece este preludiar.

ELEIS GUINEENSIS.

La alegría y un sentimiento de bienestar general, son los primeros síntomas producidos por este medicamento. Estos síntomas presentan demasiada analogía con los de *Pediculus*, para que dudáramos colocar estos dos medicamentos el uno después del otro. El abatimiento de los últimos días del medicamento precedente, es reemplazado aquí con una tristeza, que persiste hasta el fin de la experimentación.

La acción física, consiste en cefalalgias, erupciones é insensibilidad de la piel. La hinchazón aparece al principio, los males de garganta se continúan, y la visión está alterada, como en *Pediculus*.

MIMOSA HUMILIS.

No tenemos aquí mas síntomas morales que los del sueño, en relación con los de *Pediculus*, por el insomnio de la noche. En cuanto al sueño, que aparece por la tarde, no es mas que un paso hácia la soñolencia continua, que vamos á encontrar mas tarde.

Las cefalalgias persisten, pero son primarias y duran menos tiempo, aunque acompañadas de vértigos. Los síntomas de la piel consisten aun en prurito y erupciones. La hinchazón aparece el cuarto día. La vista está débil desde los primeros momentos, siendo notable este síntoma por su insistencia en acompañar á las erupciones y á la hinchazón.

CERVUS BRASILICUS.

La fotofobia, se manifiesta desde el segundo día; la cefalalgia con vértigos, desde el primero al tercero. La piel presenta una fuerte rubicundez, que termina en descamación, con prurito.

GUANO AUSTRALIS.

Las hinchazones son primarias y de mas corta duracion que los síntomas de la piel. Esta disposicion, nos indica una muy notable inversion del síntoma, porque mientras que en el primer medicamento de este grupo, la hinchazon estaba subordinada á los síntomas cutáneos y de insensibilidad, aqui son las hinchazones las que marchan paralelamente con ellos, y desaparecen antes. Tambien se observan las náuseas con inflamacion de la boca.

Eleis, *Mimosa* y *Cervus*, han sido empíricamente empleados para combatir las erisipelas y la elefantiasis de los árabes.

HIPPOMANE MANCINELLA.

La alegría del primer dia, es bien pronto seguida de abatimiento y tristeza, acompañada de un sueño profundo; el pecho está oprimido, rigido el cuello, las erupciones se circunscriben mas, un herpe aparece el dia once, y durante toda la esperimentacion persiste una diarrea violenta.

Este medicamento tiene numerosas relaciones con el primero del grupo siguiente. La pesadez sobre los ojos, el sudor en la palma de las manos, coincidiendo con sequedad del resto del cuerpo, el gusto á sangre y la sequedad de la garganta, el hambre, que se presenta el oncenno dia á consecuencia de náuseas primitivas, son síntomas muy semejantes á los que desarrolla el *Hura brasiliensis*. Nosotros habiamos ya observado estas relaciones, antes de tener conocimiento del árbol que produce el jugo, llamado *asacú* por los indios. La semejanza botánica del *Hippomane mancinella* con el *Hura*, ha sido para nosotros una nueva confirmacion de lo que ya habiamos observado, sobre los síntomas aislados de estas dos especies.

GRUPO SEGUNDO.

APARATO LOCOMOTOR.

Dificil de separar del prececente, este grupo presenta una gran predominancia de sintomas de los aparatos locomotores, á los que vienen á agregarse algunos del aparato gástrico. En lo moral, se observa la tristeza, la perturbacion de los órganos de los sentidos, la continuacion de la soñolencia por el dia, mientras que la noche es generalmente muy agitada.

HURA BRASILIENSIS.

Tristeza genoral con disposicion á llorar, soñolencia por el dia, escalofrios nerviosos, gran debilidad de la vista, y en el primer esperimentador exaltacion del olfato, son los síntomas sensitivos mas marcados de la esperimentacion. Los demas consisten en cefalalgias continuas, particularmente frontales; el pecho está oprimido é inflamados los ojos, como en el medicamento que viene despues; las náuseas y la inapetencia, se manifiestan durante la primer parte de la esperimentacion, y hácia el dia veinte y uno son reemplazadas por un hambre violenta y muy dolorosa. Sobre muchos puntos de la piel, aparecen granos vesiculosos, con prurito. Los síntomas del aparato locomotor, se desarrollan estremadamente, y los de la region lumbar, que ha sido con preferencia atacada, duran casi todo el tiempo de la esperimentacion.

LEPIDIUM BONARIENSE.

No solamente es aqui la tristeza como en el *Hura*, sino aun mayor, acompañada de grande indiferencia y casi imbecilidad desde los primeros dias. La soñolencia de dia y el insomnio por la noche, se generalizan durante toda la esperimentacion. La vista está alterada, como en el medicamento precedente; la au-

dicion está muy entorpecida; las cefalalgias vertiginosas continúan; numerosos dolores calambroides, contusivos y lancinantes, ocupan sucesivamente el aparato locomotor. Los ojos están inflamados. Violentas palpitaciones de corazón, se hacen sentir todo el tiempo que dura la acción del medicamento. Náuseas frecuentes y una gran repugnancia á los alimentos, tienen lugar en la cronología de *Lepidium*, siendo los últimos síntomas que se presentan. Haremos observar la importante inversión que presentan estas náuseas, limitadas en el *Hura* á los primeros días de la experimentación y seguidas de hambre, para hacerse continuas y terminales en *Lepidium*;

PANAÇEA.

Las ideas tristes se especializan cada vez mas; el experimentador desea la soledad, y aun de sí mismo está descontento, etc. Estos síntomas nos indican un paso rápido hácia aquellos mas profundos y anormales de los grupos que van á seguir. La soñolencia y especialmente la pesadez sobre los ojos, tan marcadas en el *Hura*, volvemos á encontrarlas aquí. Para mayor semejanza, reaparecen las cefalalgias vertiginosas, los dolores abdominales, que habiéndose manifestado en el *Hura* hácia el fin de la experimentación, se presentan aquí desde los primeros días. El sistema locomotor se encuentra afectado por diversos dolores, que ocupan todo el cuerpo.

GRUPO TERCERO.

APARATO CIRCULATORIO.

Los dos medicamentos que componen este grupo, presentan síntomas febriles mucho mas marcados que en las precedentes divisiones. El pulso se halla agitado con calor y sudores, el humor es iracundo, y la soñolencia aparece por la tarde; las cámaras duras y difíciles.

SOLANUM OEGROTANS.

Grande irritabilidad durante toda la experimentacion ; soñolencia por la tarde y sueños fantásticos por la noche, notables por su semejanza en todos los experimentadores. Las violentas cefalalgias, que han persistido los treinta y tres primeros dias, la dificultad de las cámaras y la emision frecuente de flatuosidades, las palpitaciones del corazon, los calores y sudores nocturnos, con aceleracion del pulso y sequedad de la garganta, son los principales síntomas que formulan este medicamento.

PLUMBAGO LITORALIS.

Durante los primeros dias, taciturnidad y abatimiento moral, con aumento de la soñolencia por el dia. El calor y la aceleracion del pulso, que el medicamento precedente dá desde el dia trece al treinta y siete, aqui se manifiesta desde el primero y con mayor intensidad. Algunas funciones se encuentran exaltadas, y el olfato es muy vivo el segundo dia. Violentos deseos venéreos aparecen desde el primero al tercero. Como en *Solanum oegrotans*, obsérvanse tambien aqui violentas cefalalgias, con vértigos; las palpitaciones del corazon, producidas por aquel medicamento, se hallan representadas tambien en este. Las piernas están débiles, y diferentes dolores recorren todo el tronco.

GRUPO CUARTO.

APARATO SECRETORIO.

Este grupo, que no está representado mas que por una especie, el *Solanum oleraceum*, se reanuda á los precedentes como provocando el complemento de una funcion, cual es la secrecion de la leche.

SOLANUM OLERACEUM.

Tristeza é irritabilidad, soñolencia por el dia, insomnio por la noche. El segundo dia, hinchazon de las glándulas del cuello y mamarias, que secretan leche en abundancia; inflamacion de la garganta. El *Solanum oleraceum*, es el medicamento que nos ha dado mejores resultados hasta ahora en la fiebre lactea y en el destete. Los brasileños lo emplean, hace siglos, contra la lepra tuberculosa; pero á la homeopatía estaba reservado encontrarle una aplicacion mas general y mas cierta.

GRUPO QUINTO.

APARATO DIGESTIVO.

Incluiremos en esta division algunos medicamentos, que darán lugar sin duda mas tarde á establecer un sub-grupo, necesario por la gran variedad de síntomas y número de especies de que se compondrá. Los síntomas de las regiones epigástrica y abdominal, dominan á los demas, produciendo vivos dolores en los costados é hipocondrios, que descienden luego á las regiones umbilical é inguinal, provocando hernias en estos sitios.

Durante toda la esperimentacion se hallan preocupados por ideas tristes los esperimentadores.

PAULLINIA PINNATA.

La tristeza y un fastidio profundo, son los únicos síntomas morales que presenta este medicamento; los sueños son tristes y desagradables. Al paso que avanzamos en esta série, vemos desaparecer los fenómenos de alegría y escitacion moral, que se han manifestado en los primeros medicamentos. La soñolencia por el dia acompaña á la tristeza del esperimentador.

Los hipocondrios son el asiento de vivos dolores lancinan-

tes, y á ellos acompañan simultáneamente náuseas y un frío general. Debilidad de las piernas y dolores variados, se hacen sentir en todo el aparato locomotor; el pecho está oprimido todo el tiempo que dura la acción del medicamento. Observaremos también de paso, que á la inapetencia y á las náuseas primarias, ha sucedido hácia los últimos días el apetito.

BLATTA AMERICANA.

Este medicamento ofrece también pocos síntomas morales, pero dá, como el anterior, abatimiento general, con debilidad de los brazos y piernas; frío y escalofríos el primer día, con hinchazón de la región epigástrica y coloración amarilla de la piel. Los escasos síntomas que poseemos de este medicamento, no nos permiten estendernos más sobre sus propiedades.

DELPHINUS AMAZONICUS.

Los tejidos abdominales se contraen, impidiendo la salida de una hernia inguinal. Varios dolores recorren el tronco y las piernas. Violentas erecciones.

AMPHISBOENA VERMICULARIS.

Tristeza, como en *Paullinia*, con extrañas ilusiones, como si los pies estuviesen en la cabeza; el insomnio nocturno, no es completo; los sueños se verifican precisamente á media noche. Por lo demás, los síntomas físicos son los más anormales del grupo, á escepción de los que representá *Resina itu*. Vértigos violentos, una hernia umbilical y gran debilidad de los miembros, con hinchazón de la cara y de los brazos, son los síntomas culminantes, que resaltan á primera vista.

RESINA ITU.

No hay más síntomas morales ni nerviosos, que algunas ilu-

siones de la vista y espantosas detonaciones en los oídos, que conmueven violentamente todo el organismo. Continúan los dolores abdominales, como también la debilidad de las piernas, que hemos observado en los medicamentos precedentes. Del sexto al noveno día, aparecen deposiciones involuntarias, lo que constituye una transición al medicamento siguiente. La lengua está entorpecida y la palabra no es muy clara.

JANIPHA MANIHOT.

La soñolencia diurna se desarrolla completamente y va acompañada de un excesivo abatimiento, que contrasta con los sueños de incendios de los cuatro primeros días. Las diarreas violentas de los primeros tiempos, se enlazan, como lo hemos hecho observar, con las cámaras diarreicas involuntarias de *Resina itu*. Vemos también una gran debilidad de las piernas, que se hinchan el segundo día, debiendo observarse que es muy diferente de aquella que hemos visto en el grupo cutáneo. En aquel, siempre se presentaban erupciones, prurito y aun insensibilidad; aquí, nada semejante se manifiesta; la hinchazón es simplemente concomitante con los síntomas vasculares. En el último período, se presenta un frío general.

GRUPO SESTO.

APARATO GENITO-URINARIO.

Este grupo conserva los síntomas de los precedentes, á los cuales vienen á enlazarse síntomas genitales muy importantes. La piel se encuentra también profundamente atacada, produciendo la caída de los cabellos, descamaciones primero, y más tarde úlceras insensibles. Este grupo no ofrece más que un número muy reducido de síntomas de la vida de relación, siendo los más notables, abatimiento general con soñolencia, algunas veces seguido de irritabilidad, con escalofríos nerviosos.

MELASTOMA AKERMANI.

Abatimiento con soñolencia y violentos escalofrios. Las orinas son abundantes, claras y espumosas, con picor en la uretra primero, rojas y cargadas de mucosidades sanguinolentas despues.

SEDINHA PECTORALIS.

Orinas ardientes, con dolor de escoriacion; mas tarde, contienen copos mucosos en suspension. Las encías y los dientes están doloridos; el epidermis de las estremidades se descama y cae paulatinamente.

SPÍGGURUS MARTINI.

La repugnancia para los trabajos intelectuales, comienza ya á caracterizarse bien en este medicamento. La soñolencia es continua y va acompañada de sueños alegres, en oposicion con la irrifabilidad y la pereza del dia. Los dientes y el sistema piloso, se hallan atacados; los cabellos, caen ó encanecen; una gran descamacion, se presenta en el cuero cabelludo y la barba; ruidos diversos, se producen en los órganos auditivos; salivacion abundante y dolores en la uretra despues de haber orinado, completan el cuadro de síntomas de este medicamento.

JACARANDA CAROBA.

Al principio, escalofrios nerviosos; despues, una relajacion completa de las fuerzas, durante la supuracion del glande. El corazon, cuyos latidos son alguna vez insensibles, es el asiento de dolores continuos, que dificultan la respiracion. Dolores tractivos ó de quebrantamiento, recorren todos los músculos, desde el segundo al cuarto dia. Despues que han cesado la mayor parte de estos síntomas, aparece la supuracion del glande y la

hinchazon del escroto, que hacen de este medicamento uno de los mas importantes especificos de las enfermedades sifiliticas.

TRADESCANTIA DIURÉTICA.

La respiracion se encuentra impedida, el escroto inflamado, los testiculos se esconden detrás del anillo inguinal. Estos sintomas, por desgracia poco numerosos, indican la importancia que adquirirá este medicamento, cuando sea mejor conocido.

MURURE LEITE.

La exaltacion de las ideas sucede á la irritabilidad de *Spirurus*. Aqui encontramos aun la soñolencia continua. La salivacion, siempre abundante, la ulceracion de gruesos forúnculos, la putridez de las orinas, un flujo blenorreico y erupciones pustulosas de la piel, hacen de *Murure leite* un medicamento destinado á tener grande importancia.

GRUPO SÈTIMO.

APARATO SENSITIVO.

Los sintomas morales de este grupo no se limitan á tristeza ó irritabilidad; siempre se observa un desacuerdo profundo de las facultades intelectuales y morales, que domina en todas las especies de esta division. Asi, pues, en el primero se manifiesta una repugnancia invencible para los trabajos intelectuales, cuando en los últimos se ve una actividad, que toca casi en la locura, formando el mas visible contraste con todos los demas medicamentos de la série. El aparato sensitivo se encuentra siempre afectado; la vista, y sobre todo el oido, profundamente alterados, y alguna vez abolidas sus funciones; todos los demas órganos fuertemente atacados, y siempre al principio de la experimentacion, agrupándose como en tropel todos los sin-

tomos. Por lo demás, nos referimos á lo que habremos de decir en la especializacion de cada medicamento.

CANNABIS INDICA.

Despues de haber visto á todos los medicamentos de esta série, producir una marcada propension al sueño, mas ó menos invencible, llegamos á una sustancia, que dá este síntoma casi esclusivamente. Los sueños, completamente inversos de este estado comatoso, no representan mas que objetos ó acciones agradables. Durante la vigilia, los ojos están uraños y continuamente parpadeando; hay muchos escalofrios, con cefalalgias y vértigos violentos.

PETIVERIA TETRANDRA.

La *Petiveria*, durante el primer dia, predispone á la alegría, pero bien pronto una profunda tristeza y la pérdida de la memoria, suceden á este primer síntoma; la soñolencia, un gran abatimiento, la sordera y la fotofobia, ocupan, sobre todo, los primeros dias de la experimentacion; la abundancia y transparencia de las orinas, indican la predominancia del elemento nervioso, cuya excitacion se manifiesta por dolores de todos géneros en el aparato locomotor; la piel secreta un sudor abundante y presenta manchas rojas y amarillas, con descamacion.

CONVOLVULUS DUARTINUS.

El abatimiento, como ya hemos indicado, llega á su grado sumo en los últimos medicamentos. A este síntoma, que es muy manifiesto en *Convolvulus*, se vienen á unir sueños de pendencias, é iluminaciones, confirmando plenamente la observacion de J. V. Martins. Las manchas de la piel continúan, así como los sudores; dolores paralíticos se apoderan de los miembros, mientras que vértigos violentos, y dolores, en el vértice de la cabeza y occipucio, aumentan el desórden del organismo.

BUFO SAHYTIENSIS.

Repugnancia al trabajo, pérdida de la memoria; en una palabra, síntomas muy semejantes á los de *Convolvulus*; pero además, hácia el fin de la experimentacion, una alegría y una vivacidad de espíritu, que indican la vuelta al estado normal, cuyo orden de síntomas se encuentra en completa oposicion con el de *Pediculus*; confirmacion nueva de la ley cronológica, que ha presidido á nuestra clasificacion.

ARISTOLOQUIA CYMBIFERA.


Los síntomas que poseemos de *Aristoliquia* se parecen tanto á los de *Crotalus cascavella*, que creemos deber indicar esta planta como uno de los mas seguros antidotos contra la mordedura de las serpientes. Por lo demas, muchas especies de la misma familia se han empleado y emplean en ambas Américas contra dichas mordeduras. De la experimentacion pura, se producen insomnios, gran sed é hinchazon de las piernas, con color violáceo y estravasacion de sangre.

CROTALUS CASCABELLA.

Al abatimiento y debilidad intelectual, suceden visiones extraordinarias y casi la locura. Las ilusiones del oido, la sordera, las congestiones sanguíneas, las sofocaciones, los calambres y dolores de los miembros, las pústulas y la descamacion de la piel, el frio con aceleracion del pulso, el desorden de las reglas, etc.; todos estos síntomas, hacen del veneno de esta serpiente una de las sustancias, que mas rápidamente perturban el organismo.

ELAPS CORALLINA.

Continúan las ilusiones, el humor es irritable; la necesidad



de balancearse como un péndulo, manifiesta suficientemente que las facultades intelectuales no están en su centro; en fin, para cerrar esta lista, por desgracia demasiado corta, llegamos en *Elaps* hasta la abolición de las ideas, á un completo anandamiento. Además de estos síntomas, citaremos también la sordera prolongada, los singulares fenómenos de la diglución, entre otros, la sensación de descender al estómago en espiral el bolo alimenticio, las cámaras de bilis verde, los dolores de los órganos respiratorios, que en ningún otro medicamento se han presentado tan vivos, en fin los calambres, las congestiones en los miembros, que se parecen mucho á las que hemos hallado en *Crotalus*. Esta violenta perturbación de las sensaciones y las funciones, constituye el extremo opuesto de este medicamento con *Pediculus*, el primero en la escala, donde solamente vimos una simple excitación del espíritu y del organismo.

PATOGENESIA BRASILEÑA.

PEDÍCULUS CAPITIS.

PED.

Antes de someter esta especie á la experimentacion pura, habiamos ya previsto que sus resultados serian interesantes. Creiamos que la naturaleza, multiplicando este insecto sobre la cabeza de los niños, indicaba anticipadamente un especifico de la psora hereditaria, así como sabemos que el *Psorinum* desarrolla la pytiarisis en el hombre sano. Esta maravillosa coincidencia, esta doble demostracion, no podia ser falaz. Y en efecto, hemos hallado en *Pediculus* un agente de los mas útiles en las enfermedades de la infancia, y uno de los extremos de la série sintomatológica que hemos iniciado, sin el cual hubiéramos tenido mucho mas trabajo en formular.

Bajo este doble aspecto creemos haber hecho un servicio á la práctica y á la teoría de nuestro arte. Aquellos que se entregan á concienzudas y profundas reflexiones, pueden únicamente comprender el sentimiento de íntima satisfaccion que acompaña á semejante convencimiento. Para mejor inaugurar la publicacion de nuestras patogenesias, no podiamos dejar de poner á su cabeza aquella especie, que mejor corresponde al doble carácter, que deseamos imprimir á nuestro trabajo.

El *Pediculus capitis*, es demasiado generalmente conocido, para que nos detengamos, haciendo de él una minuciosa descripcion. Los individuos que hemos empleado, fueron tomados de la cabeza de un niño de cinco años, sano y robusto.

PRIMERA ESPERIMENTACION.

Esperimentador: CH. DIEUDONNE JOLLI.

Veinticuatro años, temperamento nervioso sanguíneo.

1. *Dia primero*.—Estremecimiento de todo el cuerpo, ocho ó diez veces seguidas, despues de media hora.
Se despierta con frecuencia.
Por la noche, comezon en diversas partes del cuerpo.
Dia segundo.—Estremecimiento de la mitad izquierda del cuero cabelludo; como si fueran á erizarse los cabellos, á las nueve de la mañana.
3. Cefalalgia y opresion en la protuberancia nasal, á las diez de la mañana.
Picazon en la concavidad de la oreja izquierda, estando acostado.
Ereccion prolongada, sin deseo venéreo.
Dia tercero.—Gran ereccion, sin deseo venéreo.
Picazon en la primera falange del índice de la mano derecha.
40. Prurito en la nuca y entre los hombros, á las cinco de la tarde.
Zumbido en los oidos, á las ocho de la noche.
Picazon en el cuero cabelludo, á las nueve.
Gran picazon en el arco supraorbitario izquierdo, estendiéndose hasta la cara.
Dia cuarto.—Deseo y facilidad del estudio.
45. Aumento de fuerzas físicas.
Picazon en el antebrazo derecho, estando acostado.
Dia quinto.—Picazon en la parte frontal del cuero cabelludo.
Cansancio de las rodillas, principalmente de la izquierda, que se dobla estando de pié, á las siete de la tarde.
20. Granos en la cara, en la frente, en las sienes y en la barba, miliares, rojos en su base, vesiculares y caracteri-

zados por un punto negro en su centro; estos granos, han aparecido en el curso del día.

Ojos ojerosos.

Color subido de la cara.

Cámaras muy blandas, por la noche.

Dia sexto.—Calor y rubicundez de la cara, inmediatamente despues de medio día.

25. Pulsacion, durante algunos segundos, encima de la rótula izquierda; esta pulsacion habia ya aparecido la víspera por la noche, y está circunscrita de 8 á 10 centímetros de diámetro.

Granos miliares, rojos en su circunferencia é hinchados en su centro; ocupan la parte posterior del cuello y la nuca.

Estos granos no pican, pero el roce de la corbata hace que se experimente una sensacion de desolladura.

Dolor sordo en la cabeza, por la mañana al levantarse.

30. Prurito y comezon en el ala izquierda de la nariz.

Grano blanco con punto negro en su centro, en la comisura izquierda de la boca.

Pequeños granos en la frente.

Violenta comezon en la sien izquierda.

Picazon en toda la barba.

35. Inflamacion de las fosas nasales.

Picor en la concavidad de la oreja izquierda.

Prurito en las muñecas.

Picor en la nuca, la sien izquierda y la espalda.

Gran picor en la nuca, durante casi toda la noche.

40. Sueña que debe morir de hambre en un calabozo, del que se escapa arrastrando.

Dia octavo.—El mal de garganta aumenta progresivamente hasta la noche y continúa durante toda ella.

Sensacion de arañadura en la garganta, á las ocho de la mañana.

Sueño agitado.

Sueños confusos de persecuciones.

45. *Dia noveno.*—El arañamiento de la garganta continúa, pero

menos fuerte que la vispera, á las siete de la mañana. Pequeñas punzadas en el dorso de la mano izquierda, á las dos.

Arañamiento en la garganta; la voz está un poco enronquecida.

Sed con ronquera, menos aspereza en la garganta, por la tarde.

Cámara dura y muy pequeña.

50. *Día décimo*.—Sueños de conspiraciones, de motines, después eróticos; una polucion.

Se despierta muy temprano por muchos dias.

Cámara dura y pequeña.

Desde el principio de la experimentacion, las orinas son amarillas y muy claras.

Día once.—Picor en la parte frontal del cuero cabelludo, á las nueve de la noche.

55. Cámara dura y pequeña.

Orinas amarillas y muy claras.

Día doce.—Actividad febril para escribir, por la noche.

Sueño de íntima amistad, después erótico.

Día trece.—Coloracion roja, y picor en la cadera derecha, durante media hora.

60. Cansancio de la rodilla y de la parte superior de la pierna izquierda, desde las cuatro hasta la noche.

Día catorce.—Prolongada ereccion.

Polucion nocturna, sin sueño erótico.

Día quince.—Silbido en los oidos, después de haber silbado.

Crujido en el oido derecho, comiendo, á las dos de la tarde.

65. *Día diez y seis*.—Emision muy frecuente y abundante de orina, hasta cuatro veces en una hora.

Las orinas son claras, amarillas y muy olorosas.

Hinchazon de la mejilla izquierda, durante dia y medio.

El fin de la experimentacion se caracteriza por un abatimiento y una especie de debilidad moral, que, aunque poco decidida, no por eso difiere menos de la escitacion primitiva.

SEGUNDA ESPERIMENTACION.

Esperimentador: MR. ROUFFINEL.

Cuarenta y cinco años , temperamento nervioso-sanguíneo.

Dia primero.—Violenta cefalalgia frontal , de las cinco á las siete de la tarde.

70. Entorpecimiento.

Picor en el cuero cabelludo , despues de media hora.

Granos blancos en la frente.

Prurito en la muñeca izquierda.

Diarrea por la noche , que se continúa la mañana siguiente.

75. Escalofrios , gran calor y sequedad de las estremidades.

Sueño espantoso : le ha disecado uno de sus amigos.

Dia segundo.—Alegria , á las tres de la tarde. Erupcion miliar en las pantorrillas , con picor , que aumenta por la noche.

Prolongada ereccion , sin deseo venéreo.

80. *Dia tercero.*—Reaparicion de un dolor reumático en el brazo derecho.

Erupcion miliar en la parte interna de los muslos , causando violenta comezon.

Aturdimiento de cabeza.

Reaparicion de antiguos granos en la nuca.

Picor en la punta de la nariz , semejante al de las lombrices.

85. Orinas rojas.

Picor en la cara y cuero cabelludo.

Calor en la piel.

Prurito en las muñecas.

Desaparecen los granos y se reemplazan por otros.

99. Cefalalgia , desde las cinco á las siete de la tarde.

Dia cuarto.—Granos en la nuca , que aunque muy gruesos , no pican tanto como los pequeños , que aun persisten ; (por la mañana).

Erupcion miliar en la parte interna de los brazos y los antebrazos.

Los picores se generalizan , aplacándose por momentos para reaparecer mas vivos.

Cefalalgia menos violenta que los dias precedentes.

95. *Dia quinto.*—Desaparicion de los granos de la nuca.

Picor general , muy vivo en las muñecas.

Mal de cabeza, apareciendo á cortos intervalos y calmándose instantáneamente.

Dias sexto, sétimo y octavo.—Los picores continúan cada vez con mas violencia, los de las pantorrillas aumentan por la noche.

La cefalalgia disminuye de intensidad , pero no cesa completamente.

100. *Dia noveno.*—Cefalalgia intolerable , desde las tres á las siete de la tarde.

Los picores calman un poco.

Dia décimo.—Sensacion de quemadura y picotazo muy agudo en los dos lados de la lengua, que está roja y profundamente agrietada.

Prurito muy vivo en el empeine del pié derecho; dura poco.

Dia once.—Picor en el empeine y las plantas de los piés.

105. Lengua muy dolorida, roja y agrietada.

Dia doce.—Aparece bajo la planta del pié un ganglio del grueso de una almendra, duro, hinchado y estremadamente doloroso al andar.

Sudor frio en los piés, seguido de un frio escesivo, á las diez de la noche.

Dias del trece al treinta.—Persistencia del ganglio del pié.

Las cefalalgias se hacen mas raras y menos violentas.

110. Mal de garganta con constriccion de la faringe, que impide la deglucion.

Se traga continuamente su saliva.

Tos seca y convulsiva.

Sequedad de la garganta.

Los picores continúan, pero son menos vivos.

415. Algunos granos aparecen todavía, de tiempo en tiempo, en los muslos y espalda.
Sudor en los piés, seguido de gran frío.

TERCERA ESPERIMENTACION.

Esperimentador: MR. BERNARD.

Diez y seis años, temperamento sanguíneo-linfático.

- Dia primero*.—Viva picadura en el brazo, como por un alfiler, despues de dos horas.
- Dia segundo*.—Entorpecimiento de las ideas, por la mañana al levantarse; latidos en la sien derecha.
Dificultad de la respiracion, durante un cuarto de hora.
420. Pequeños cólicos.
Punzada en la frente.
Cólicos y diarrea, despues de comer.
Dia tercero.—Ardor alrededor de los ojos.
Dolor hormigueante en la mejilla derecha.
425. Hormigueo en las estremidades de los dedos medio é indicador.
Sensacion de arenas en los ojos.
Picor general, marchando, ó estando sentado.
Comezon general, y particularmente en la parte anterior del muslo y el brazo izquierdo, desde las ocho hasta las once de la noche.
Dia cuarto.—Punzada y vivo picor en la primer falange del dedo medio.
430. Dolor quemante de desolladura en el antebrazo izquierdo, que se aumenta al tacto. (Este dolor le habia aparecido seis meses antes).
Entusiasmo para el trabajo.
Picazon en el antebrazo, por la noche.
Dia quinto.—Tos seca.
Calor en la cara.

435. *Dia sexto.*—Bostezos.

Dia sétimo.—Sueña que ha atravesado los patios de un gran número de casas, para llegar al Sena, donde ha visto (en verano) hombres jugar y patinar, llegándoles el agua hasta los muslos. (Hacia un año que no soñaba).

Prontitud y vivacidad en los movimientos.

Pesadez en el vértice de la cabeza.

Punzadas en la frente.

440. Lábios secos, hinchados y muy rojos; coloracion muy pronunciada de la cara.

Dia octavo.—Pequeños granos rojos, con un punto negro en su centro, sobre el músculo esterno-mastoideo derecho.

Dia noveno.—Pesadez sobre la órbita del ojo izquierdo; escozor en el ángulo del ojo derecho.

Manos frias y calor en la cara, á medio dia.

Frio con escalofrios y retemblidos, á las cinco de la tarde.

445. Escalofrio, que recorre todo el cuerpo.

Deseo de dormir.

Punzadas en los dientes molares superiores derechos.

Bostezos.

Arañamiento en las amígdalas al tragar saliva, particularmente en la derecha; dura todo el dia y se continúa al siguiente.

450. Los cabellos se caen.

Dia décimo.—Prurito en la espalda.

Prurito en la muñeca izquierda.

Carácter dulce y complaciente.

Dia once.—Calor en las orejas, á las cuatro de la tarde.

455. Frio, escalofrio y temblor, á las cinco de la tarde, durante un cuarto de hora.

Afluencia de palabras. (Este experimentador tartageaba habitualmente.)

Bostezos, desde las tres de la tarde hasta las ocho de la noche.

Picazon general, sobre todo por la noche.

Dia doce.—Punzadas en el parietal derecho, durante un cuarto de hora.

160. Punzadas en la raíz de la nariz, durante cinco minutos.
 Contraccion del cuero cabelludo.
 Punzadas muy violentas por encima de la rodilla izquierda, durante una media hora.
Dia trece.—Punzadas violentas encima de la rodilla derecha.
 Picor en la oreja derecha.
165. Cefalalgia.
 Punzada en la sien izquierda.
 Picor en la concavidad de la oreja derecha.
 Picazon general.
 Calor en la cara.
170. *Dia catorce.*—Picor en el dorso de las manos.
 Estremecimientos y sobresaltos, por la noche, estando sentado ó acostado, durante los últimos dias de la experimentacion.
 La picazon ha continuado por mucho tiempo.

CUARTA ESPERIMENTACION.

Esperimentador : MME. A. L. J***

Veinte y siete años, temperamento sanguíneo.

- Dia primero.*—Picor en la parte esterna de la muñeca izquierda, á las diez de la noche.
- Dia segundo.*—Manchas rojas en los carrillos; manchas blancas en las manos, en el sitio de antiguos granos.
175. *Dia tercero.*—Picor general, durante todo el dia.
- Dia cuarto.*—Picor en el pliegue de la corva, como por ortigas.
- Dia sexto.*—Sueña que está enfermo en un hospital muy sucio y lleno de miseria; que le salia por la nariz agua con abundancia.
- Dia sétimo.*—Picor en el cuero cabelludo, como si le corrieran piojos por toda la cabeza.
- Digestion difícil, con contracciones del estómago.

180. Sueña que ve personas conocidas, marchando por el agua.
Dia octavo.—Inapetencia.
 Gran aptitud para estudiar.
 Grande alegría por la noche.
 Sueña que ve una figura negra, inmensa, que vuela al cielo oscureciendo el sol; despierta muy asustada.
185. *Dia noveno.*—Sueño de piojos enormes.
Dia trece.—Picor general.
 Cefalalgia.
Dia catorce.—Punzadas agudas intermitentes en la cabeza, que se aumentan bajándola.
 Granos rojos en los hombros.
190. *Dia quince.*—Picor en el dedo anular.
 Dolor de quebrantamiento, como si le hubieran dado de palos en los hombros y brazos, los cuales están muy sensibles al tacto.
Dia diez y seis.—Picor en la parte inferior derecha de la cara.
Dia diez y nueve.—Pequeños granos rojos y picazon en la pantorrilla derecha.
 Náuseas continuas por la noche.
195. En la noche se despierta aturdida, con imposibilidad de abrir los ojos.
 Sensacion, como si la levantaran de la tierra, teniéndola por los cabellos.
Dia veinte.—Deslumbramiento al andar; el cerebelo parece comprimido, con pulsacion y dolor muy vivo, al levantarse por la mañana.
 Disgusto á los alimentos.
Dia veintitres.—Por la tarde, dolor en la matriz, cambiando de sitio, con imposibilidad de apoyarse sobre este órgano.
200. Sensacion de un punto dolorido en la matriz,
 Punzadas estremadamente dolorosas; gran calor y escozor en la matriz.
 Sentimiento de estupidez.
 Cara roja escarlata.
 Prurito general.

QUINTA ESPERIMENTACION.

Esperimentador: MLLÉ. D. R.

Diez y ocho años, temperamento nervioso-linfático.

205. *Dia primero*.—Calor en la cabeza.

Sudor en la cara.

Cefalalgia frontal, hasta el punto de no poder volver la cabeza en todo el dia.

Dia segundo.—Picor, rubicundez é hinchazon de las venas del dorso de la mano derecha, á las nueve de la mañana.

Violento mal de cabeza, con aturdimiento y náuseas, á las once de la mañana.

210. Sofocacion en el pecho, de las cuatro á las seis de la tarde.

Calor en la cabeza y las manos, á las ocho de la noche.

Sofocacion continua.

Escalofrios, estremecimientos.

Fiebre.

215. Noche muy agitada.

Ha dormido muy poco.

Dia tercero.—Violento mal de cabeza, que se aumenta inclinándola, á las siete de la mañana.

Rubicundez de la cara.

Al sacar los piés del agua caliente, se cubren de pequeños granos rojos sin picor, á las nueve de la mañana.

220. Cefalalgia frontal, á las once de la mañana.

Cercos morados en los ojos.

Lábios negros y agrietados.

Picor en la cara, y aparicion de pequeños granos rojos sin picor, á las seis de la tarde.

Cólicos de estómago, y punzadas en la region umbilical.

225. *Dia cuarto*.—Granos en la espalda, blancos en su centro y muy escocientes.

(Los cabellos que se caian antes de la experimentacion dejan de caerse).

Indiferencia completa sobre el presente y el porvenir.

Gran actividad para el trabajo, aumento de fuerzas físicas.

Dolores frecuentes en la region lumbar, estando de pié.

230. Cefalalgia frontal, al andar y despues de la comida, á las ocho de la noche.

Temblor en las manos, hasta el punto de no poder coser, á las nueve de la noche.

Pequeños granos, rojos, inflamados, semejantes á la carne de gallina, que cubren el hombro y brazo izquierdo.

Granos blancos muy hinchados, encima del pecho izquierdo.

Muchos granos pequeños, negros en su centro, sobre la rodilla izquierda.

235. Rubicundez de la cara, las manos y los pies (estos estaban habitualmente de un blanco verdoso); los hombros y los brazos menos blancos que de costumbre.

Grande alegría sin motivo.

El epidermis de la parte anterior de la pierna izquierda, se descansa y cae en partículas como salvado.

Dia quinto.—Estremecimientos y escalofrios, sin tener frio.

Gran calor en las manos.

240. Dolores en el pecho, que se aumentan por el tacto, á las nueve de la noche.

Dia sexto.—Hambre, con imposibilidad de tragar los alimentos, como por retraccion de la faringe; despues, desfallecimiento, con deseo de vomitar, á las ocho y media.

Violenta cefalalgia con náuseas, al andar.

Gran debilidad de las piernas.

Tristeza sin motivo; se enfada por cualquier cosa.

245. Granos rojos, hinchados en su centro, sobre el pecho y el epigastrio.

Flores blancas.

Gran picazon durante la noche.

Sueños muy agradables.

Dia sétimo.—Pequeños granos rojos en las manos; no duran

mas que una hora y dejan señales coloradas, como picaduras de pulga.

250. Granos pequeños, muy rojos, inflamados, en las sienes, en los hombros, en los brazos y en las piernas.

Granos en la espalda, muy escocientes, hinchados, inflamados, como si hubieran de dar sangre, grandes de un centímetro, muy rojos en su circunferencia, blancos, con un punto negro en su centro.

Dia octavo.—Opresion pasagera, sobre todo por la tarde despues de la comida.

Alegría estremada; rie por todo. Humor burlesco y epigramático.

Picazon general.

255. Dolores en los pechos al respirar.

Violenta cefalalgia y punzadas en la frente, al andar.

Irritacion, cólera sin motivo.

Dilatacion de las pupilas; los ojos parecen mas grandes.

Los labios están negros y agrietados, por la noche, durante los últimos dias de la experimentacion.

260. *Dia noveno.*—Picor general con rubicundez.

Laxitud excesiva, estando de pié: la cabeza parece que da vueltas, como si fuera á desvanecerse, durante una hora, á las nueve de la mañana.

Pequeños granos en la boca.

Escozor en los ojos, como si hubiera llorado mucho.

Debilidad de la vista, durante todo el tiempo de la experimentacion.

265. Sacudidas nerviosas.

Ardor en la cabeza y viva rubicundez en la cara.

Dia once.—Cefalalgia y presion sobre las órbitas, que impide levantar los ojos.

Gran debilidad de la vista, no puede leer ni coser, á la una y media.

Rubicundez muy pronunciada en la cara.

270. Rubicundez de las manos con manchas violáceas.

Cefalalgia frontal, aumentada bajando la cabeza.

Hinchazon y rubicundez de la cara.

Cansancio de la vista, con rubicundez y escozor de los ojos.

Constriccion de la faringe.

275. Cansancio de la mandibula inferior, como si hubiera masticado mucho.

Dolor en la flexura del brazo derecho, sobre todo al estenderlo.

Hinchazon y rubicundez de las manos.

Llamaradas en el pecho, que está sensible al tacto, á las ocho de la noche.

Cólico violento que hace gritar y llorar durante una media hora, á las nueve de la noche.

280. *Dia doce*.—Violenta cefalalgia frontal.

Incomodidad en la garganta todas las noches, durante cuatro dias.

Emision frecuente y abundante de orina acuosa, amarilla verdosa los últimos dias; cámaras casi diarias. (Antes de la esperimentacion era habitualmente estreñida).

Once dias despues de la completa cesacion de los síntomas, se ha presentado una hinchazon de los pechos, de la cara y despues de todo el cuerpo. Esta hinchazon, vino acompañada de muchos de los síntomas de los últimos dias y particularmente de la constriccion de la faringe.

La hinchazon y los síntomas accesorios adquirieron un carácter de gravedad tal, que fué preciso recurrir á los medios de curacion homeopática. La China á la 12.^a dinamizacion obtuvo un gran resultado, y á los pocos dias la esperimentadora habia vuelto á su estado normal; pero los picores y los granos voluminosos, que son síntomas de *Pediculus*, continuaron manifestándose aun por mucho tiempo.

ELAIS GUINEENSIS (Jacq).

ELA. Palma. *Coco de Denté.*

Esta palmera crece en toda la América meridional y con preferencia en los desmontes y sitios espuestos al sol. Su tronco, recto ó inclinado, alto de 8 á 9 metros, está cubierto por las bases persistentes de las hojas. Las de la cima forman una copa espesa, parecida á un paraguas. Son grandes, pinnadas, con numerosas hojuelas, eusiformes, alternas y sesiles, sobre un fuerte raquis, guarnecido en su parte peciolar de largas y agudas espinas. Las flores son monoicas con periantho papiráceo y seis divisiones. Las flores masculinas tienen seis estambres y tres hojuelas internas, rectas y conniventes. Forman espadixes ramosos en masas fusiformes, colocadas entre las bases de las hojas. Las flores femeninas están diseminadas; el ovario es subcilíndrico colocado debajo de un estylo corto de estigma bilobulado. El fruto es oval, oleaginoso, rodeado de un pericardio duro y anguloso.

Se tritura el fruto.

4. *Dia primero* (por la mañana).—Fastidio de estar solo.
Eructos amargos.
Náuseas.
Soñolencia durante el dia.
5. Calor en la cara.
Dolor pulsativo en la nuca.
(Despues de mediodia). Dolor en la parte media del torax, como por picaduras de agujas.
Dificultad de respirar.
Dolor martilleante en toda la cabeza.
10. Vacilacion al andar.
Inapetencia.
Latido sobre el brazo izquierdo, como si lo tamborilearan con el dedo.
Dia segundo.—Hinchazon de la pierna derecha.
Dolor al andar, cada vez que apoya el pié en tierra.
15. El mismo dolor, si se toca con la mano la planta del pié.
Picor general.

Sentimiento de fortaleza y bienestar.

Aparicion de pequeñas vesículas sobre la hinchazon de la pierna derecha.

Revientan cuando se las toca, y arrojan un poco de líquido.

20. Vesículas de la misma naturaleza, aparecen en la pierna izquierda, en el brazo y en distintas partes del cuerpo, sin que haya hinchazon.

Alegría y risas, aun estando solo.

Recuerdo de un naufragio pasado.

Dolor, como por un golpe, en la rodilla derecha.

Dolores, como por picaduras, en la pierna derecha.

25. Picazon continúa por todo el cuerpo.

Dolor, como de contusion, en el lado derecho del pecho.

Hinchazon, compresion y picor en la piel de la pierna izquierda.

La piel parece mas gruesa.

Dolor vivo en la parte inferior de la pierna izquierda, como por una herida de instrumento muy cortante.

30. *Dia tercero*.—La pierna está menos hinchada.

Cólicos despues de haber bebido frio.

Tristeza.

Dolor en la pantorrilla, como por haber sufrido un golpe.

Deseo de vomitar.

35. Cólicos violentos.

Debilidad de las piernas.

Vista confusa á la luz artificial; escribe las letras mas grandes que lo que acostumbra.

Dolor pulsativo en las pantorrillas.

Respiracion difícil y suspirosa.

40. Dolor martilleante en la tibia, en la nuca y en el pié derecho.

Dolores en el hombro derecho, como si hubiera sufrido un golpe.

La vista es mas débil que antes.

Escalofríos.

Orinas blancas.

45. Cámaras negruzcas.

Dolor constrictivo alrededor del cuello , como por la presión de una cuerda.

Buen apetito.

Fastidio , mal humor.

Desobediencia.

50. Deseo de gritar.

Dia cuarto.—El pié está cada vez mas hinchado.

Dolor martilleante y continuo en el pié.

Punzadas en la garganta , al tragar.

Dolor de quebrantamiento en el vientre.

55. Dolor pulsativo en los dientes.

Picotazos en la laringe , al respirar.

Aproximando la mano al fuego no siente quemarse , mientras que otra persona á igual distancia experimentaba muy vivo calor.

Una hora despues se hace sentir con violencia el dolor de la quemadura.

Dolor picante en la garganta , al tragar la saliva.

60. *Dia quinto.*—Mal olor en la boca , despues de haber bebido agua.

Tos con punzadas en los costados.

Ardor en la lengua al comer , tan violento que obliga á dejar la comida.

Dia sexto.—Hinchazon muy considerable en la pierna.

Las vesículas de la pierna y pié derecho se han secado ; pero han aparecido otras en el brazo y pierna izquierda.

65. *Dia décimo.*—Despues de una carencia completa de sintomas , ha inspirado el medicamento , y mas tarde ha tomado diez gotas de la tintura madre.

Despues de haberlas tomado , mal olor en la boca.

Eructos fétidos.

Alegría.

Martilleo en las sienes.

70. Punzadas en el lado derecho del pecho , de cinco en cinco minutos , aliviadas con la quietud.

Aparición de veyculas llenas de agua, mayores que las precedentes.

Picazon cada cinco minutos, sobre todo en las piernas.

Alrededor de la boca del estómago, la piel parecemas gruesa, con dolor en las últimas costillas falsas como si le apretara una clavija.

Dia once.—Hinchazon del ojo derecho.

75. Imposibilidad de fijar la vista.

Punzadas en diversas partes del cuerpo, sobre todo bajando escaleras.

Tumor en el brazo izquierdo.

Insomnio por la noche, causado por el picor.

Hinchazon del ojo izquierdo.

80. Diarrea frecuente.

Vómito de un pastel, inmediatamente despues de haberlo comido.

MIMOSA HUMILIS (Wild).

MIM. *Leguminosas. Malicia das mulieres.*

Esta especie, una de las mas pequeñas del género Mimosa, se encuentra en los prados de los alrededores de Rio Janeiro. Su tallo es delgado, un poco leñoso, ramoso, pubescente en su parte superior y sembrado de espinas muy agudas. Las hojas son bipinnadas con cuchillos de tres ó cuatro pares de hojuelas, y estas muy pequeñas, lineares y que se cierran al menor contacto: varían entre 6 y 12 de cada lado del raquis. Flores pequeñas, sesiles, formando bonitas borlas sedosas de color de violeta. El fruto es casi triangular, aplanado, cubierto de pelos largos y rígidos, rodeado de una corteza persistente y articulada en dos cápsulas, cada una de las cuales contiene una semilla.

Se emplean las hojas.

1. *Dia primero.*—Estremecimientos de los brazos, estendiéndose hasta el pecho.

Dolor quemante en las piernas con parálisis de la rodilla.

Malestar de cabeza, con debilidad de estómago.

Incomodidad en el estómago, despues de almorzar.

5. Soñolencia.
 Flato y borborigmos en los intestinos.
 Bostezos.
 Salivacion.
 Escalofrios.
10. Temblor en las piernas.
 Punzadas en las piernas y las manos.
 Estornudo.
 Coriza y flujo por la nariz.
 Inflamacion de los ojos.
15. Papulas en la pierna izquierda.
 Constipacion.
 Abatimiento.
Dia segundo.—Se despierta por la noche con frecuencia.
 Tos seca, por la mañana.
20. Dolores de estómago, despues de almorzar.
 Vértigo.
 Aureola irisada alrededor de la luz.
 Entorpecimiento de las manos.
 Rigidez de las corvas.
25. Sensacion de calor en el interior de la cabeza.
 La cabeza parece mas voluminosa que de ordinario.
 Bostezos.
 Negligencia.
 Cólicos flatulentos, por la noche.
30. Evacuaciones frecuentes con cólicos.
 Escrecencia papulosa del grosor de una almendra, en la pierna derecha, con dolor y picor.
 Igual síntoma en el empeine del pié.
 Soñolencia, por la noche.
 Respiracion difícil.
35. *Dia tercero.*—Hinchazon inflamatoria del escroto.
 Prurito en los ojos.
 Presion en la nuca y en la sien derecha.
 Escrecencia papulosa sobre el tendon de Aquiles.
 Turbacion de la vista.

Dolor en los parietales.

40. Diarrea.

Dia cuarto.—Hinchazon del maleolo izquierdo, con rubicundez, tension y punzadas.

Las escreciencias de las piernas desaparecen, y se desarrollan otras semejantes en el brazo izquierdo.

Evacuaciones fáciles.

43. Entorpecimiento del brazo y mano derecha, que se disipa por el movimiento.

Inflamacion del ojo izquierdo.

Falta de respiracion.

Dia quinto.—Las encías dejan escapar sangre.

Desaparicion de las pápulas.

50. Punzadas agudas, tan pronto en el brazo, como en la pierna.

Punzadas violentas en la espalda, como por la punta de un cortaplumas.

Sonolencia por la noche; se despierta con frecuencia.

Dia sexto.—Hinchazon inflamatoria de la mano izquierda.

Escalofrios.

55. Flatulencia.

Diarrea.

Dia décimo.—Diarrea.

Silbido de oidos.

CERVUS BRASILICUS.

CERV. *Cervus campestris*. F. CUV. *Mazame guazuti* (Aza)
Guazupita.

Este ciervo, cuyas formas son de una delicadeza y elegancia notables, habita los bosques del Brasil. Es poco menos que de la alzada de nuestro venado comun de Europa. El color de su piel, que no cambia jamás, es de un gris oscuro; haciéndose mas claro hácia el abdómen, las nalgas y la cola. Debajo de la mandíbula inferior, debajo y encima de los ojos, el interior de las orejas y el abdómen son blancos. Una línea negra le rodea la boca, viniendo á perderse bajo la mandíbula inferior. Los ojos del guazuti son negros, y no tiene dientes caninos. Su hocico muy afilado termina por una especie de geta. Las astas, poco elevadas y muy regulares en todos los individuos, son primero rectas; despues se encor-

van hácia adelante en el segundo año y dan tres ramas, de las cuales, una anterior, está colocada cerca de dos pulgadas encima de la protuberancia que se dirige un poco hácia adelante, y los otros dos en la parte posterior y superior del nacimiento del asta; y van con el tiempo engresando, pero nunca aumentan el número de ramas.

Se tritura la piel, que se procurará sea fresca y provista de pelos.

4. *Dia primero.*—Gusto á cobre en la boca, y sensacion de calor en la garganta, al tomar el medicamento.

Sueño ligero y comatoso, acompañado de sueños de hombres vestidos de negro, de pistoletazos y de prisiones.

Agitacion.

A las cinco de la mañana, la cabeza está pesada y aturdida, sobre todo en la parte frontal.

5. Calor continuo en la cabeza.

A las nueve y media, el borde izquierdo de la lengua aparece agrietado.

(Indolencia, deseo de acostarse).

(Incapacidad para todo trabajo).

Crispatura de la piel, que se pone como carne de gallina, (como si oyera limar á su lado).

10. Bostezos repetidos.

Sensacion de frio, aunque está bien abrigada.

(Suspiros, desde las dos y media hasta las tres).

Débil diarrea.

Orinas color de té muy cargado.

15. A las cuatro.—Aumento de calor en la frente y la cara.

Manchas rojizas é inflamacion del lado derecho de la cara.

Aturdimiento y pesadez de la cabeza.

Calor en las piernas.

A las seis.—Ligero dolor en el vientre, alrededor del ombligo, de corta duracion.

20. Sensacion de una picadura de aguja en el ala derecha de la nariz.

A mediodia.—Compresion en la cabeza, como por una cuerda que viniera á anudarse en la nuca.

Sensacion de quebrantamiento en los dedos del pié izquierdo.

Dolor repetido, tan pronto en la nalga como en el muslo del lado izquierdo.

Debilidad de la pierna izquierda.

25. Pequeña callosidad encima del maleolo interno de la pierna izquierda.

Sentimiento de fatiga y quebrantamiento general.

Día segundo.—Sueño agitado, como la primer noche.

Despierta muchas veces en la noche, y siempre preocupado de una riña con cierto individuo, que le asustaba.

Continúan los aturdimientos.

30. Pesadez sobre la frente.

Sensacion de cimbradura en el ángulo interno de la pierna derecha, con manchas rojas.

Como un principio de erisipela.

Escalofrios con estremecimientos.

Bostezos.

35. Dolor intermitente en el anillo inguinal derecho, despues de haber marchado.

Gusto de pan en la boca.

Vista muy sensible á la luz; no puede abrir los ojos en un aposento bañado por el sol.

A las diez de la noche, dolor en el anillo inguinal derecho, hácia la articulacion, como una picadura de aguja, durante un cuarto de hora.

El mismo dolor se reproduce en el ombligo, estando acostado.

40. *Día tercero.*—Entorpecimiento del brazo sobre que ha estado echada por la noche.

Endurecimiento de la pierna izquierda, con punzadas.

Manchas marmóreas en diferentes puntos de la cara.

Manchas rojas, que trasudan un humor gelatinoso en la pierna izquierda.

Sueño tranquilo y corto; despierta cuatro veces en la noche.

45. Cabeza aturdida; un poco de pesadez en la frente.

Calor en la pierna derecha, alrededor de la mancha roja, que está sensible al tacto.

Gusto en la boca de pan á medio cocer.

Abatimiento durante el día.

Ereccion por la noche, con deseo de acostarse.

50. *Dia cuarto*.—Entorpecimiento de las manos y las piernas.
Inquietud en la pierna izquierda.

GUANO AUSTRALIS.

GUAN.

Esta sustancia, empleada hace algunos años en agricultura para fertilizar las tierras, es el producto escrementicio de las aves que habitan las costas de Patagonia, cuya acumulacion forma masas considerables. Nuestra posicion en Rio Janeiro, nos ofrece numerosas ocasiones de adquirir este producto en circunstancias mucho mas favorables que puede obtenerse en Europa; porque nos llega casi fresco del cabo de Hornos, á donde numerosos buques lo van á buscar. El guano presenta algunas variedades, que nosotros hemos experimentado sucesivamente, así como las cristalizaciones formadas por la condensacion de los vapores amoniacales que se desprenden de él en mucha abundancia. Nosotros esperábamos encontrar en estos cristales una sustancia normal mas activa, pero no se realizaron nuestras esperanzas; y despues de numerosos ensayos, como hemos dicho, nada hemos hallado preferible al guano todo lo fresco posible, y cuyo aspecto se aproxime mucho á los escrementos ordinarios de las aves.

Esta sustancia se tritura, como todas las demás.

4. *Dia primero*.—Escalofrío interior, durante tres minutos, por la mañana.

Violenta cefalalgia.

Dolor en la frente, inclinando la cabeza hácia adelante, á las seis de la mañana.

Gran picor en la espalda y dolor quemante despues de haberse rascado, á las siete de la mañana.

5. Hormiguelo en la fosa nasal derecha, á las siete y media.

Dolor punzante detrás de las orejas, á las ocho y media.

Aturdimiento. Se ven los objetos dar vueltas de abajo á arriba, á las nueve.

Náuseas, con salivacion abundante.

Palidez de la cara, con principio de desfallecimiento, mediodía.

40. Gran laxitud , á las dos y media de la tarde.

Deseo de vomitar , á la misma hora.

Dolor en el cardias con deseo de vomitar , despues de haber comido.

Sudor abundante general , despues de la comida.

Dolor de cabeza , en la frente y los temporales , que se aumenta inclinándola , á las tres y media.

45. Dolor en la mejilla izquierda.

Dolor en el pulmon , que impida la respiracion ; dura tres minutos.

Hinchazon del índice de la mano derecha.

Picor en las partes genitales.

Gran frio , metiendo las manos en agua , que se hielan , permaneciendo en ella.

20. Dolor en los piés , que impide sentarlos en el suelo , á las cinco.

Mancha roja con descamacion en la espalda ; raseándose en ella , el dolor se hace quemante.

Violenta cefalalgia , como si la cabeza estuviese oprimida por un aro de hierro.

Dia segundo.—Latidos en la comisura izquierda de los labios , á las seis de la mañana.

Picor en la nariz derecha y estornudos frecuentes , durante una hora , á las seis y media.

25. Gran debilidad.

Permanece en el sitio donde ha tropezado.

Dia tercero.—

Ganglio muy doloroso en el brazo izquierdo con gran rubicundez y picor ; cuando se rasca está insensible hasta el acorchamiento ; dura media hora , á las seis de la mañana.

Dolor de cabeza ; parece que se la abren , á las ocho de la mañana.

Ganglio escociente en la pantorrilla derecha , impidiendo la progresion , dura hasta media noche.

30. *Dia cuarto.*—Náuseas ; no puede ver comer , á las siete de la mañana.

Orinas poco abundantes y blanquecinas.

Ganglio doloroso en el brazo izquierdo.

Granos pequeños con prurito.

Violentas palpitaciones de corazón; no puede respirar sino muy débilmente, durante cinco minutos.

Placa ancha, dura y roja, en la espalda, con picotazos como por millares de alfileres. Esta sensación comienza á las nueve y dura toda la noche.

35. *Dia quinto*.—Sudor abundante en los brazos y las manos. Insensibilidad de la piel de los muslos, en los cuales puede pincharse impunemente; durante dos días, están cubiertos de granos pequeños.

Calambre en el epigastrio, antes de la comida.

Dia sexto.—Violento dolor en la rodilla derecha, como si le arrancaran la carne en pedazos, á las siete de la mañana.

Ardor en la planta de los piés; no puede resistir los zapatos.

Calambre en el pulgar derecho: dura un instante.

40. *Dia sétimo*.—Sensación de alfilerazos en las encías; después sangran durante media hora, á las seis de la mañana. Gran hormigueo en la nariz derecha, durante cinco minutos á las diez.

Sensación de martillazos en la nuca, á las tres de la tarde.

Dolor, como si puntas agudas penetrasen en el vientre, á las nueve de la noche.

Dia octavo.—Lengua blanca y gruesa.

45. Boca amarga, como de hiel, á las seis de la mañana.

Sueño muy profundo.

Sueña que juega con bestias salvajes.

HIPPOMANE MANCINELLA.

FLIP. *Mancinella venenata*. Juss. *Manzanillero*, *euphorbiáceas*.

Aunque las propiedades deletéreas del Manzanillero hayan sido muy exageradas, no por eso es menos cierto que es un árbol estremadamente venenoso, y que gracias á la precaucion de cortarlo, en los terrenos cultivados donde crece, vaya por fortuna haciéndose cada dia mas raro. El manzanillero es un árbol de 4 á 5 metros de altura, cuyo tronco de una

madera blanca y muy blanda, está cubierto de una corteza gris. Sus ramas colocadas en la parte superior forman una copa que le dá un aspecto parecido á los árboles frutales de Europa. Sus hojas son alternas, ovales-agudas, un poco cordeadas en su base, muy finamente dentadas y colocadas sobre largos peciolo, con una glándula roja en su punta; durante su juventud son estipuladas. Flores monoicas, formando largas espigas terminales, sobre las cuales las flores masculinas ocupan la parte superior; las femeninas están colocadas debajo ó en la axila de las hojas. Flores masculinas con periantho bifido, de donde nacen los estambres, cuyos filamentos reunidos forman una columna que lleva las anteras. Las flores femeninas tienen un periantho hendido en dos ó tres partes, con un rudimento de hojuela: el ovario es redondo y libre ó supero; el estylo recto y se halla terminado por seis ó siete estigmas de color rojo, estrellados y reflejos. Su fruto, que tiene un diámetro de tres á cuatro centímetros, es redondo, pulposo, umbilicado en su ápice ó vértice, y encierra una almendra ó hueso leñoso, con siete celdillas monospermas.

Se trituran las hojas frescas.

Cuando se supo en Rio Janeiro que se habia hallado en sus alrededores un Manzanillero encargamos á M. Akermann, discípulo del Instituto, que se asegurase de su identidad y recogiese su jugo. Este llenó su mision con exactitud, y en la sesión pública de 10 de enero de 1847, bebió, en presencia de muchos de nuestros discípulos, una parte de la tintura alcohólica, que habia preparado. Los violentos síntomas que vamos á leer en las esperimentaciones, llegaron en algunos esperimentadores hasta un verdadero envenenamiento, que fué preciso tratar homeopáticamente. Y esta es la causa, por qué el número de los síntomas no está en relacion con el de las personas que han tomado el medicamento, sin que deba atribuirse esta desproporcion á otro motivo. La patogenesia del Manzanillero es una de las mas preciosas de la materia médica brasileña, y tenemos á gran orgullo ser los primeros en citar al Instituto homeopático de Rio Janeiro que ha verificado esta peligrosa esperimentacion, esperada tanto tiempo por los homeópatas europeos.

PRIMERA ESPERIMENTACION.

Esperimentador: M. E. T. AKERMANN.

1. *Dia primero*.—Alegria, deseo de cantar.

Disposicion á tomarlo todo por el lado alegre.

Ruido en los oidos y silbido como por el viento, al andar.

5. Sensacion de calor y temblor en el pecho.
 Eructos continuos, como bocanadas de viento.
 Vómitos aquosos.
 Gran dolor en el vientre, como por un golpe con la punta de un palo.
Dia segundo.—Sueño pesado; despierta tarde.
10. Ideas fugitivas.
 Sensacion de parálisis, inmediatamente despues de haberse levantado; su mano tiembla mucho; le es imposible abrir la puerta de su cuarto.
 Torpeza de imaginacion.
 Inclinacion al silencio.
 Profunda tranquilidad de espiritu, por la mañana.
15. Tristeza.
 Soñolencia despues de almorzar.
 Dificultad de la respiracion al volverse á dormir.
 Rubicundez de la piel.
 Sudor en las palmas de las manos, mientras que el resto del cuerpo está perfectamente seco.
20. Dolor en la parte inferior de la cabeza, y pesadez como si la empujában.
 Erupcion de pequeños granos.
 Dolor martilleante en el lado izquierdo del cuello.
 Dolor como por martillazos, alrededor del cuello.
 Dolor en el lado derecho de la cabeza, mientras oia martillar sobre un yunque, pareciéndole recibir en ella los golpes del martillo.
25. Dolor en la nuca y en la frente, bajándola, de tal manera indefinible, que no lo puede describir.
 Rubicundez de las manos, en el curso del dia.
 Sensacion de pesadez sobre los ojos.
 Se suena las narices con mas facilidad que la ordinaria.
 Dolor alrededor de la cabeza despues de haber permanecido algun tiempo al sol, como por haber recibido un golpe.
30. Rubicundez y calor en las orejas.

Alternativa de hambre y de inapetencia.

Debilidad de estómago.

Disgusto.

Orinas muy abundantes, pero siempre blanquecinas.

35. Vivo dolor con pesadez en la boca del estómago, durante un minuto.

Eructo durante la espiracion, como si bocanadas de calor subiesen á la boca, con sensacion de opresion.

Gusto metálico en la boca.

Espectoracion blanca.

Dolor martilleante en el abdómen, despues de almorzar.

40. Sensacion estremadamente desagradable, oyendo aserrar una tabla.

Oyendo martillar, se siente el contragolpe por todo el cuerpo.

Se acuesta y se levanta alternativamente.

Hinchazon de las venas de las manos.

Dolor en la muñeca y en el antecarpo, como si estuvieran oprimidos fuertemente con cordeles, desde por la mañana hasta la noche.

43. Tres latidos ligeros en el brazo, como si le tocasen con la punta del dedo.

Cámaras fáciles.

Color amarillo de la cara, mientras que todo el cuerpo está colorado.

Emision abundante de flatuosidades.

Debilidad general, todo el dia.

50. Cólicos y diarrea (dos repeticiones) con retortijones en los intestinos, á media noche.

Dia tercero. Sueños tristes, despues alegres.

Todo le fastidia.

Continúan los dolores de cabeza y causan impaciencia.

Sentimiento de ternura y piedad profunda.

55. Orinas muy abundantes y blanquecinas.

El pecho se dilata ámpliamente durante la inspiracion, aun teniendo la boca cerrada.

Quebrantamiento en el pecho, como despues de un golpe, con dificultad de la respiracion.

El dolor constrictivo de la cabeza, pasa al medio del brazo izquierdo, durante cerca de una hora, despues descende á su sitio primitivo.

Dia cuarto.—Dolor lancinante en la sien izquierda.

60. Zumbido en los oidos, marchando al aire libre y sensacion como de un redoble de tambor.

Dolor lancinante en el pecho.

Sensacion de pinchazos, como de alfileres, que atravesaran el corazon.

Sensacion de malestar indefinible, dolor martilleante en el pecho con pérdida de la palabra, mientras duran las emociones morales.

Al menor esfuerzo, tos violenta y punzadas dolorosas en la garganta.

63. Al empezar á hablar, sofocacion repentina y palpitations violentas en el pecho.

Sofocacion y palpitations en el pecho, cuando se quiere reir.

Dolor martilleante en la cabeza y la nuca, con imposibilidad de bajar la cabeza para escribir.

Debilidad en el pecho.

Sed de hora en hora, durante todo el dia; desea el agua y tiene repugnancia al vino y á cualquiera otro líquido espirituoso.

70. La debilidad aumenta.

Tristeza.

Cólico y diarrea.

Inspiraciones cortas y frecuentes.

Orinas claras y abundantes.


75. Punzadas en la vejiga al comenzar á orinar; se alivian al concluir.

Dolor de retortijon en los intestinos.

Dia quinto.—Dolor de cabeza.

Dolor en el pecho al menor movimiento.

La respiracion cesa de estar impedida.



80. Gran deseo de fumar tabaco.
 Picotazos en los piés, estando sentado.
 Pesadez dolorosa en los piés, al andar.
 Debilidad general.
 Dolor de quebrantamiento en las corvas.
83. Constriccion como por un hilo circular, alrededor de los muslos y las piernas.
 Punzadas en las ingles.
 Deseos venéreos.
 Sed continua, todo el día.
 Sequedad de la boca.
90. Abatimiento.
 Tristeza.
 Frio en las estremidades.
 Orinas claras y abundantes.
 Sueño profundo, durante el día.
95. Repugnancia al trabajo.
Dia sexto.—Sueño de espectros, de fantasmas.
 Dolor de cabeza.
 Tristeza, por la mañana.
 Sed mas ó menos fuerte todo el día, hasta la noche.
100. Pesadez general.
 Orinas abundantes y claras.
 Disgusto de todas las cosas.
 Repugnancia al trabajo.
 Deseo de acostarse.
105. *Dia sétimo.*—Dolor de cabeza con vértigo, sobre todo por la mañana, despues de haber comido un pedazo de pan.
 Sensacion como de un golpe en el vientre, seguido de cámara.
 Hormigueo en la cadera derecha y punzadas al andar.
 Sed continua.
 Tristeza.
110. Orinas claras y abundantes.
Dia octavo.—Las orinas vuelven á su estado normal.
Dia noveno.—Desaparecen los síntomas precedentes.
 Actividad de espíritu, disposicion para el trabajo.

Gran apetito.

115. *Dia once.*—Herpe de una pulgada de diámetro en el brazo derecho ; desaparece al dia siguiente.

Dolor martilleante en el cuello , que se alivia por algunos instantes , echando la cabeza hácia atrás.

Picotazos en la boca , comiendo pan.

Deseo de estar acostado.

Cámaras frecuentes.

120. Hinchazon del maleolo izquierdo.

Picotazos durante dos horas en la rodilla izquierda.

Dia doce.—Dolor lancinante en la cabeza.

Pesadez de cabeza.

Aparicion de un dolor de cabeza , como si le aplicáran una faja de una sien á otra , despues de haber meditado.

125. Dolor obtuso de cabeza , escribiendo.

Dolor lancinante en la cabeza , tan pronto como se dispone á comer.

Dolor contusivo en las clavículas , cuando quiere volver la cabeza á derecha ó izquierda.

SEGUNDA ESPERIMENTACION.

Dia primero.—Toma el medicamento á las siete y media de la tarde : una hora despues , dolores de cabeza en estremo violentos , con punzadas muy dolorosas.

Los mismos sufrimientos é insomnio toda la noche.

130. *Dia segundo.*—Continuacion de los dolores de cabeza , sobre todo en las sienes y encima de los ojos.

Dolor muy agudo en las articulaciones de los codos.

Gusto de sangre en la boca.

Dolor en los omoplatos , como reumático.

Punzadas muy repetidas y violentas en el lado derecho del bajo vientre.

135. Punzadas , á intervalos desiguales , en el omoplato izquierdo y los músculos del mismo lado del pecho.

Dolor de cabeza , todo el dia.

Gran sequedad constante de la garganta.

Gusto de sangre en la boca, todo el día.

Día tercero.—Punzadas muy dolorosas en la cabeza, en las sienas y encima de los ojos.

440. Dolores lancinantes internos en el costado izquierdo.

Punzadas en los hipocondrios y los omoplatos.

Continuacion del dolor en la articulacion del codo.

Punzadas en la articulacion de la rodilla derecha.

Torpeza y pesadez escesiva de la cabeza.

445. Constante deseo de dormir.

Dolores incesantes de cabeza.

Dolor muy intenso, lancinante y constrictivo en los músculos de la parte superior del brazo derecho, durante mas de una hora.

Hormigueo prolongado en los dos piés á la vez, pero sobre todo en el izquierdo.

Gusto de sangre en la boca, como si un cuajaron hubiese subido á la garganta, dejando en ella el gusto.

450. Frecuentes punzadas muy violentas en el abdómen y los intestinos.

Falta casi completa de apetito.

Estado comatoso, soñolencia continua.

Gran pesadez de cabeza, en la cual son constantes los dolores.

Día cuarto.—Insomnio por la noche.

455. Los dolores de cabeza se hacen insoportables.

El mismo gusto de sangre en la boca.

Accesos de diarrea, con dolores y tenesmo.

Ha comenzado por una cámara natural, y despues se han presentado evacuaciones frecuentes, dolorosas, de materiales negros y muy fétidos, seguidos de evacuaciones acuosas; este acceso ha durado mas de dos horas.

Punzadas en los músculos de la rodilla derecha, así como en los bordes del costado derecho.

460. Dolores en los hipocondrios.

Dolor lancinante en los intestinos.

Dolor lancinante en el hombro izquierdo.

Persistencia de los dolores de cabeza.

Falta completa de apetito.

465. Falta de sueño.

HURA BRASILIENSIS. (Willd).

HURA. *Euphorbiáceas*. *Asacú*, *Oasacú*.

El Hura brasiliensis, crece en las regiones ecuatoriales de la América del Sur, en las provincias de Para, de Rio-Negro y en las cercanías del de las Amazonas, donde es muy comun. Su aspecto tiene gran semejanza con el de Hura crepitans; sus hojas son alternas, subcordeadas, redondeadas, muy lisas, dentadas en sierra, enrolladas y stipuladas durante su juventud. El peciolo lleva dos gruesas glándulas en su cima. Flores monóicas, las masculinas con periantho corto, urceolado, están revestidas cada una con una bractea escamosa, formando gruesas y prolongadas candelas, pedunculadas y terminales. Las flores femeninas, dobles en longitud que las del Hura crepitans, tienen el periantho aplicado al ovario, que se halla coronado por un estylo largo é infundibuliforme, terminado por un estigma discoideo; son solitarias y están colocadas cerca de las flores masculinas. De este árbol, es del que les indios extraen el jugo lechoso, llamado asacú por los brasileños.

Un leproso retirado á las soledades de las Amazonas, tomó, por consejo de un indio, una cantidad considerable del jugo, conocido con el nombre de asacú, que destila el árbol descrito por Willdnow, bajo el nombre de *Hura brasiliensis*. El leproso curó, y el presidente de la provincia de Para, dió parte de este suceso al gobierno imperial. Desde entonces, el uso de esta sustancia se ha generalizado, sin confirmar la esperanza de los desgraciados leprosos. A la experimentacion pura corresponde esclusivamente elegir las circunstancias individuales, que determinan la eleccion de cada sustancia en particular.

El primero y el tercer individuo de la presente experimentacion, ofrecian la feliz coincidencia de haber padecido la lepra, en un viaje al Brasil, en 1842. Tratados homeopáticamente desde el principio de su enfermedad, parecian completamente curados, y sin embargo, la gravedad de su estado desde el prin-

cipio de la experimentacion fué tan alarmante, que dió lugar á creer que el miasma habia estado oculto, mas bien que totalmente destruido. Los espantosos síntomas de compresion de la médula espinal, que pusieron en gran peligro la vida del primer experimentador, hacen entrever en el asacú uno de los mas preciosos agentes que se puedan emplear en diferentes formas de mielitis. Los síntomas de escitacion nerviosa, los retemblicos, la irritabilidad moral, comun á todos los experimentadores, prestarán una nueva analogía á los que consideran á la lepra como una lesion especial del sistema nervioso. Si los exantemas y la insensibilidad del tejido cutáneo, están poco pronunciados, esto dependerá sin duda de que estos síntomas corresponden á la forma crónica, que solo el uso prolongado del Hura, ó un envenenamiento real, podrian únicamente producir.

Estas cuatro experimentaciones, han sido hechas con una sola gota de la quinta dilucion, dada á cada experimentador. Nosotros, por regla general, evitamos cuidadosamente repetir las dosis, que podrian introducir la confusion en la sucesion cronológica de los síntomas, que consideramos como muy importante. No creemos que pueda esperarse mucho de las dosis repetidas, y si un experimentador no siente decididamente efecto ninguno de la sustancia á la primera dosis, creemos preferible buscar otras, á la cual su organizacion sea mas sensible.

Primer experimentador: AUG. JOLY.

Veintinueve años, temperamento bilioso-nervioso, constitucion regular.

Dia primero.—A las diez de la noche, tomó una gota de asacú, 5.^a dilucion.

1. Una hora despues, prurito sobre las costillas y el esternon, el biceps y la parte posterior del brazo derecho.

Por la mañana, al despertarse, boca pastosa.

Sueño de banquete, de casas en construccion.

Por la mañana, prurito debajo de los brazos, en las piernas, sobre la parte esterna de las tibias.

3. Párpados superiores é inferiores inflamados, de color azulado.
 Picor en el brazo derecho, en la porcion inferior é interna del humero, causada por un pequeño grano que comienza á desarrollarse.
 Gusto á sangre en la garganta.
 Silbido en los oidos, sobre todo en el derecho.
 Grupos de granos miliars sobre la espalda, los brazos, las piernas y el pecho.
10. Irritacion por la mas pequeña contrariedad.
 Deseo de vomitar, incomodidad en el corazon.
 Dolor reumático en el brazo izquierdo.
 Fisonomia fatigada como por una orgía, aunque ha dormido bien toda la noche.
 Punzada en el borde derecho de la lengua.
15. Pellizco en el conducto de la uretra.
 Picazon alrededor de los ojos, especialmente del derecho.
 Sensacion, como si granitos pequeños comenzasen á picar, en el interior de los párpados.
 Palpitacion nerviosa en los párpados.
 Dolor reumático en el sacro, sobre todo al bajarse.
20. Dolor contusivo en la region lumbar.
 Erupcion miliar en las articulaciones.
Dia segundo.—Boca seca, por la mañana.
 Dolor muy vivo en la region lumbar y en el sacro, como si hubiera recibido una gran contusion.
 Sabor de humo en el agua que bebe en el almuerzo.
25. Dolor en la articulacion ileo-femoral.
 Dolor que se estiende á lo largo del muslo izquierdo.
 Estornudos, moqueo frecuente, como al principio de un coryza, despues flujo involuntario por la nariz de moco amarillo de limon, con cosquilleo.
 Dolor incesante en la parte inferior de la region lumbar, que se aumenta mucho sentándose ó bajándose.
 Dolor lancinante en el vértice de la cabeza.
30. A las once de la mañana, un poco deseo de vomitar.
 Aturdimiento.

Sueña que estaba nadando en un río de agua caliente, de color verde oscuro; despues, que estaba en el Brasil en una plantacion, en la cual algunos hombres sacaban agua de un pantano, que estaba de color amarillo.

Calor húmedo, intermitente, que recorre todo el cuerpo y sube hasta la cara, de cuarto en cuarto de hora.

Picor en el ojo derecho.

35. Sensacion de calor, que sube hasta las clavículas.

A las diez menos cuarto, nariz seca; no puede sonarse; picor en el interior de la nariz.

Dia tercero.—Por la mañana, parece que ha desaparecido del todo el dolor del sacro.

A las diez y media, ha vuelto el dolor del sacro con agravacion, despues de haber removido un baul.

Sensacion de quemadura en el dedo índice derecho, con una mancha roja, que se estiende desde la uña hasta la segunda falange. Entorpecimiento.

Apenas tiene sensibilidad.

40. A las doce y media, dolor como si se hubiera metido una espina entre la uña del pulgar.

Por la tarde, prurito por debajo del brazo y á lo largo de la espina dorsal.

Por la noche insomnio; se despierta frecuentemente; agitacion febril.

Dia cuarto.—Por la mañana, calor en las manos.

A las dos de la tarde, pequeño grano vesicular en el dorso de la mano izquierda; dura cuatro horas.

45. Rigidez en el músculo trapecio, hácia su insercion en el occipucio.

Dolor en el antebrazo izquierdo, como si hubiera recibido un golpe.

Pequeños granos vesiculares sobre las costillas, los brazos y las partes salientes de los huesos.

Dia quinto.—Por la mañana, los granos de los brazos y las manos casi han desaparecido; no existe mas que una pequeña picazon sobre el esternon.

Calor en las puntas de los dedos de la mano derecha.

50. Sensacion como si se le hubiese caido una pequeña parte de la uña del índice de la mano derecha.

A las seis y media de la tarde, caloradas y sudores pasajeros. Sensacion de escozor quemante, como de un herpe naciente, en el lado izquierdo del lábio, hácia la barba, á las siete y media de la tarde.

Sensacion detrás del músculo masetero, como por un golpe recibido recientemente sobre la glándula parótida.

A las ocho de la noche, la llaga se hace sensible al tacto y presenta una pequeña hinchazon, que sube hasta encima del arco zigomático.

55. Sensacion de un herpe naciente en el antebrazo, sobre el músculo gran supinador.

Pequeños granos en la cara interna del labio inferior.

Rigidez del cuello y del músculo trapecio.

Picor, como por el polvo, en el borde del párpado inferior del ojo derecho.

Picotazos y hormigueo en la planta de los piés, á las diez y media de la noche.

60. Picor en la espalda, en las piernas y en los brazos, á la misma hora.

Dia sexto.—Escrecencias carnosas en la cara interna de los labios.

Fatiga en las piernas al subir escaleras, á las cuatro.

A las ocho de la noche, rigidez dolorosa del cuello. El dolor del músculo masetero, ya menos violento por la mañana, desaparece completamente por la noche.

Pesadez en los testículos al andar, á las cinco de la tarde.

65. Gusto á sangre en la garganta, antes de almorzar.

Dia sétimo.—Picor en el párpado inferior del ojo derecho, como si estuviese para aparecer un grano.

Sensacion de polvo en el ojo izquierdo, á las tres.

Sensacion de pesadez sobre los ojos, como despues de una gran fatiga.

Dia octavo.—Insomnio toda la noche.

70. Dolor presivo sobre el cráneo.
 Quemazon en las uñas de la mano izquierda.
Dia noveno.—Sensacion como de corbatura en la parte superior del sacro, que impide estar de pié, á mediodia.
 Gusto á sangre en la garganta, antes de almorzar.
 Esputos herrumbrosos, sanguinolentos.
75. Sensacion de doblegamiento en la articulacion de la rodilla al bajar la escalera, á las dos de la tarde.
 A las cuatro, gran dolor de riñones, que va en aumento hasta las cinco, que disminuye.
 Picotazos en el ojo izquierdo y prurito con escitacion nerviosa insoportable, propagándose hasta el corazon muy pasageramente.
Dia décimo.—Picor en el ojo derecho, como por el polvo.
 Escozor en la barba, como si en cada pelo hubiese un grano, á las nueve de la mañana.
80. Sensacion de quemadura en el ángulo interno del ojo derecho, á las nueve y media de la noche.
 Los puntos lagrimales están inflamados.
Dia once.—Picazon por la noche sobre la cara interna de la tibia y escozor como si fuera á salir un herpe.
 Aparicion de un pequeño círculo rojo, con un granito de un rojo mas subido, que termina por escoriacion.
 Picor en el cuero cabelludo, sobre todo detrás de las orejas y de la apofisis mastoides, como si tuviera un herpe.
85. Sensacion como si se hubiera arrancado un padrastro, ó como si tuviera una espina en el dedo anular de la mano izquierda.
 A las diez, escozor en el pliegue del brazo derecho, hácia la parte esterna del brazo.
Dia doce.—Prurito en el brazo izquierdo, con pequeños granos vexiculares.
 Picor en la barba con pequeños granos, formando costra, debajo del lábio inferior.
 Picazon y pequeños granos costrosos en el cuero cabelludo.
90. Sensacion de constriccion en el ano, á las cinco y media.

- Dia trece.*—Sensacion dolorosa en las partes superiores y laterales del sacro, como por cansancio ó magulladura. Grupos de pequeños granos miliars en el pliegue del brazo, con rubicundez alrededor, despues de haberse rascado. Los granos no son vesiculares como antes. Tambien aparecen sobre el empeine de los piés.
- Sensacion de picor en los ojos todo el dia, con rubicundez y escozor sobre el borde mismo de los párpados.
95. Sensacion como si tuviera polvo ó cuerpos estraños en los ojos.
- El ojo derecho está mas sensible que el izquierdo.
- Laxitud en las piernas, despues de mediodia.
- Dolor en la rodilla izquierda, como por una posicion falsa, con punzadas debajo de la rótula.
- Dia catorce.*—Sensacion de contraccion debajo y encima del lado derecho del coccis.
100. Dolor reumático en el lado izquierdo del cuello, en los músculos esplénico, complexos y trapecio.
- Dia quince.*—Dolor reumático en el cuello, con dificultad de volver la cabeza al lado izquierdo, desde por la mañana.
- Dolor de cabeza, semejante á pesadez, sobre el cráneo y hasta la apófisis mastóides.
- Sensacion de disgusto con náuseas.
- Opresion y embarazo de estómago, estando de pié.
105. Cara pálida, ojeras, y rubicundez en el borde de los párpados.
- Dolores de cabeza con latidos en los parietales y en el vértice, correspondiendo á las apófisis mastóides y estendiéndose hasta los músculos esterno-mastóideos.
- Sensacion de constriccion en la parte superior de la garganta.
- Espectoracion considerable de esputos amarillos, pesados y mucosos, desde la administracion del medicamento.
- Los sentimientos afectuosos están muy desarrollados.
110. Rigidez dolorosa del cuello que impide volver la cabeza al lado izquierdo.

Cerrando los ojos, sensacion como si los párpados estuviesen frios.

Dolor en el occipucio, estendiéndose hasta el vértice de la cabeza, con latidos dolorosos y vivos.

Dia diez y seis.—Dolor atroz en la region sacro-lumbar, en la articulacion de la última vértebra y el sacro, al querer levantar un fardo.

Dolor semejante á si le arrancaran un ligamento; dolor con entorpecimiento en el muslo izquierdo, en el trayecto del nervio ciático.

415. Imposibilidad de bajarse sin experimentar grandes dolores en la region sacro-lumbar, lo que le obliga á meterse en cama.

Desvanecimiento al querer sentarse en la cama, causado por la violencia del dolor del sacro; sensacion de arrancadura.

Espasmos nerviosos, convulsiones, calambres en las pantorrillas y los dedos de los piés, durante el desvanecimiento.

Sensacion de temblor en el sacro.

Prurito, como si pasearan gusanos en el sacro.

420. A pesar de los dolores, duerme bien la noche del quince al diez y seis.

Deseo de orinar cada media hora.

Es muy pesado para orinar.

Orinas claras como el agua, con un pequeño tinte verdoso.

Calambres en los dedos medio y anular de la mano derecha.

425. Pulso suspendido durante dos minutos, retintin de oídos, ruido en la cabeza y latidos en las sienas.

Mientras el desvanecimiento y despues, disposicion á amar á todo el mundo, y especialmente á aquellos que le rodean.

Piensa frecuentemente en la muerte, pero no teme morir; cree que si muriese, lo haria sin pena.

Se reprende todas las malas acciones que haya podido cometer, echándose en cara las menores faltas, y considerándose muy culpable, por haberlas cometido.

Preocupacion sobre su salud eterna, durante la crisis nerviosa.

Desarrollo excesivo del olfato, hasta el punto de sentir el olor de las personas á distancia.

430. *Dia diez y siete.*—El dolor del sacro parece disminuir, pero aun no puede levantarse de la cama, ni hacer en ella movimientos, ni adoptar otra postura que la supina.

Tiene apetito, pero come poco.

Un glánglio doloroso aparece detrás del músculo masetero, debajo de la oreja derecha.

Embarázo en la cabeza, sobre la frente.

Sensacion de opresion en la frente.

435. *Dia diez y ocho.*—Despierta por la noche frecuentemente.

Se despierta mas temprano que lo acostumbrado.

Por la mañana, boca pastosa.

Espustos sanguinolentos, pútridos, color de chocolate con leche.

El dolor del sacro es muy fuerte, y parece ocupar mayor estension, alcanzando un poco hasta los músculos dorsales y lumbares, y hasta las vértebras dorsales.

440. La cabeza está aun un poco pesada, encima de los arcos supraorbitarios.

Debilidad en las articulaciones de los dedos y de las muñecas.

Las glándulas del cuello están siempre doloridas, con punzadas.

Gusto á sangre en la garganta.

Caloradas pasajeras.

445. La respiracion es dolorosa, como si tuviese una llaga viva en la region lumbar

Dia diez y nueve.—Sueño tranquilo y prolongado.

Arroja sangre por la nariz, por la mañana.

Granos en la frente.

Sensacion de peso sobre los ojos; no puede leer mucho tiempo.

450. Sensacion de fatiga en los brazos, aun estando acostado.

El dolor del sacro va en disminucion, pero algunas veces alcanza hasta las vértebras cervicales.

Picor en los ojos.

Aparece en la muñeca un grupo de granos, sobre la cara esterna é inferior del radio; son vesiculares y semejantes á los que habia tenido á su llegada al Brasil.

Sensacion de abotagamiento en los ojos.

155. Latidos pulsativos en el sacro, sin dolor alguno.

Fisonomía pálida, ojos hundidos, con rubicundéz en los párpados.

Dia veinte.—Desde el dia diez y seis al veinte, estreñimiento absoluto de vientre.

Cámaras duras y difíciles.

El dolor del sacro ha disminuido mucho, pero aun siente fuertes latidos y pulsaciones en esta region, sin experimentar dolor.

160. Se ha levantado á las ocho, pero las piernas están débiles y la cabeza áturdida; se ha vuelto á acostar poco tiempo despues (á la una), con un gran frio en los piés.

Dolor contusivo en los huesos iliacos, pero no es constante.

El grupo de granos del brazo ha disminuido, y los pocos granos que quedan contienen un humor aguoso, que sale oprimiéndolos.

Sensacion de quebrantamiento en los músculos gluteos.

Pulsaciones ó latidos, muy fuertes y lentos en la region sacro-lumbar, sin dolor.

165. *Dia veintiuno.*—Noche agitada, sueños de crímenes, de cadáveres, de niños, unos con la cabeza ya cortada por la mitad, y otros á quienes se la veia cortar de la misma manera.

Dolor de quebrantamiento en los músculos gluteos, tan pronto en el lado izquierdo como en el derecho.

Dolor de igual índole en el sacro, con caloradas á la cara, á las nueve de la mañana, poco despues de haberse levantado.

Calambres en los dedos gruesos de los piés.

Palpitaciones en la sien izquierda.

170. Punto doloroso y sensacion de latidos entre los omoplatos.

Día veintidos.—Sueño voluptuoso, con polucion.

Caloradas á la cara, con opresion de pecho.

Dolor vivo y violento en el dedo grueso del pié derecho.

Torpeza constante en el sacro, pero menos sensacion de quebrantamiento en los músculos gluteos, debilidad en la articulacion de las rodillas con chasquidos, lo mismo subiendo que bajando escaleras.

175. Sensacion como si un líquido caliente fluyese de una llaga que tuviera en la region lumbar.

A las siete de la tarde, caloradas á la cara.

Debilidad en las piernas, al subir y bajar escaleras.

Día veintitres.—Noche agitada, gran calor con sudores toda la noche.

Sueño de trabajos y grandes ocupaciones.

180. A las dos de la tarde, desvanecimientos, ondulaciones delante de los ojos; turbacion de la vista al escribir.

Ve centellitas haciendo ziczac, lo mismo estando sentado que andando.

Debilidad en las piernas.

Pesadez sobre los párpados superiores.

Cefalalgia frontal.

185. Sensacion de presion en la frente, con frio húmedo en los piés y en las manos.

El dolor de cabeza se estiende hasta los arcos supraorbitarios y llega hasta los ojos.

Opresion en la garganta, á la altura de las anúgdalas; dura poco.

Los ojos están rojos, ojerosos; la fisonomía pálida, melancólica, ictérica.

El dolor de los riñones ha disminuido mucho, pero no puede permanecer de pié mucho tiempo sin experimentar cierta pesadez de estómago, que asciende hasta el pecho, con opresion.

190. La esclerótica está roja, inflamada y sus vasos capilares muy inyectados de sangre.

Sensacion de presion con latidos en la esclerótica.

Debilidad en la articulacion de la rodilla , al andar y subiendo y bajando escaleras.

Bostezos , cuatro horas despues de haber comido.

Dia veinticuatro.—Sueño agitado.

195. Ligero dolor punzante en la articulacion sacro-lumbar al subir escaleras.

Sensacion de opresion en el pecho.

Dia veinticinco.—Presion en la frente.

Calor en la region sacro-lumbar; opresion en el pecho y allujo de sangre hasta la laringe con caloradas á la cabeza; gusto á sangre y sensacion de arrancamiento en el pecho.

Dia veintiseis.—Sueño un poco agitado.

200. Pulsaciones y debilidad en la region sacro-lumbar.

Náuseas aun en ayunas, paseando en coche.

Calor en los riñones, despues de un largo paseo en carruaje.

Ligero dolor presivo en la frente y vértice de la cabeza.

Dia veintisiete.—Sueño agitado é interrumpido.

205. Latidos en la region lumbar con ligeros estremecimientos y sacudidas nerviosas.

Debilidad en la region lumbar.

Debilidad en la articulacion de la rodilla; sensacion como si se le dislocase , despues de pasear.

Dia veintiocho.—Sueño un poco agitado; sueña que ve animales feroces devorando las carnes que hay en una carnicería del mercado público.

Sensacion de calor con pulsacion y cansancio en la region lumbar y encima de los huesos ileos.

210. Palidez , frio en las manos y los pies, con debilidad general, mientras duran los dolores.

Dia veintinueve.—Sueño de revolucion , de fuego de fusilería, de demolicion de edificios públicos, sobre cuyos escombros iba marchando.

Sentimiento de bienestar, por la mañana al levantarse.

Boca pastosa todas las mañanas , con esputos color de chocolate con leche y olor fétido.

Por la mañana, esputo de sangre, que parece venir del fondo de la garganta.

215. Hinchazon de la parte esterna de la encía inferior del lado izquierdo, con dolor de muelas del mismo lado.

Granos pequeños en la rodilla derecha, con sensacion parecida á la que produce un herpe, con picor muy doloroso al tacto. Comprimiendo estos granos, dejan escapar un poco de líquido. Picor en la parte anterior de las piernas.

Dia treinta.—Continúa la hinchazon de la encía, pero es menos fuerte el dolor de las muelas.

La mejilla amenaza hincharse.

Gusto muy pronunciado á sangre en la boca y la garganta, con sensacion de arañamiento al respirar.

220. A las diez, dolor de cabeza como si tuviera un clavo introducido en el vértice, con gran dolor de dientes é hinchazon de la encía, despues de haber paseado. Latidos en todo el lado izquierdo de la cara, hasta el ojo.

Frio húmedo, continuo, en los piés y generalmente por todo el cuerpo, con debilidad.

Embarazo gástrico. Parece que no digiere el almuerzo sino con gran dificultad; sin embargo, come con buen apetito desde el dia veinticuatro.

Dia treinta y uno.—Noche agitada.

Erecciones insoportables, sueños eróticos y poluciones.

225. Gruesos granos en las piernas, alrededor del bulbo de cada pelo.

Por la noche, granos muy inflamados, grandes de un centimetro, como picaduras de abispa, con gran picor y escoriacion, inmediatamente despues de haberlos tocado.

Dia treinta y dos.—Debilidad con dolor en la region lumbar.

Gran embarazo gástrico, todos los dias despues del almuerzo.

Violento dolor de cabeza en el lado izquierdo.

230. *Dia treinta y tres.*—Dolor de luxacion y de arrancamiento en la region dorsal, al sentarse (dura un minuto).

Esputos sanguinolentos muy abundantes, con sensacion de

escoriacion en la garganta y las vias respiratorias, después de haber hablado mucho rato.

Contraccion nerviosa de la piel de la frente.

Erupcion de granos por todo el cuerpo de la misma naturaleza que los del dia treinta y uno; caloradas que suben hasta la faringe.

Dia treinta y cuatro.—Gusto á sangre en la boca durante el coito. Esperma de color amarillo de limon.

235. Demacracion general.

Imposibilidad de encorvarse hácia adelante: no puede marchar sino inclinándose hácia atrás: por poco que se eche hácia adelante siente fuertes sacudidas en la region lumbar, que le obligan á enderezarse.

Dia treinta y cinco.—Embarazo gástrico despues de almorzar hasta las cuatro de la tarde.

Gran irritabilidad: se impacienta por la cosa mas pequeña.

Dia treinta y ocho.—Deseos frecuentes de orinar.

240. Orinas claras; mas tarde, se reproduce el dolor sacro-lumbar.

Sensacion de desgarradura en los riñones; dolor escesivamente vivo con desfallecimiento y palidez de la cara.

Dia cuarenta y seis.—Sudor frio por la noche.

Dia cincuenta y cinco.—Cara palida, enfermiza; ojos muy sensibles á la luz.

Lábios rojos.

245. Demacracion considerable.

Debilidad en la region sacro-lumbar.

Vista turbada y picazon en los párpados.

(Desde esta época convalecencia gradual).

Segundo experimentador: CH. DIEUDONNE JOLY.

Veinticuatro años, temperamento sanguíneo-nervioso, constitucion robusta.

A las ocho de la noche toma una dosis de asacú á la quinta dinamizacion.

Dia primero.—Inmediatamente, contraccion de las papilas de la lengua.

250. Aturdimiento de cabeza.

Dolor vivo en el riñon derecho con gran necesidad de orinar, á las nueve de la noche: dura dos minutos.

Dia segundo.—Por la mañana, al andar, dolor de luxacion en la articulacion coxo-femoral izquierda durante algunos segundos.

Escozor en el borde de los párpados, todo el dia.

Cara macilenta, ojos muy sensibles á la luz.

255. Punzadas en los dedos indice y pulgar de la mano izquierda.

Punzadas menos sensibles en la mano derecha.

Picor en el hipocondrio derecho y la pantorrilla izquierda.

A las ocho de la noche, sensacion de picadura en el indice derecho.

A las diez, sensacion como si tuviera arena en el ojo izquierdo.

260. *Dia tercero.*—Polucion nocturna.

A medio dia, estornudos y moqueo, como un principio de coriza.

A las dos, rubicundez muy pronunciada é insensibilidad casi completa de ambos lados del cuello, sobre los músculos esterno-mastoideos; se ha pinchado con un alfiler, y hasta despues de una hora no ha sentido dolor.

Dia cuarto.—Insomnio por la noche y soñolencia por el dia; lividez de la cara á medio dia.

265. Escozor en los párpados del ojo izquierdo, á las nueve de la noche.

Dia quinto.—Principio de hemorragia nasal, á las siete de la mañana.

Sensacion como por una picadura de insecto, en la eminencia hipotenar de la mano derecha.

Ligero dolor en el dedo de en medio de la mano izquierda.

Dia sexto.—Escozor en el borde de los párpados del ojo izquierdo.

270. A medio dia, aparece un grano en la parte derecha inferior de la mandibula (encia).

A las diez de la noche, estando acostado, picor y escozor en el punto lacrimal y el párpado inferior del ojo izquierdo.

Dia sétimo.—A las dos de la tarde, dolor presivo debajo de las costillas falsas derechas, durante un minuto.

Dia décimo.—A las tres de la tarde, ligeros cólicos y náuseas; aturdimiento de cabeza y debilidad de las piernas.

275. *Dia once.*—A las cinco, hipocondria, tristeza, desesperacion; se cree rechazado y abandonado de los suyos.

Dia doce.—Fatiga y debilidad de la vista.

Dia trece.—Vista débil, inyeccion de la esclerótica, dificultad para leer.

Fatiga de los miembros superiores é inferiores.

Dia catorce.—Ojos cansados, vista débil.

280. Dolor por punzadas sordas en los músculos dorsales de torax. Este dolor, que mas parece interno que externo, impide la respiracion.

Dia quince.—Cansancio en los ojos, presion sobre la parte superior de las órbitas.

Incomodidad en la cabeza.

A las nueve de la noche, dolor punzante en los músculos biceps y triceps braquial. El mismo dolor en el músculo trapecio, entre el omoplato y la columna vertebral.

Irritacion y sequedad de la garganta, que obliga á toser.

285. Sequedad de la glotis, que hace toser como en un catarro.

Dia diez y seis.—Picor en el borde de los párpados.

Dia diez y siete.—Sensación como si las orejas se hubiesen tapado, despues como si entrasen columnas de aire en el oido izquierdo, durante dos ó tres segundos.

Pequeños granos escocientes en la parte inferior de la pierna derecha.

Dia veintitres.—Diarrea.

290. *Dia veintisiete.*—Polucion nocturna.

Aturdimiento frontal.

Calor en la cabeza.

Dolores en la region ileo-cecal, que se reproducen muchas veces por el movimiento y la progresion :

Ligeras náuseas.

293 *Dia treinta.*—Dolor de fatiga, sensible á la presion, en la parte esterna del músculo crural izquierdo.

Dia treinta y uno.—El dolor del músculo crural esterno se hace muy pronunciado y continúa todo el dia.

Dia treinta y dos.—Violento dolor de cabeza en la region parietal izquierda.

Dia treinta y tres.—Dolores parciales de cabeza.

Dia treinta y cuatro.—Por la noche, ligero dolor de cansancio en los músculos lumbares.

300. *Dia treinta y cinco.*—Por la mañana continúa el dolor de los músculos lumbares.

A las nueve de la noche, ligero dolor de cansancio con una fuerte punzada, que dura un segundo, en la region lumbar.

A las diez, punzada en el dedo grueso del pié izquierdo.

Dia treinta y seis.—A medio dia, fuerte dolor punzante en el dedo grueso del pié izquierdo.

Gran apetito, desde dos ó tres dias antes.

303. *Dia treinta y siete.*—Cámaras duras, escasas y dificiles.

Distraccion.

Ineptitud para el trabajo.

Carácter displicente, intolerante.

Rubicundez de los párpados.

310. Pereza, fatiga general.

Bostezos continuos.

Día treinta y ocho.—Hambre á las dos horas de una abundante comida.

Tension en el estómago, por la noche.

Día treinta y nueve.—A las cinco de la mañana, hambre devoradora con dolor tensivo y presivo en el estómago: estando acostado, se estienden los dolores hasta la region umbilical.

315. Continúa el dolor al marchar; presion despues de haber comido; sensacion dolorosa de hambre, sin tenerla en realidad.

Dolor de estómago muy fuerte, con hambre continua.

Deseo frecuente de orinar.

Las orinas depositan un sedimento blanco.

A medio dia, dolor presivo de estómago, antes y despues de haber comido.

320. Fuerte dolor punzante en la cara anterior del pulmon derecho, que impide respirar profundamente.

Gran distraccion; comete frecuentes equivocaciones, tomando una fecha por otra, un mes por otro, julio por setiembre, durante muchos dias seguidos.

Equivoca dos veces seguidas las calles por donde vá.

(Durante los últimos dias de la esperimentacion; emision frecuente de orina con depósito de sedimento blanco).

Tercer esperimentador: MME. AL. J.

Veintiseis años, temperamento sanguíneo, buena constitucion.

Día primero.—A las diez de la noche, tomó una dosis de hura, quinta dinamizacion.

Por la mañana al despertar, boca pastosa y gran deseo de dormir.

325. Sueña con muertos y entierros.

Dolor en la lengua y granos pequeños en su borde izquierdo.

Calor quemante en el estómago.

Rigidez en la nuca.

Debilidad en las piernas y los brazos.

330. A las dos de la tarde, náuseas.

Fiebre; cara roja-escarlata; manos calientes, quemantes.

Abatimiento, deseo de no hacer nada; no hay cosa que le agrade.

Manchas blancas sobre la lengua.

Deseo frecuente de orinar.

335. Sensacion de cansancio en todo el cuerpo.

Sensacion de dolor con calor en el sacro.

Dia segundo.—Dolor lancinante en zic-zac en la matriz, por la mañana á las seis y media.

Aparicion de flores blancas poco abundantes.

Tos seca.

340. Dolor en el empeine y sensacion de compresion como en los dolores de parto.

Sensacion de una punzada que parte de la region lumbar hasta el coccix.

Dia tercero.—Noche agitada; se despierta con frecuencia.

Al despertar, sensacion de cansancio, de corvadura.

Dolor agudo en la palma de la mano izquierda, partiendo del índice y describiendo un círculo hasta la articulacion carpiana del pulgar.

343. Muy grande fatiga, sobre todo en la pierna izquierda, hasta el punto de no poder andar.

En la noche del segundo al tercer dia, cólicos con retortijones, á las doce y media.

A la una, fuerte diarrea con dolores semejantes á los que sufrió á su vuelta de un viaje al Brasil; las materias escretadas son tambien de la misma naturaleza y en un todo semejantes.

Cámaras fétidas, con pequeñas lombrices blancas en los excrementos.

Dia cuarto.—Calor en las manos y en las corvas por la mañana.

350. Continúa la diarrea , precedida de gran dolor en el pecho.

Coloracion violácea de las mejillas.

Calor en las mejillas y las sienes.

Rubicundez de la frente.

Pêqueñas vesículas miliares en ambas mejillas y la frente.

355. Indiferentismo ; no se fija en nada ; todo lo hace maquinalmente.

Dia quinto.—Sueña con cementerios y que coloca cirios sobre las tumbas.

Al despertar , cara roja-escarlata , abotagada.

Pequeñas escoriaciones en la parte superior de la mejilla derecha , análogas á las que ya padeció á su vuelta al Brasil , y que fueron seguidas de un herpe costroso enorme.

A las dos , calor insoportable en el pecho , dolor muy violento y sensacion de quemadura sobre el esternon.

360. *Dia sexto.*—Sueño muy agitado.

A las doce y media , escitacion nerviosa , impaciencia.

Calor seco en las manos.

Dia sétimo.—Pequeño grano vesicular en la muñeca derecha.

Sensacion muy pronunciada de pesadez , que partiendo del parietal , se dirige por la insercion inferior del músculo esterno-mastoideo á la parte superior del esternon.

365. La pesadez viene repentinamente á la frente , á las dos y media.

Pequeño grano en la muñeca derecha , rojo en su base y lleno de un liquido trasparente.

Dia octavo.—Insomnio completo.

Dolor de torcedura , en el lado izquierdo , ó lancinante , como por heridas de bisturí sobre el sacro , con punzadas muy dolorosas ; el dolor le arranca gritos , aunque pasa velozmente , á las nueve de la mañana.

Calor quemante por todo el cuerpo.

370. *Dia nueve.*—*Dolor de torcedura en la articulacion escápulo-humeral.

Dolor muy vivo debajo de la mama.

A las doce y media del dia , el dolor de la articulacion escá-

pulo-humeral se renueva de tiempo en tiempo con gran violencia.

A las cinco de la tarde, el dolor es continuo, pero menos violento, y conservando siempre el mismo carácter.

A las nueve y media de la noche, erupcion miliar en la cara.

375. Pequeños granos rojos en la mejilla derecha, con sensacion de escozor, desde las siete de la mañana.

Erupcion miliar en los hombros con picor, por la noche.

Granos vexiculares, rojos, que destilan á la presion un liquido muy claro.

Dia décimo.—Aturdimiento de cabeza por la mañana al levantarse.

Rubicundez de la cara. Los granos van desapareciendo.

380. Dolor de estómago, como por hambre, sin tenerla realmente.

Se traga la saliva.

Necesita comer para calmar el dolor.

Dia once.—Dolor de cabeza, latidos en la frente durante una gran parte de la noche.

Continúa por la mañana el dolor de cabeza con aturdimiento.

385. *Dia doce.*—Pequeños granos en la espalda con prurito.

Granos rojos, vexiculares en la espalda.

Hemorragia por la nariz, á las ocho.

Cámaras duras y dificiles, durante ocho dias.

Hemorragia por la nariz, á las diez y media.

390. *Dia trece.*—Agitacion por la noche, sueño de viaje marítimo.

Aturdimiento de cabeza, epistaxis considerable al levantarse.

Dolor de cabeza, aturdimiento con latidos en la frente, todo el dia.

Granos en los hombros, gruesos, rojos, con picor al tocarlos.

Punzada, como picadura de insecto, en el dedo pequeño de la mano izquierda; se repite tres ó cuatro veces.

395. *Dia catorce.*—Gran color y rubicundez en la cara.

Granos rojos con prurito en los hombros.

Dia quince.—Sensacion de arena en los ojos.

Rubicundez general de la cara, inyeccion de la esclerótica y los párpados.

Granos rojos con escozor en la parte exterior de los muslos.

400. *Dia diez y seis.*—Sensacion dolorosa aguda, despues dolor vivo lancinante en el corazon.

Dia diez y siete.—A las ocho de la mañana, dolor agudo, lancinante por accesos, tan pronto débil como violento, en el lado derecho del sacro.

A las diez de la noche, torticolis del lado derecho.

Dia diez y ocho.—Estando medio dormido, sensacion como si estuviera suspendido á tres piés de tierra.

Sensacion como si hubiera caido en una zanja.

405. Gran frio por la noche, alternando con gran calor.

Dia diez y nueve.—Dolor agudo en la cadera derecha, á las nueve de la mañana.

A las nueve de la noche, reaparece el mismo dolor, y continúa presentándose á la misma hora muchos dias seguidos.

Dolor compresivo en la matriz.

Dolor en el corazon, muy agudo algunos momentos y otros insoportable.

410. Dificultad de la respiracion con dolor, que le causa grande inquietud.

Dolor lancinante de cabeza.

Dia veinte.—Dolor en la rodilla izquierda, como si fuera á desarticularse.

Dia veintiuno.—Cólicos y diarrea: cinco deposiciones en el dia.

Dia veintidos.—Noche agitada.

415. Dolor por la noche en las caderas y sobre los ovarios.

Punzadas violentas con picor; despues, dolor lancinante en la vagina; aparicion de las reglas, pero poco abundantes.

Dia veintitres.—Dolor en la matriz, como si le metieran un instrumento córtante.

Dolor lancinante debajo de la mama izquierda.

Dolor pulsativo, intermitente, en el dedo pequeño del pié

derecho , con insoportable picor , á las diez y media de la noche.

420. *Dia veinticuatro.*—Sueño interrumpido por el violento picor de unos granillos sobre los hombros.

Por la mañana reaparece el dolor del dedo pequeño del pié, pero dura menos tiempo que el dia anterior.

Dolor de riñones y sensacion de cansancio en la region del sacro.

Dolor, frio y torpeza en la cadera izquierda.

Dolor como por alúlerazos en la muñeca y dorso de la mano izquierda, entre los dedos medio y anular.

425. *Dia veinticinco.*—Punzadas debajo de la mama izquierda, que dificultan la respiracion, lo mismo al andar que estando sentada.

Dolor muy fuerte al respirar.

Dia veintiseis.—Chasquido de la rodilla izquierda al andar, y sensacion como si fuera á desarticularse.

Dia veintiocho.—Noche agitada.

Deseo de llorar.

430. Fiebre, imposibilidad de cerrar los puños.

Pensamientos tristes, penosos.

Dia veintinueve.—Sensacion como si estuviera suspendida en el aire.

Insomnio completo.

Estremecimientos en la cama.

435. Sensacion como si cayera á tierra.

Dolor lancinante, continuo, tan pronto débil como fuerte, encima del corazon.

Mala digestion, incomodidad de estómago, toda la noche.

Dia treinta.—Noche agitada, estremecimientos durmiendo. Sensacion de cansancio en la region lumbar, toda la noche.

440. Dolor en el sacro como por un golpe contundente, que va en aumento hasta las cuatro de la tarde.

Presion sobre el sacro, con fatiga del muslo izquierdo.

Pesadez en el sacro estando sentada.

Sensacion como si bulleran gusanos en la parte posterior y esterna del sacro.

Dia treinta y uno.—El dolor del sacro, que sube y baja desde este punto hasta el muslo izquierdo y viene acompañado de castañeteo de dientes con palabras entrecortadas y frio en las manos y piés, la obliga á estar encorvada.

445. Dolor de hormigueo y torcedura pasagero en la pierna derecha, á las tres de la tarde, estando acostada.

Dolor de torcedura desde el sacro hasta la pierna izquierda, que la obliga á acostarse.

A cada acceso, escita el dolor una risa nerviosa con lamentos, como un niño enfermo.

Sensacion como si le hubieran mordido perros en la parte dolorida.

Sensacion como si tuviera un parche adherido sobre los riñones.

450. El dolor descende á todo el muslo.

Manchas violaces en la cara: desde el principio de la experimentacion ha conservado buena coloracion: ahora está con frecuencia pálida.

No puede andar sin temor de caer.

Generalmente desconfianza del porvenir: lloros y lamentos; piensa en la muerte, pero sin temerla.

El dolor del sacro se aumenta estando sentada, y le obliga á acostarse.

455. *Dia treinta y dos.*—Ha dormido por la noche, pero al levantarse ha reaparecido el dolor de riñones.

El dolor ocupa la region sacro-lumbar, pero se estiende hasta los músculos glúteos, con sensacion como si le hubieran mordido perros.

El pulgar de la mano derecha parece como entorpecido algunos momentos.

Dia treinta y tres.—Dolor en la columna vertebral.

Sensacion de desarticulacion con dolor en los músculos glúteos, como el dia anterior.

460. *Dia treinta y cuatro y treinta y cinco.*—Sensacion de torcedura en la ingle.

Epistasis estando acostada.

Erupcion considerable de pequeños granos vesiculares en todo el cuerpo, con manchas rojas, como si se hubiera rascado mucho.

Granos gruesos en las piernas, como picaduras de mosquitos.

Sensacion en los riñones y en los glúteos, como si le hubiera mordido un perro.

465. Estornudos sucesivos durante dos horas.

Dia treinta y siete.—Sensacion en los muslos como si le mordieran perros.

Los granos aumentan con la elevacion de la temperatura y dejan grandes manchas rojas alrededor del sacro y debajo de las caderas.

Despues de los dolores del sacro, le es imposible dormir ni echarse sobre el vientre.

Dia treinta y ocho.—Impaciencia; alguna vez se echa á llorar en la calle.

470. Dolor muy fuerte de cabeza, como un circulo que rodara muy de prisa sobre la frente.

Aberraciones de la memoria.

Hemorragia abundante por ambas ventanas de la nariz.

A la hemorragia precede olor á sangre.

Cara encendida, con pequeños granos entre el cutis y la carne.

475. Calor en la cara.

Sensacion como si la piel de la cara estuviese muy tirante.

Emision frecuente de orina clara y descolorida.

Sensacion de frio en la corva y pierna derecha.

Dia treinta y nueve.—Sensacion de frio con punzadas en el músculo crural esterno de la pierna izquierda.

480. *Dia cuarenta.*—Sueño de muertos, de asesinos, de bueyes corrompidos, de agua amarilla.

Epistasis continua ó muy frecuente, sobre todo por la mañana.

Los dolores de los riñones van desapareciendo.

Día cuarenta y tres.—Palpitaciones nerviosas en el párpado inferior del ojo izquierdo.

Día cuarenta y cinco.—Afluencia de ideas tristes; cree que vá á perder alguna persona querida.

485. Llora á cada momento, y cree ver muerto uno de los suyos.

Día cincuenta y ocho.—Sensibilidad dolorosa de toda la mitad derecha de la cabeza, sobre todo al tacto.

Punzadas en las mandíbulas, dolor en el brazo derecho.

Impaciencia, cólera; se muerde las manos, porque las ideas se presentan con lentitud á su imaginacion.

Se le figura que tiene hinchada la mitad de la cabeza.

Cuarto experimentador: Mlle. E. R.

Diez y siete años, temperamento sanguíneo, constitucion regular.

490. A las ocho de la mañana, dolor en el músculo hipotenar de ambas manos.

A las nueve y media, tristeza y suspiros frecuentes.

A las diez, adormecimiento del índice de la mano derecha, de minuto en minuto.

A las diez y media, piés frios y húmedos; despues de tres horas, calor.

A las once y media, punzadas en las dos últimas muelas inferiores del lado izquierdo. Sensacion de adormecimiento en la flexura del brazo derecho.

495. Punzada en el índice de la mano derecha, y principalmente en la articulacion de la última falange.

Sensacion de un tumor de dos centímetros de diámetro debajo de la mama izquierda. Al mismo tiempo, punzadas durante cinco minutos en el hombro derecho.

A medio día, roseta muy colorada en la parte inferior de la mejilla izquierda.

A las doce y media, calor en la cara durante una hora.

Granos rojos, pequeños, con un punto blanco en el centro, en la parte inferior de la mejilla izquierda.

500. A las dos, latidos en el índice de la mano derecha.
 A las dos y media, punzadas en las encías.
 A las cuatro y cuarto, dolor en las encías que se irradia hasta el ojo izquierdo, con calor en la cara.
 Ardor en la mejilla izquierda, pesadez sobre los ojos, dolores punzantes en las orejas.
 Dolor en el maleolo esterno, como si estuviera quebrantado.
505. A las nueve y media de la noche, cefalalgia frontal.
 Sudor frio en la cara.
 Presion sobre las órbitas como por una violenta cefalalgia.
 Dolor en los dientes y encías, al apretar las mandibulas, estendiéndose hasta la nariz.
 Dolor en las muelas del lado izquierdo.
510. *Dia segundo*.—A las seis y media, lengua blanca.
 Dolor débil que empieza debajo de la oreja izquierda y se corre despues hasta la órbita del mismo lado.
 Grano pequeño con picor en la parte interna del codo derecho.
 A las siete y media, punzadas en el costado derecho, de segundo en segundo.
 Frio en los piés.
515. A las ocho, dolor en el brazo, como si hubiera estado mucho tiempo estendido: dolor contusivo en el dorso de la mano derecha, principalmente en el dedo medio.
 Punzadas en las encías del lado derecho.
 Escozor en la frente.
 Pequeños granos en la frente.
 Caloradas en el pecho, sobre todo cuando sufre alguna contrariedad.
520. Las caloradas suben y bajan repentina y alternativamente.
 Calor, que sube á la cara.
 Dolor en el esternon.
 Punzadas en las sienes.
 Dolor en las encías del lado izquierdo.
525. Desaliento, ineptitud para todo.

Pesadez en los brazos.

Caloradas en el pecho.

A las diez de la noche, dolor en las órbitas como por una violenta cefalalgia, ó como cuando se fija la vista seguidamente por mucho tiempo en un mismo objeto.

Día tercero.—A las seis y media de la mañana, hinchazon de la mejilla derecha, sin haber sentido dolor de muelas.

530. Grano muy rojo con gran picor en la mejilla izquierda y en el lado izquierdo del cuello.

A las nueve, latidos en el lado derecho del pecho, casi debajo de la axila.

A las tres y media, dolor en la muñeca derecha; todas las venas y las fibras le hacen daño.

A las ocho y media, opresion en el estómago.

Cólico con retortijones.

535. A las nueve, calor en la cara.

A las diez y media, gran deseo de llorar.

Desde que tomó el medicamento, la menor cosa le contraría, la produce opresion y la escita á llorar; á cada momento se pone colorada, suspira hondamente y muchas veces al dia.

Cóme con menos apetito que antes de haber tomado el medicamento.

Dolor en el pecho correspondiendo á la mano izquierda, estando acostada. El dolor pasa insensiblemente al costado derecho.

540. *Día cuarto.*—Desde el primer dia, se despierta antes de lo que acostumbraba. Tenia el sueño pesado y no podia abrir los ojos.

Ahora los abre muy fácilmente y la imaginacion se pone en actividad al instante.

A las cinco y media, escalofrio general, opresion y deseo de llorar.

Cólicos, con frio en los piés.

A las ocho y media, escalofrios en las piernas, continúa el frio en los piés y la opresion de pecho.

543. A las nueve y cuarto, picor en el borde izquierdo de la lengua, que le hace venir mucha agua á la boca.
 Dolor nervioso que parte de las órbitas, sube á la frente y desaparece en seguida.
 Suspira mucho.
 A las diez, incomodidad de estómago, como si tuviera mucha hambre, cuando ordinariamente no la siente hasta medio dia.
 Hambre, algunas veces inmediatamente despues de haber comido.
550. Dolor, como si le oprimieran sobre una llaga muy dolorosa detrás de la oreja izquierda, en el cuello y sobre la laringe, que se aumenta volviendo á uno y otro lado la cabeza.
 A las diez y media de la mañana, piés muy frios.
 A las once, hambre con dolor de estómago.
 Compresion en la raiz de la nariz, durante un momento.
 Punzadas que recorren toda la cara, con compresion de la cabeza, que parte de las sienes.
555. Dolor contusivo debajo de las costillas falsas del lado derecho.
Dia quinto.—Opresion que le impide respirar, á medio dia.
 Opresion en el pecho, que le obliga á suspigar mucho.
 Aturdimiento de cabeza.
 A partir desde el vértice, toda la cabeza y la cara le incomoda horribilmente.
560. Dolor contusivo entre los dedos anular y auricular de la mano derecha, que sube hasta el codo, y dura un instante.
 Compresion de la parte posterior de la cabeza.
 Dolor de fatiga alrededor del cuello.
 Deseo frecuente de orinar.
 Rubicundez muy pronunciada de la mejilla izquierda.
565. Rubicundez de las alas de la nariz.
 Escalofrios en la espalda y las piernas, durante el almuerzo.
 A las cinco, opresion y suspiros.
 Dolor en la articulacion de las mandíbulas y en las orejas despues picor en las últimas.

A las cinco y cuarto, cólico y escalofrios.

570. A las ocho, dolor de fatiga entre los omoplatos.

A las nueve de la noche, opresion en el pecho.

Suspiros frecuentes.

Temblo interior.

Sudor frio en los piés.

575. A las diez y media, grano, rojo, grueso sobre el hombro derecho; veinte minutos despues de haberse acostado, gran calor en los piés.

Dia sexto.—Cólico con diarrea y temblor interior.

A las seis y media, escalofrios.

Mancha roja con picor en el antebrazo derecho.

Punzadas en las encías del lado izquierdo, que suben hasta la oreja derecha.

A las ocho y cuarto, mancha roja, como una picadura de pulga sobre el dorso de la mano izquierda.

580. Risa nerviosa, que la produce escalofrios.

Frio en los piés, escalofrio en la pierna izquierda.

A las ocho, chasquido en el antebrazo derecho.

Punzadas en las encías del lado izquierdo, estendiéndose hasta la oreja derecha.

A las ocho y cuarto, mancha roja, como picadura de pulga, en el dorso de la mano izquierda.

585. Aturdimiento de cabeza y pesadez sobre las órbitas.

Gran frio en los piés, mas en el izquierdo que en el derecho.

A las nueve, opresion en el pecho con suspiros frecuentes.

A las once, pesadez en las órbitas, como si tuviera mucho sueño.

Dolor calambroide en la muñeca derecha, que se estiende primero al brazo y despues á la axila.

590. Indigestion.

Opresion y suspiros.

Temblo en el brazo derecho, latido en la parte anterior de la muñeca.

A las once y cuarto, dolor reumático en el hombro derecho.

Pequeños granos, rojos, vexiculares, pruritosos, en la barba.

595. Dolor, como por falsa posicion, en el lado derecho del pecho, debajo de los brazos.
 Latidos dolorosos debajo de la mama derecha.
 Punzadas dolorosas en toda la cabeza, estendiéndose á la oreja y dientes del lado izquierdo, y pasando luego á la parte superior de la órbita.
 A medio dia, sueño.
 Dolor entre los omoplatos, que se aumenta apoyándose sobre el esternon.
600. Dolor contusivo en la pierna izquierda.
 Dolor en las mamas, que se estiende hasta los brazos.
 Gran hambre, y apenas ha probado el alimento, cuando se ha saciado.
 Gran picor en el maleolo esterno del pié derecho.
 Entorpecimiento de todo el brazo derecho hasta el indice; todos los músculos están doloridos.
605. A la una, picor en las plantas de los piés, como por millares de hormigas.
 A la una y media, dolor contusivo en la espalda, en las nalgas y en los riñones, como si hubiese sufrido un golpe.
 Fuerte presion en la sien izquierda.
 A las dos, deseo de dormir.
 A las tres y media, cólico.
610. A las cuatro, latidos en la parte esterna de la muñeca derecha.
 Estremecimiento nervioso, que recorre el pecho en todos sentidos y pasa luego entre los omoplatos.
 Punzadas en el lado izquierdo de la cabeza, que se estienden al ojo, las sienes y hasta debajo de la oreja y la mandíbula inferior.
 Silbido de oídos.
 Incomodidad de estómago, parecida al hambre.
615. Punzada en la mama izquierda.
 Punzada en la primer falange del dedo de enmedio.
 A las cuatro, dolor de las muelas del lado izquierdo, con correspondencia á los ojos.

- Muy fuerte dolor de cansancio en la espalda y region lumbar.
Dolor de estómago, opresion, suspiros.
620. Punzadas en las encías del lado izquierdo.
A las cuatro, latidos en el maleolo interno de la pierna derecha.
Punzadas en toda la mandibula.
Rubicundez y calor en la cara, y mucho mayor en las mejillas y la frente.
A las ocho y media, opresion é incomodidad de estómago, como si tuviera hambre.
625. *Dia sétimo.*—A las seis, cólico, diarrea y escalofrios.
A las ocho, alegría exagerada y gran deseo de reir; despues escalofrios en la cabeza y las piernas.
Frio en los piés.
Punzada en las encías inferiores del lado izquierdo, obturacion de la nariz, con correspondencia á la mandibula.
Se halla muy afectada, como si previera una gran calamidad.
630. Dolor nervioso encima de la flexura del brazo derecho, descendiendo hasta los dedos anular y auricular, á las once y media.
Dolor presivo sobre el hombro izquierdo, muy sensible al tacto, á las once de la mañana.
Latidos debajo del omoplato derecho.
A las once de la mañana, punzadas en las encías y en el ojo izquierdo.
Rigidez del cuello: todos los movimientos le corresponden dolorosamente á la nuca y las encías.
635. Pesadez en los ojos y la cabeza.
Entorpecimiento en la nuca.
Sensacion como si una barra le atravesara las mandibulas de una á otra oreja, con opresion en la cabeza.
Opresion en la raiz de la nariz.
Dolor en la muñeca izquierda.
640. Dolor de dientes al masticar.
Dolor en la espalda, casi debajo del hombro derecho, acompañado de latidos en el pecho.

Frio en los piés, á la una.

Latidos en el lado derecho del pecho.

Calor en la cara y deseo de dormir despues de comer.

645. Pesadez sobre las órbitas.

Dolor en el costado, con punzadas en la mama derecha.

Dolor por bajo de la flexura del brazo derecho, aumentado por el movimiento.

Latido en la estremidad del índice derecho.

Caloradas á la cara, con profundos suspiros.

650. Cólicos, bostezos frecuentes.

Latidos en el borde izquierdo de la lengua.

A las dos y media, dolor de riñones, estando sentada.

Gran calor y dolor en los dedos de los piés.

Dolor y entorpecimiento desde la muñeca hasta la parte superior del brazo derecho.

655. Rigidez y latidos en el lado izquierdo del cuello, sobre todo al volver la cabeza.

A las ocho y media de la noche, latidos sobre la órbita del ojo derecho; despues, en ambos lados.

Latidos en la raiz de la nariz.

Dolor en el costado derecho, que le impide respirar.

A las diez y cuarto, dolor presivo y contusivo en el costado derecho.

660. Dolor de fatiga, en el hombro derecho.

Aturdimiento de cabeza; el menor movimiento se corresponde á los ojos y sobre las órbitas.

Punzadas en las encias y calor en la cara.

Dia octavo.—A las seis, cólicos y diarrea.

A las diez de la noche, punzadas en la mama izquierda.

65. Dolor de riñones.

A medio dia, grano en el lado izquierdo de la frente.

A las dos, gran calor en la cara.

A las cuatro, latidos sobre la órbita del ojo derecho, y alguna vez, sobre la del izquierdo.

A las seis de la tarde, dolor en el costado derecho, que impide la respiracion.

670. A las siete de la tarde, tristeza y deseo de llorar.

La sangre le sube á la cabeza.

Gran calor en la cara.

A las diez, epistaxis.

A las once, frio húmedo en los piés, estando acostada.

675. Poco tiempo despues, calor en los piés.

Dia noveno.—A las seis, dolor en la parte esterna y superior del muslo derecho, que le hace cojear un poco.

Dolor en la mama izquierda.

A las siete y media, deseo de llorar, y opresion de pecho como por una fuerte emocion moral.

A las ocho y media, continúa aun el deseo de llorar, y la cosa mas insignificante le impresiona y entristece; una puerta que se ha abierto bruscamente, le ha producido un gran estremecimiento.

680. Respiracion dificil.

Dolor en la muñeca derecha, correspondiendo á todos los dedos.

Calor en la cara.

Deseo extraordinario de llorar, aun cantando; despues, sofocacion y llanto, á las nueve y media de la mañana.

Fuerte dolor nervioso, desde el hombro hasta la mama izquierda.

685. Dolor en la flexura del brazo derecho.

A la una menos cuarto, pesadez sobre los ojos, sueño.

Latidos en el lado izquierdo del abdómen.

Latidos en el epigastrio, que se estienden á todo el pecho.

Deseo frecuente de defecar, pero sin resultado.

690. Dolor como si le aserrasen el cráneo por encima de las orejas, con entorpecimiento de la mandibula.

Pesadez en toda la cabeza.

Punzadas en la encía inferior izquierda; poco despues, punzadas en la encía superior.

Rigidez en la nuca.

Calor en la cara.

695. Silbido muy fuerte en el oido izquierdo.

Sueño.

Las encías están doloridas.

Suspira profunda y frecuentemente, y baila mucho.

Caloradas á la cara de rato en rato.

700. Dolor en la encía izquierda, que se estiende hasta el ojo y detrás de la oreja.

Gran calor y falta de apetito, á la una.

Punzadas en las encías, que corresponden dolorosamente á toda la cabeza.

Violentos latidos en la sien izquierda.

Entorpecimiento de la muñeca derecha y dolor en toda la mano.

705. Vivo dolor en la encía izquierda y entorpecimiento del mismo lado en toda la cabeza.

A las tres de la tarde, manos calientes y sudor frio.

Dia décimo.—Sensacion de torpeza en la cabeza y adormecimiento de la encía superior y los músculos del ojo.

Dolor en el muslo derecho, á la una.

A las dos, presion en el epigastrio; se encuentra muy conmovida, como si previera una gran desgracia.

710. Dolor en la oreja derecha.

Dolor en la mejilla y encía izquierda.

Latidos en el brazo y la muñeca derecha.

Pesadez sobre la órbita del ojo derecho, á las tres de la tarde.

Inapetencia.

715. A las seis y media de la tarde, sudor frio en la cara.

Sofocacion.

A las ocho y media de la noche, sueño.

A las nueve, gran calor en la cara.

Dia once.—Sueño agitado.

720. A las seis de la mañana, boca pastosa.

Inflamacion del punto lagrimal del ojo izquierdo.

A medio dia, dolor en las encías y en la mejilla derecha.

De la una á las cuatro de la tarde, ardor en las mejillas.

Dia doce.—A las seis de la mañana, granos pequeños en la cara.

725. A las nueve de la mañana, dolor en los riñones.
 Debilidad en las piernas.
 Latidos en la parte superior y posterior del muslo derecho.
 A las once de la mañana, dolor en las encías.
 A las dos de la tarde, dolor y latidos debajo del hombro izquierdo.
730. A las ocho, pequeños granos con mucho picor en el labio inferior.
 A las ocho y media, cólico y sudor frío.
Día trece.—Ojos hinchados y sensibles á la luz.
 Cólico con diarrea.
 Agitacion en la cama.
735. Flores blancas.
 La menstruacion se adelanta ocho dias.
 Reglas muy abundantes.
 A las seis y media, punzadas en las encías del lado izquierdo.
 A las siete, punzadas en toda la mandibula.
740. Opresion en la raiz de la nariz.
 Entorpecimiento del brazo derecho.
 A las nueve, silbido en el oido derecho.
 Dolor y latidos en el hombro derecho.
 A las diez, latido en la muñeca derecha, el pulgar y el índice de la mano izquierda.
745. Ardor en las manos.
 Gran picor en el dedo índice de la mano izquierda; todo el brazo y principalmente la muñeca están doloridos.
 A las diez y media, dolor y latidos en el maleolo interno del pié derecho.
 Gran calor en los piés.
 Dolor en las muelas del lado izquierdo.
750. A las once, dolor y picor en el pié izquierdo, fuerte dolor en todo el pié derecho.
 Dolor muy fuerte en el ángulo interno del ojo derecho.
 Dolor en la muñeca izquierda.
 Latidos en el indice de la mano derecha.
 A medio dia, hinchazon de los párpados inferiores.

755. Rubicundez del ala izquierda de la nariz.
 Dolor en la muñeca y flexura del brazo izquierdo.
 Dolor contusivo en la rodilla derecha.
 Dolor en las encías del lado izquierdo.
 Dolor de cansancio en las piernas.
760. A las dos, dolor punzante que pasa de las rodillas al codo derecho, despues al hombro, al pié derecho, á la muñeca derecha y por último vuelve á las rodillas.
 A las dos y media, dolor nervioso en los riñones.
 Dolor de cabeza, detrás y en la oreja derecha.
 Cólicos.
 Dolor en las encías del lado izquierdo, correspondiendo á la raiz de la nariz.
765. Dolor en la muñeca izquierda.
 Dolor de cansancio en la espalda, cerca del hombro izquierdo.
 Silbidos en la oreja derecha.
 Dolor tensivo violento en el brazo derecho.
 Rigidez dolorosa del lado izquierdo del cuello.
770. *Dia catorce*.—A las seis y media, dolor en las muñecas.
 Dolor en el occipucio, correspondiendo á las encías del lado izquierdo.
 Rigidez del cuello.
 Dolor y latidos en el codo, en el antebrazo y la flexura del brazo izquierdo.
 Dolor reumático en el hombro derecho, que pasa á la axila.
775. Punto doloroso en la mama izquierda.
 A medio dia, gran calor en el pié izquierdo, mucho frio en el derecho.
 Calor y dolor en el índice derecho.
 A la una y media, calor en los piés, sobre todo en el derecho.
 Dolor en el dedo pequeño del pié derecho.
780. A las dos, dolor en la punta de la lengua.
 A las diez de la noche, dolor en las encías del lado izquierdo.
Dia quince.—A las diez de la mañana, dolor en las encías.
 Sofocacion en el pecho.

A las nueve de la noche, temblor nervioso en el brazo derecho.

785. *Dia diez y seis.*—A medio día, latidos en los dedos índice y medio de la mano derecha.

Dia diez y siete.—Sueña que hace compras.

A las nueve y media, dolor en el brazo derecho, estendiéndose hasta el dedo auricular.

Dolor en la mama izquierda, casi debajo de la axila.

Entorpecimiento de la muñeca derecha.

790. Latidos en el hombro derecho.

Punzadas en las encías del lado izquierdo.

A las diez y media, dolor en toda la mano derecha.

Dolor sobre la órbita del ojo derecho.

Dolor en la muñeca derecha y en toda la mano.

795. Dolor en el brazo izquierdo, al estenderlo.

A medio día, escalofríos nerviosos.

Dolor de quemadura, con una placa roja de una pulgada de diámetro, debajo del codo derecho.

Dolor nervioso, que pasa del ojo á las encías, con latidos en la sien izquierda.

Muy fuerte punzada en el costado izquierdo, debajo de la axila.

800. Pesadez sobre la órbita del ojo izquierdo.

Violentas punzadas en la muñeca y pulgar derechos.

A las dos, mucho sueño.

Adormecimiento de todo el brazo.

A las tres, dolor en la espalda y en el pecho.

805. Latidos en la sien derecha.

Fuerte dolor en la mama izquierda.

A las dos, picor debajo del lábio inferior, que se transforma por el frote en dolor agudo, y dura todo el día.

Dia diez y ocho.—Sueño de cuerpos mutilados, de cadáveres con los brazos cortados.

A las seis y media, dolor debajo del lábio inferior, con hinchazón del lado izquierdo, presentando un grano grueso en el centro.

810. A las ocho, dolor y picor en el hombro derecho.

Latidos encima de la rodilla derecha.

A las cinco, frio en los piés y gran calor en la cara.

Dia diez y nueve.—Sueño de niños, de rescate de prisioneros.

A las ocho y media, frio en los piés.

815. A las tres, dolor sobre las órbitas y en la frente.

A las cuatro y media, dolor en las encías estendiéndose hasta el ojo izquierdo.

Dolor en la muñeca derecha y en la flexura del brazo.

Latidos nerviosos en la órbita del ojo izquierdo.

La piel de la frente está muy tirante.

820. Impaciencia, propension á romperlo todo.

Distracciones en el trabajo.

Cree estar sola en el mundo y se cree perdida.

Llantos sin objeto, seguidos de risa nerviosa.

Tristeza, melancolía; piensa en el porvenir, y se supone desgraciada.

825. *Dia veinte.*—A la una de la tarde, dolor en el corazon despues de haber almorzado.

Emicránea; dolores en toda la cabeza.

Deseo de dormir, con náuseas.

Opresion en la parte posterior de la cabeza.

Dolor muy agudo detrás de las orejas.

830. La cosa mas pequeña le incómoda, y le produce horribles dolores en la frente, las sienes y la barba.

Latidos en la mama izquierda.

Frio en los piés.

Punzadas en el lado izquierdo del occipucio.

A las cinco, escalafrios á cada momento.

835. Dolor de cabeza al andar.

Dolor y latido fortísimos en el pecho.

Los ojos se le cierran sin querer.

Dolor en las encías.

Temblor interior.

840. Caloradas á la cabeza y rubicundez de la cara.

Dia veintiuno.—Desde el dia once al veintiuno, reglas abundantes, acompañadas de flores blancas.

A las dos y media, dolor y latidos en el hombro izquierdo.

A las tres, latidos en el lado izquierdo de la cabeza.

Sueño, pesadez de cabeza.

845. *Día veintidos.*—Insomnio.

Cólico con diarrea, desde el día diez y ocho.

Pesadez de cabeza.

Desde el día veintitres al veintiocho inclusive, cólicos con diarrea todas las mañanas y dolor en el centro de la espalda.

Gran impresionabilidad, y disposición á estremecerse al menor ruido.

850. Rubicundez de la cara y opresion de pecho.

Todos los días despues de almorzar siente caloradas en el pecho.

Digestion difícil para el almuerzo; palidez de la cara, despues de medio día.

Día treinta y tres.—Sensacion de calor en las manos, la cara y los piés, pero las personas que la tocan observan que estas partes están frias y húmedas.

Sudor frio general.

855. *Día treinta y cuatro.*—Hinchazon de los ojos.

Granos dolorosos al tacto en la mejilla izquierda y las cejas.

Día treinta y cinco.—Estremecimiento por cualquier cosa.

Deseo de bailar, y baila sin cansarse toda la noche.

Día treinta y ocho.—Muy fuerte dolor en el pecho, que se comunica á la mama izquierda, pasando de tiempo en tiempo á la derecha, sobre todo moviendo los brazos.

860. Dolor de cabeza.

Día treinta y nueve.—Dolor de cansancio en los riñones.

Sueño de viajes y fiestas.

A la una, gran deseo de dormir.

Gran calor en la cara.

865. Coriza.

Cara pálida y ordinariamente empañada y marmórea.

Dolor de riñones, como si hubiera recibido un golpe sobre el sacro.

Gusto á cobre en la boca.

Dolor en el costado izquierdo, que dificulta la respiracion.
870. Inflamacion del ojo derecho.

LEPIDIUM BONARIENSE. (D. C.)

LEP. *Mastruco. Cruciferas.*

El *Lepidium Bonariense* es muy comun en los alrededores de Rio Janeiro. Crece en las orillas de los caminos y en los terrenos pedregosos. Es una planta herbácea de numerosos tallos derechos, de 30 á 60 centímetros de altos; las hojas radicales, son precioladas, finamente cortadas; las superiores alternas, sexiles y casi lineares. Florece en setiembre. Las flores en espigas terminales están colocadas sobre pedicelos filiformes; cáliz de cuatro hojuelas; corola pequeña, cruciforme, con cuatro pétalos hipogíneos, seis estambres tetradinamos, estilo corto, silícula pequeña, subelíptica, un poco sesgada hácia la cima; raiz fibrosa, simple, vertical.

Se trituran las hojas frescas.

La naturaleza no ha sido avara para proveernos de recursos contra nuestras necesidades. Todos nuestros dolores, todas nuestras enfermedades han sido previstos por ella, sembrando sobre la superficie del globo numerosos medios para aliviarlos y curarlas. No tenia necesidad el habitante de Europa de descubrir un Nuevo-Mundo para adquirir un febrífugo como la quina. El Arsénico, la Sepia, el Natrum y otras sustancias, comunes en el antiguo continente, correspondian á todas las formas posibles de la fiebre intermitente. De la misma manera América se podria pasar sin la patogenesia europea. Todos los policrestos de Europa tienen sus análogos en el Brasil. El *Bufo sahitiensis* corresponde al *Lachesis*; *Convolvulus Duartinus* y *Petiveria*, tienen síntomas muy análogos á los de *Belladona*; *Jacaranda*, puede compararse á *Thuya* y *Acido nítrico*; *Hura* y *Mancinella*, á *Rhus* y *Lycopodio*; *Solanum oleraceum*, á *Pulsatilla*; *Cannabis indica*, á *Opio*; *Ocimum*, á *Cantáridas*; *Elaps corallina*, á *Nux vómica*; *Myristica* y *Murure*, á *Mercurio*; *Pediculus*, puede en gran parte representar á *Acónimo* y *Momordica*, á *Bryonia*.

Estos trabajos reciprocos, lejos de desalentar á los homeópatas, son un aguijón que lanza á los experimentadores hácia regiones inesploradas, porque cada nuevo medicamento, por mas que ofrezca una seductora analogía con los policrestos conocidos, encierra en sí particularidades, que para un homeópata reflexivo y ejercitado, presentan muchas veces la solución de los casos mas árdulos y embarazosos para ellos mismos.

El *Lepidium Bonariense* ofrece la mas grande analogía con el *Arnica* y ha curado en las mismas circunstancias. Ya el instinto popular habia sabido reconocer en parte las preciosas virtudes de este vegetal, tan comun en el Brasil. La escuela homeopática debia apropiarse esta sustancia, que estaba en manos de todo el mundo, y que los habitantes del interior pueden preparar en algunas horas, en lugar del *Arnica*, que es difícil adquirir. Nosotros tenemos el convencimiento de haber hecho una cosa útil, sobre todo para el Brasil, procurando completar su patogenesia.

1 *Día primero.*—Buen sueño hasta media noche; desde esta hora hasta el dia no ha podido volver á dormir, incomodada por dolores en todo el cuerpo, cuando se movia.

Calor general y dolor sordo; el lado izquierdo es el mas dolorido.

Antes de levantarse, dolor fuerte en el brazo izquierdo, con imposibilidad de estenderlo. Cuanto mas lo abriga, mas grande es el dolor; lo descubre al fin, y el dolor cesa instantáneamente.

Día segundo.—A las nueve de la mañana, aturdimiento. Inclina la cabeza hácia adelante y le parece que el techo de la habitacion se le viene encima; todo dá vueltas alrededor suyo.

5. A las once, calor en el lado izquierdo de la cara.

Dolor sordo de estómago, seguido de gran conato á vomitar.

Frio como en los espasmos.

Hambre despues de haber comido.

Por la noche, gran calor en la cara.

10. Dolor como por arañazos de gato ; dura una hora y viene seguido de calor en los piés.
- Dolor pulsativo encima de la oreja izquierda.
- Dolor punzante en las encías de la mandibula inferior , durante una hora.
- Gran picazon en la oreja derecha , que se aumenta bajando la cabeza ; dura media hora.
- Por la noche , sueña que habla con personas muertas ; gran agitacion.
15. Tristeza al despertarse.
- Dia tercero.*—Al levantarse , dolor de cabeza , como si le apretaran con un cerco de hierro.
- Dolor alrededor de la oreja derecha , como por pinchazos de aguja ; se calma con el frote , dura un cuarto de hora.
- Dolor en el pulmon derecho , durante cinco minutos.
- Dolor en el pómulo izquierdo , con rubicundez.
20. Ardor en el lado izquierdo de la boca , como si hubiera comido pimienta picante.
- Palpitacion del corazon que corresponde al costado , con fuerte dolor , que le hace faltar la respiracion ; se aumenta inclinándose hácia adelante y se calma acostándose.
- A medio dia , dolor terebrante en la parte izquierda del vértice de la cabeza , estendiéndose hasta la oreja.
- Ardor en la nariz y sensacion de una corriente de aire frio en la fosa nasal izquierda.
- Dolor en el lado derecho de la nuca , que se calma frotándose y volviendo la cabeza á uno y otro lado.
25. Sensacion como si un cuchillo penetrase lentamente en el corazon ; se alivia comprimiendo con fuerza algunos minutos esta region.
- Pinchazos como de alfiler en el omoplato , que se propagan al lado derecho del cuello.
- Fuerte picor en la nariz derecha.
- Picor en toda la piel.
- Pinchazos en la oreja , que bajan hasta la mandibula.
30. Punzadas en la mama izquierda ; se aplacan poniéndose de pié.

- Dolor punzante bajo la axila.
 Pinchazos como de alfiler sobre el esternon.
 Dolor como por compresion de una faja, ó como si el diafragma apretase al estómago, hasta impedir la respiracion.
 Punzada como una puñalada en el borde del omoplato, pasando de uno á otro lado, se alivia poniéndose de pié.
35. Dolor en el hipocondrio izquierdo, como por alfilerazos.
 Picor bajo la axila.
 Deseo de chocolate, de salados, de frutas verdes.
 Gran deseo de vinagre.
 Por la noche, nuevas punzadas en el corazon.
40. Caloradas despues de haber comido.
 Temblor convulsivo del corazon.
 Dolor en el epigastrio despues de haber comido, que se agrava con el movimiento y el tacto.
 La sangre, que se ha presentado al segundo dia de la menstruacion, es mas oscura y coagulada que de ordinario.
Dia cuarto.—Contraccion del diafragma, como el dia anterior.
45. Punzadas pasageras en el vientre, los costados y las mamas.
 Punzadas del codo al omoplato.
 Presion y pesadez sobre la vejiga, al orinar.
 Suspension de las reglas por veinticuatro horas.
 Sueño corto.
50. Gana de vomitar, toda la noche.
 Ligero esputo de sangre, despues de toser.
 Pinchazos en la mama izquierda.
 Ardor en la garganta con deseo de vomitar; ruido en los oidos al tragar la saliva.
55. Dolor constrictivo en la cabeza.
 Vértigo con disposicion á caer hácia adelante.
 Esputos espesos, dificiles de arrancar, con ruido en los oidos.
 Dolor de picadura en la rodilla; se alivia con el movimiento.
 Picor en las mejillas.

60. Punzadas bajo la axila.
 Cólicos en la region umbilical.
 Torpeza de oido.
 Palpitaciones en el epigastrio.
 Tristeza profunda y sueño de enfermedades.
65. Dolor en el hueso del pulgar de la mano izquierda, con temblor al servirse de él.
 Lagrimeo leyendo.
Dia quinto.—Tristeza, inquietud, humor pendenciero, displicencia, sueño profundo.
Dia sexto.—Vista turbada, como si tuviera una gasa delante de los ojos; mirando al cielo, lo ve todo de color gris.
 Lagrimeo del ojo izquierdo; dolor que se aumenta moviendo el globo del ojo y se propaga á la ceja. Dura seis horas.
70. Calambre en el dedo anular de la mano derecha, que se estiende hasta el codo, contrayendo el flexor comun de los dedos, con rubicundez en la raiz de las uñas. Dura veinte minutos y se desvanece al aire libre.
 A la una, dolor de las muelas del lado derecho.
 Lagrimeo del ojo izquierdo, que se aumenta al aire libre y concluye por picor. Dura diez minutos.
 Ardor en el ángulo de la nariz izquierda y picor en el lóbulo.
 Dura quince minutos.
 Dolor en la frente con latidos en la sien izquierda. Dura diez minutos.
75. Alegría, se rie por la cosa mas insignificante.
 Conatos á vomitar despues de comer, inclinando la cabeza.
 Digestion dificil, peso en el estómago.
 Esputos salados, espesos y dificiles de arrancar.
 Dolores durante cinco minutos, que pasan del hombro á la espalda y dificultan la respiracion.
80. Dolor que recorre rápidamente la mitad derecha de la cabeza, desde el parietal izquierdo hasta la ceja.
 Deseo de tomar té.
 Punzadas en las orejas.
 Pinchazos en las cardias.

Sed, boca seca.

85. Insomnio y laxitud, como la tercera noche.

Dia sétimo.—Dolor en el pulmon izquierdo, que recorre la espalda y se agrava [mucho suspendiendo cualquier cosa de peso. Dura doce horas.

Dolor en el costado izquierdo; al respirar parece que el dolor penetra mas profundamente, como una puñalada, confundiéndose despues con el dolor primitivo. Se repite tres veces.

Orina clara, blanca y poco cargada.

Sensacion de ligadura en la mama derecha, sin dolor.

90. Dolor en las muelas de la mandibula inferior izquierda, correspondiendo al oido y dejándola sorda por tres minutos.

Dolor de dientes con dentera, todo el dia. Este síntoma no ha faltado mas que de noche desde que tomó el medicamento.

Dolor tractivo desde el hombro á la oreja, muy violento y que impide mover la cabeza durante tres minutos.

Siente como un cordon que le tira desde el hombro á la oreja.

Escalofrios con palidez y ojeras.

95. Fuerte traspiracion seguida de malestar.

Dia octavo.—Tos por la noche, sueño ligero.

Sueños tristes con gran pavor al despertar; despues tristeza, que dura un cuarto de hora.

Picor como alfilerazos en la lengua; dura cinco minutos.

Picor en los mamezones de ambas mamas, ingurgitacion de las glándulas y dureza de los pechos. El picor dura poco rato.

100. Dolor en la boca del estómago, correspondiendo á la mama izquierda y saltando alternativamente de uno á otro de estos dos sitios, con punzadas.

Picor en toda la barba, de oreja á oreja, partiendo de la garganta.

Tos corta, seca con desco de esputar y que solo á esfuerzos repetidos arroja un poco de saliva salada.

- Dolor en la mandíbula inferior izquierda, dirigiéndose hacia el hombro. Dura cinco minutos.
- Dolor como de pinchazo y picor sobre el biceps derecho.
405. Picor que empieza en las sienes y se hace despues general. Dura todo el dia.
- Dolor en el omoplato, como si una aguja atravesara el hueso. Dura tres minutos.
- Dolor en el dedo medio con rigidez, durante cuatro minutos.
- Dolor en el músculo glúteo izquierdo, estendiéndose hasta la rodilla, con debilidad de la pierna. Se alivia sentándose.
- Dolor martilleante en la mandíbula izquierda, durante diez minutos.
410. Por la noche, vértigos y deseo de vomitar.
- Tos con ronquera.

Segunda esperimientacion.

- Dia primero.*—Sueño pesado y gran aturdimiento al despertar. Sensacion como si le hubieran apaleado.
- Dolor tractivo en el fondo de la garganta. La lengua está mas gruesa que ordinariamente.
- Dia segundo.*—Entorpecimiento del brazo izquierdo y dolor en el hombro, como si le dieran martillazos.
415. Dolor punzante en la boca del estómago, despues de haber comido.
- Dolor calambroide en la mano derecha, con imposibilidad de cerrarla; despues, escalofrios por todo el cuerpo.
- Dia tercero.*—Insomnio hasta media noche.
- A las siete de la mañana, gran picor en la comisura del lábio derecho.
- Hinchazon del lado izquierdo de la nariz, con dolor, que aumenta por el tacto y disminuye al aire libre.
420. Lagrimeo sin dolor.
- Gran picor en el dorso de las manos.
- Cansancio.

Grandes conatos á vomitar durante media hora. Se aumentan con la quietud y se disipan con el movimiento.

Dolor en la boca del estómago, como si una barra atravesara el cuerpo. Dura media hora.

425. Dolor en la pantorrilla, como si una cuerda tirase hácia afuera lentamente.

Ruido en la oreja izquierda.

Dolor como reumático en el omoplato derecho. Dura algunos minutos.

Soñolencia desde medio dia hasta las tres.

Cefalalgia supra-orbitaria y temporal, que se agrava por el tacto y por levantar los ojos.

430. Dolor en el músculo gran pectoral, empezando bajo la axila y prolongándose en pocos minutos hasta la region del corazon.

Cólicos verminosos en el bajo vientre durante cinco minutos, con tenesmo.

Bostezos frecuentes.

Dolor en el brazo derecho con entorpecimiento como si hubiera recibido un golpe.

Vértigo con inclinacion de la cabeza hácia adelante.

435. Dolor en la mejilla derecha, que se disipa comprimiéndola.

Presion como por una faja alrededor del cuerpo, que parece depender de contraccion del diafragma. El dolor se marca especialmente en el epigastrio.

Sensacion de debilidad en el estómago, con tendencia de desmayarse.

Dolor calambroide en el lado derecho del cuello, estendiéndose á diversos puntos del hombro y del brazo. Se alivia por la compresion.

Cólicos por la impresion del aire frio.

440. Frio en la region del estómago, que invade todo el pecho hasta la garganta.

Dolor con palpitation de los músculos debajo de la mama derecha, estendiéndose hasta la axila.

- Dolor reumático y rigidez del dedo indicador izquierdo por algunos minutos.
- Dolor como de contusion en la cadera derecha. Se alivia por la presion.
- Detencion del bolo alimenticio en el exófago, para caer despues violentamente en el estómago, dejándolo dolorido. Igual síntoma, bebiendo.
445. Ardor en la punta de la lengua, como por pimiento picante, con sensacion como de crecimiento de las papilas. Funciones de vientre regulares.
- Orinas rojas.
- Dolor punzante debajo de la axila izquierda.
- Escalofrios y sudor frio por la impresion del viento.
450. Inflamacion y prurito en la nariz con violento coriza. Quebrantamiento en los miembros.
- Deseo de comer berros, y repugnancia á ellos al presentárselos.
- Contraccion de la pierna, con imposibilidad de doblarla, por la rigidez en que está la pantorrilla.
- Dia cuarto.*—Sensacion de una puñalada en el epigastrio, de fuera á dentro.
455. Tos seca, con imposibilidad de respirar.
- Golpe violento transversal en medio de la espalda.
- Pulsaciones en la cabeza, de dentro á fuera, que obligan á inclinarla hácia adelante.
- Sueña que se encuentra abandonada en un cementerio, perseguida por un fantasma, y grita hasta el punto de despertar ronca al siguiente dia, sin embargo de que no grito en realidad.
- Punzada que parte de la oreja hasta el hombro.
460. Pulsacion en la frente, que hace inclinar la cabeza hácia adelante. Dura poco.
- Sensacion como de un martillazo en el pulgar del pié izquierdo.
- Alegría (efecto curativo) despues de la tristeza de los primeros dias.
- Deseo de frutas y repugnancia á los demas alimentos.

- Dia quinto.*—Epistaxis por la nariz derecha, con picor. La sangre es coagulada y negra.
465. Dolor en el ojo derecho, como si hubiera colgado de él una bola pesada, con dolor en el ángulo interno.
- Dolor en el hombro, que se propaga alrededor del cuello; la aprieta como una serpiente, que además le picase sobre la boca del estómago y la nuca.
- Dolor compresivo alrededor de la cabeza, y pinchazos como de espinas.
- Dolor calambroide en la mano izquierda.
- La epistaxis ha continuado hasta la una, habiéndose hecho muy copiosa, pero de sangre roja y clara.
470. *Dia sexto.*—Sueño profundo.
- Dolor como de pinchazo en la mandíbula. Dura poco.
- Dolor calambroide en la parte posterior del cuello. Dura cinco minutos.
- Dolor que parte de la sien á la barba, como de una cortadura con navaja de afeitar.
- Latidos en el pecho y la boca del estómago con picor, que se agrava al respirar. Dura poco.
475. Dolor en el trayecto de la carótida, desde la oreja izquierda hasta la parte inferior del cuello, que se agrava inclinando la cabeza hácia el lado derecho.
- Oclusion completa de la oreja izquierda, con pérdida de la audicion.
- Repugnancia á la carne.
- Dia sétimo.*—Dolor en la espalda, como si le introdujesen un clavo, estendiéndose hasta los hombros.
- Dolor en el costado izquierdo, que corta la respiracion.
480. Escalofrios en todo el cuerpo, como los que preceden á la fiebre intermitente.
- Calor que sucede al frio, y se hace sentir sobre todo en los riñones.
- Dolor constrictivo en el corazon, que se estiende hasta la axila izquierda.
- Gran conato á vomitar. Dura media hora.

Dolor y contraccion en la punta del dedo medio , que impide estenderlo.

Tercera esperimentacion.

185. *Dia primero.*—Gran deseo de dormir , con ligero escalofrio en las piernas, como el que precede á la fiebre.
 A las ocho , dolor en el costado izquierdo , que desaparece instantáneamente.
 A las once , presion en la frente como si la oprimiera un aro de hierro. Dura un cuarto de hora.
 Entorpecimiento fisico y moral , casi continuo.
 Dolores sordos , continuos de cabeza.
190. Bostezos frecuentes.
 Incomodidad en el corazon , y deseo de vomitar antes de comer.
 A las cuatro de la tarde , gran dolor de cabeza.
 Dolor sordo en el vientre , principalmente en el lado derecho.
 Dolor de cabeza con calor en la parte anterior del vértice.
195. Pérdida de la memoria , imposibilidad de pensar , con indiferencia por todo.
 Soñolencia comatosa sin poder dormir.
 Pesadez sobre los párpados , sin poder cerrarlos.
 Siente el aire exterior mas frio que lo que es en realidad.
 Picor en el lado izquierdo de la cara.
200. Sed.
 Deseo muy violento de café.
 Gran calor interior y agitacion al momento de haberse acostado , que obliga á volver á levantarse.
 Presion en la frente y en la parte superior de la nariz.
 Ardor en el estómago , con sensacion de sequedad é irritacion.
205. Pulsaciones en la espalda que parecen proceder de la aorta.
 Aversion á la leche.
 Deseo de pasear.
 Gran calor pasagero en la espalda , seguido de un escalofrio general.

Dia segundo.—Insomnio durante la noche, agitacion general, y picor por todo el cuerpo, toda la noche.

210. Párpados muy fatigados con dificultad para abrirlos, toda la noche.

A las cuatro, dolores en el lado izquierdo del vientre, lo mismo que el dia anterior.

Dia tercero.—La misma agitacion é igual insomnio que el dia anterior.

Dolor en el brazo izquierdo con dificultad de levantarlo. Dura poco.

Incomodidad en el corazon seguida de conatos á vomitar antes de comer.

215. Punzadas en el ojo derecho sin rubicundez, durante tres horas.

Dia cuarto.—Incomodidad en el corazon antes de comer.

Gran cansancio en las piernas durante tres horas.

Escesivo calor en la espalda, seguido de escalofrios.

Cuarta experimentacion.

Dia segundo.—A las diez de la mañana, dolor de arriba á abajo del tronco.

220. Tirantez en el trayecto del músculo sartorio izquierdo.

A las dos, dolor de contraccion y torsion en el músculo glúteo izquierdo.

A las seis, dolor punzante bajo la axila izquierda.

Dia tercero.—Dolor paralítico en el brazo izquierdo, cuando se le deja mucho tiempo en quietud.

Por la noche, sueño de muertos.

225. *Dia cuarto.*—A las once, dolor molesto en la boca del estómago con deseo de vomitar.

Abatimiento de las fuerzas y de la moral; falta de apetito, repugnancia á los alimentos.

A las dos, calor en la cabeza con sudor frio y un poco de fiebre.

Deseo continuo de bailar.

A las seis, calor en la cabeza sin sudor.

230. Diarrea.

A las ocho de la noche, fuertes cólicos que se alivian sentándose; flatuosidades por abajo.

Eructos ágricos.

Dia quinto.—A las siete de la mañana, gran sensibilidad en el vientre como si hubiera en él una llaga.

Sensibilidad del cuero cabelludo.

235. Respiracion corta.

Alivio de los síntomas del vientre.

A las once, sensacion de quemadura en los ojos.

A las doce, dolor martillante en el hombro derecho. Dura poco.

A las dos, dolor punzante ligero en el hipocondrio izquierdo.

240. Desde las cuatro á las siete de la tarde, desfallecimiento de estómago.

Dia sexto.—A las seis y media, dolor en los músculos glúteos. Dura una hora.

Dia sétimo.—A las tres, palpitaciones de corazon.

Por la noche, en la cama, accesos de sofocacion.

Eructos pútridos todo el dia.

245. Dolor nocturno en todo el vientre.

A las cinco, zumbido en el oido derecho, durante dos minutos.

Quinta experimentacion.

Dia primero.—Violentas punzadas en el costado derecho bajo la tercera costilla y á intervalos regulares. Duran algunos minutos.

Vivo dolor en la parte anterior de la tibia derecha.

Dia segundo.—Entorpecimiento, pesadez de cuerpo.

250. Soñolencia todo el dia.

Muy mala noche, estrema agitacion del sistema nervioso.

Dolores en todo el lóbulo izquierdo del cerebro, que habiendo empezado en la parte anterior, encima del ojo ((donde ha experimentado contracciones), ha ido subiendo al vér-

lice y parte posterior de la cabeza, y por último, han invadido la nuca fijándose en ella por algun tiempo. Estos dolores no han sido simultáneos, sino sucesivos, no dejándose sentir unos hasta que han desaparecido otros, y pareciendo que tenian su asiento en las membranas del cerebro.

Dolores agudos, punzantes, debajo de las costillas falsas, y en la region del corazon.

Violentos dolores de cabeza, como si dieran interiormente martillazos, ó como si el cerebro oscilase en el vacío. Duran media hora.

255. Dolor agudo en el hueso maxilar inferior derecho. Los dientes de ese lado están perfectamente sanos.

Palpitaciones de corazon.

Dia tercero.—Noche menos agitada.

Sueño continuo.

Aturdimiento de cabeza, con sentimiento vago de malestar en el cerebro, principalmente del lado izquierdo.

260. Sensacion dolorosa, pero fugaz, en el arco cigomático derecho.

Dia cuarto.—Al despertar, dolores vivos en la cabeza y los músculos de la nuca.

Dolores lancinantes intensos en los músculos de la mano derecha, y las articulaciones de los dedos de la misma mano.

Dos horas despues, las mismas sensaciones en el omoplato derecho y en la muñeca del mismo lado. Estos dolores no duran mas que unos instantes, pero tienen un carácter muy marcado.

Dia quinto.—Estrema agitacion toda la noche, sin la menor causa aparente, ni estravío el mas pequeño en el régimen.

Insomnio completo.

265. *Dia sexto.*—Por la noche, picor en los ojos, como si se hubiera introducido una sustancia muy astringente.

Globo del ojo y párpados muy inyectados.

Punzadas en el omoplato derecho.

Dia sélimo.—Los ojos continúan inyectados, rojos y doloridos. Dolores lancinantes encima de los ojos y en las sienas.

270. *Dia octavo.*—Los ojos están aun rojos, aunque menos, y el dolor ha desaparecido.

Dia noveno.—Los ojos han vuelto al estado normal.

Dia décimo.—Dolores intensos y repetidos en los músculos del cuello y en los del omoplato izquierdo.

Violento dolor de cabeza, que dura desde por la mañana hasta las dos de la tarde.

Dia catorce.—Pesadez y entorpecimiento en todo el cuerpo; soñolencia.

275. *Dia quince.*—Por la mañana, repetición de los dolores de los músculos del cuello y del omoplato.

Entorpecimiento y soñolencia; imposibilidad de ocuparse en nada que exija atención. A las tres, gran facilidad para el trabajo.

Dia diez y seis.—Dolores intensos en los músculos del cuello y omoplato izquierdo.

Por la tarde, violentos dolores de cabeza con sensación de compresión en la frente, estendiéndose de una á otra ceja.

Gran sequedad en la boca y garganta.

280. *Dia diez y siete, diez y ocho y diez y nueve.*—Continuación de los dolores de cabeza, empezando hácia las diez de la mañana para concluir por 4a noche.

Palpitaciones violentas del corazón.

Fuertes dolores en los músculos del cuello, del muslo y de la pierna izquierda, muy pasajeros, pero que se repiten con frecuencia en el día.

Eruetos por la tarde, sin acidez.

Dia veinte.—Dolor de cabeza. Los mismos síntomas que los días precedentes en los músculos del costado izquierdo.

285. Palpitaciones pasajeras.

Eruetos.

Repugnancia á los alimentos, sobre todo á la carne.

Dolores en los huesos maxilares, como si todos los dientes estuviesen atacados.

Dia veintiuno.—Punzadas encima del ojo y en la sien izquierda.

290. Punzadas en la mandíbula izquierda.

Inapetencia, repugnancia á la carne.

Dia veintidos.—Falta completa de apetito.

Dia veintitres.—El mismo sintoma que el día anterior.

Dolores en el lado izquierdo de la cabeza.

295. Palpitaciones del corazón.

Dia veinticuatro.—Alivio de los síntomas del estómago.

Débiles punzadas en la cabeza, siempre del lado izquierdo.

Eructos.

Dia veinticinco.—Reaparicion del apetito.

PANACEA.

Por un accidente irremediable, nos ha sido imposible tener á la mano las notas que habiamos recogido sobre el árbol, que los brasileños llaman *panacea*, á causa, sin duda, de la inmensa variedad de casos y dolencias en que la emplean. Pero podemos indicar la sinonimia brasileña, que facilitará todos los datos necesarios para poderse adquirir este vegetal, tan comun en el Brasil. Llámase por los habitantes del país *Azogue dos pobres*, *Cabedula* y *Erva carneira*.

1. *Dia primero.*—A las diez de la noche, pesadez en la frente y soñolencia.

A las diez y media, gran calor, seguido de frio considerable,

Dia segundo.—A las cinco de la mañana, gusto muy amargo en la boca.

Dolor en el omoplato, inclinando la cabeza al lado izquierdo.

3. Náuseas.

Bostezos espasmódicos.

Calambre desde el índice hasta el codo.

Violenta cefalalgia, que se aumenta al inclinar la cabeza al lado izquierdo, á las seis de la mañana.

Dolor en la frente y las sienes.

40. Dolor de quebrantamiento en la espalda , como si le hubieran dado de palos , á las seis de la mañana.
 Sensacion de una bola ardiente en el epigastrio ; no puede abrocharse el vestido.
 Hambre , y sin embargo repugnancia á los alimentos.
 Desfallecimiento.
 Dolor en la articulacion de la muñeca derecha , que sube hasta el codo.
45. Vértigos, que aumentan la cefalalgia que ya existia desde la mañana anterior.
 Pesadez de cabeza.
 Deseo de dormir.
 A las siete , sensacion de rasgadura en el pecho , que sube aumentando á la garganta.
 Dolor como de un golpe en el hombro izquierdo.
20. Aturdimiento ; se inclina hácia atrás como para caer , á las siete y media de la tarde.
 Dolor punzante en el ombligo , dando vuelta despues á todo el vientre y terminando en la region lumbar.
 Gran calor en la lengua , con sensacion de pequeños pedacitos de hielo en ella , á las nueve de la mañana.
 Dolor en las sienes, como si estuvieran comprimidas por una ligadura.
 A medio dia , sueño con pesadez en los ojos.
25. Calambres en los piés , estendiéndose hasta las pantorrillas.
 Sensacion de vacuidad en el estómago con necesidad de comer.
 Hambre con ardor en el estómago.
 Debilidad de las rodillas , á las cuatro de la tarde.
 Deseo de estar sola.
30. A las siete de la tarde , escalofrios al aire libre.
 Imposibilidad de estar arrodillada.
 Dolor en el pecho con sacudidas nerviosas.
 Dolor como si pasaran una sierra por encima de las órbitas.
 Dolor como si le arrancaran las uñas de los piés.
35. Cansancio como por un largo viaje , á las ocho de la noche.

Día tercero.—A las seis de la mañana, adormecimiento de la mano izquierda con imposibilidad de moverla.

Dolor como de martillazos en el ombligo y los hipocondrios.

Dolor punzante en un diente cariado, á las siete de la mañana.

Dolor presivo en el vértice de la cabeza, con aturdimiento.

Este dolor se pasa despues al ojo izquierdo, dejando una sensacion parecida á la que se experimenta por el disparo de un cohete.

40. Sensacion de estrangulacion, á las nueve de la mañana.

Temblor en la mano derecha.

Aburrimiento y fastidio por todo.

Cefalalgia, que aumenta el malestar moral.

Escalofrios por todo el cuerpo.

SOLANUM TUBEROSUM ÆGROTANS.

SOL. T. *Solanos. La patata enferma.*

Una descripcion detallada del Solanum Tuberosum, cuyo cultivo está generalizado en todos los pueblos de Europa seria completamente inútil. Sin embargo, como este libro puede encontrarse en manos de personas que habiten donde la patata no se críe, por mas que este tubérculo se consuma en todos los ángulos del mundo, nos parece conveniente hacer de esta planta un ligero bosquejo.

La patata es originaria de Chile. Los tallos de esta planta herbácea son angulosos, algo bellosos, de 50 á 70 centímetros de alto. Las hojas aladas, con impar, compuestas de cinco ó siete hojuelas lanceoladas, con pequeñas pinulas intermedias. Las flores, bastante grandes, violadas, azules, rojizas ó blancas, en corimbos, con largos pediculos opuestos á las hojas en la parte superior de los tallos. Las raices dan nacimiento á tubérculos mas ó menos voluminosos, que llevan el nombre de patata. En las enfermedades de esta planta, los primeros signos de alteracion son unas manchas oscuras irregularmente distribuidas en el interior de los tubérculos. Poco á poco estas manchas van haciéndose centros de fermentacion, y entonces se desarrollan puntos blancos de apariencia algodonosa, comparables á los criptogamos, llamados algas, que se encuentran sobre las maderas espuestas á la humedad. A partir desde este punto, la descomposicion es casi general, y la patata exhala un olor

nauseabundo insoportable. Nosotros hemos empleado en la experimentacion un criptógamo, en el que todos los gérmenes de descomposicion, estaban desarrollados, sin llegar sin embargo á la putrefaccion completa, cuidando tomar con las partes oscuras, porciones de esa especie de alga, de que hemos hablado.

Desde los primeros dias de la experimentacion se han presentado cefalalgias frontales, con presion supraorbitaria, no solamente en las tres personas cuya experimentacion publicamos, sino en algunos otros experimentadores, que no pudieron observarse mas que los primeros dias.

Hasta el dia veinte, estas cefalalgias han venido con frecuencia acompañadas de fiebre, con frio, calor, sudores y escalofrios, á los cuales han sucedido males de garganta, con tos y expectoracion de moco verdoso.

Los violentos latidos del corazon, que se han observado durante todas las experimentaciones, y sobre todo al fin de la tercera, parece venir representados en el segundo por fuertes palpitaciones musculares, ocupando el mismo espacio cronológico. Las cámaras, duras, voluminosas, fraccionadas, cuya espulsion dolorosa provocaba alguna vez la salida del recto, la emision frecuente de flatusidades, precedida y acompañada de cólicos intestinales, con sensibilidad de los tegumentos del abdómen en el primer experimentador, constituyen los sintomas mas constantes de este medicamento. Estos síntomas que han aparecido desde el principio de la experimentacion despues han continuado agravándose hácia los últimos dias.

Tambien indicaremos en el tercer experimentador, que á esas debilidades, ya generales, ya parciales, han seguido dolores violentos en la region lumbar.

La lengua se presenta los primeros dias de la experimentacion cubierta de una capa blanca, que va despues circunscribiéndose á una faja amarilla, que ocupa solamente la parte media. Entre los otros sintomas menos generales, observados durante toda la experimentacion, conviene tener presentes el gusto amargo de los alimentos, las erupciones cutáneas, la hinchazon

de la membrana mucosa del paladar, las orinas espesas, y por último, los dolores en el anillo inguinal y en la articulacion ileo-femoral derecha.

La accion moral del medicamento se espresa por una grande irritabilidad. Los sueños fantásticos de trasformacion, que el medicamento ha provocado, se han reproducido con una notable semejanza en los tres esperimentadores. Obsérvase tambien en el segundo esperimentador la doble repeticion de los sueños de la noche anterior.

Despues de haber comparado atentamente los sintomas del solano tuberoso á los de los agentes de la materia médica hasta ahora conocidos, nos ha parecido hallar relaciones con los medicamentos siguientes, que clasificaremos por el orden de su relativa importancia.

1.º Bryonia;	9.º Pulsatilla;
2.º Arsenicum;	10.º Graphites;
3.º Plumbum;	11.º Alumina;
4.º Nux vómica;	12.º Mercurius;
5.º Sepia;	13.º Natrum muriaticum;
6.º Strontiana;	14.º Ignatia;
7.º Viola tricolor;	15.º Calcarea;
8.º Squilla;	

Primer esperimentador: VAN-DYCK.

Veintiseis años, temperamento sanguíneo-nervioso, constitucion robusta.

1. *Dia primero.*—Dolor en el hipocondrio derecho, algunos momentos despues de haber tomado el medicamento.

A las nueve de la noche, eructos ágrios.

Dia segundo.—Al despertar, pesadez sobre los ojos y toda la frente, como al siguiente dia de una embriaguez.

Al medio dia, escalofrios y sensacion de frio interior.

Por la noche, cámara escasa y dificil fraccionada en bolitas negras.

Dia tercero.—Sueña que debe vestir y dibujar á un hombre ahogado, cuyo cadáver saltaba y volvía á caer, unas veces sobre los vestidos, otras sobre el tablero de dibujo.

La membrana mucosa del velo del paladar parece que se desprende por muchos puntos.

Humor displicente; no encuentra bien nada, y sin embargo no permite que se toque á los objetos que le rodean.

Dia cuarto.—Cámara difícil, fraccionada en bolitas negras.

40. *Dia quinto.*—Cólicos atroces como si los intestinos se anudaran violentamente, seguidos, un cuarto de hora después, de una cámara abundante de materiales duros y otras dos casi líquidas, por la noche.

Dia sétimo.—Por la mañana, diarrea abundante y líquida de color amarillo verdoso.

Picor en los párpados; rubicundez é inyección sanguínea en su parte interna.

Capa blanca en la lengua.

45. Sarro blanco en los dientes.

Lagrimeo abundante.

Poco apetito.

Agitación en el pulso.

Dia octavo.—Toda la línea media del vientre, desde el esternon hasta el hipogastrio, está dolorida.

20. Sed.

Poco apetito.

A las cuatro de la tarde, calor en la cabeza.

Dia noveno.—Sueño de magia, de transformación de hombres en animales parlantes, de cambios de panorama.

Calor en la uretra, después de haber orinado.

25. Las orinas depositan un sedimento amarillo.

Pequeños granos con picor en la espalda.

Estornudos al subir escaleras.

Dia décimo.—Pesadez sobre los ojos.

Latidos ligeros en las sienas.

30. Caloradas á la cabeza de tiempo en tiempo.

Dia once.—Al despertar, picor alrededor de los párpados.

- Picazon en la espalda.
 Traspiracion facil, provocada por el trabajo mas leve.
 Aturdimiento de cabeza.
35. *Dia doce.*—Aumento del aturdimiento, sobre todo al bajar y mover la cabeza.
 Ardor y picor en los ojos.
 Estreñimiento de vientre, desde el dia sétimo.
Dia trece.—Pesadez de cabeza, mayor por la mañana que por la tarde.
 Cámara ordinaria.
40. Digestion dificil.
 Estornudos al subir escaleras.
 Poca disposicion para el trabajo; deseo de pasear.
Dia catorce.—Aturdimiento.
 Cámara ordinaria.
45. Pereza, deseo de acostarse, pero no lo hace por no moverse del sitio en que se encuentra.
 Dolor en la parte inferior de los muslos.
Dia quince.—Lagrimo al despertar.
 Aturdimiento de cabeza.
 La línea media de la lengua, se halla cubierta de una capa amarillo-verdosa.
50. Mucosidades blancas sobre los dientes.
 Cefalalgia, á medio dia.
 Punzadas en el corazon.
 Frio, con cascañeteo de dientes.
 Escozor en los ojos, por la noche.
55. Muy poco apetito.
 Estornudos.
 Grietas en los labios, cuyo epidermis está muy levantado.
Dia diez y seis.—Escozor en los párpados.
 Lengua cargada de mucosidades espesas y blancas.
60. Sarro blanco en los dientes.
 Sueña en sus ocupaciones diarias.
 Flatuosidades y eructos.
 Pulso un poco agitado.

A las cuatro de la tarde , estornudos.

65. Ardor y picor en los ojos.

Dia diez y siete.—Cólicos seguidos de dos cámaras , á las cuatro de la mañana.

Dolor al tacto en el hipocondrio derecho.

Dia diez y ocho.—Cólicos.

Falta de apetito.

70. A las cinco de la tarde , estornudos.

Dia diez y nueve.—Picor en la garganta , que obliga á toser.

Tos seca.

Dia veintitres.—Aturdimiento de cabeza al despertar.

Dia veinticuatro.—Cefalalgia, que se aumenta por el olor del espíritu de vino y cesa á las tres de la tarde.

75. *Dia veinticinco.*—Cólicos al despertar.

Emission frecuente de flatuosidades. ?

A las diez de la noche, dolores entre los omoplatos.

Dia veintiseis.—Sueña que tiene las manos cortadas en pedazos.

Cosquilleo en la garganta , con tos.

Segundo experimentador: CH. DIEUDONNÉ JOLLY.

Veinticuatro años , temperamento sanguíneo-nervioso , constitucion robusta.

80. *Dia primero.*—Presion en la raiz de la nariz.

Sueño de cosas religiosas.

Dia segundo.—Pesadez de cabeza, por la mañana.

A medio dia, pesadez de cabeza y sobre todo de la frente como en un coriza.

Cólicos despues de comer.

85. Sueño erótico primero, y despues de mujeres que se convierten en animales.

Dia tercero.—Por la mañana, emision frecuente de flatuosidades.

Lengua cargada de mucosidades blancas.

Cólicos y pellizcos en el estómago, despues de comer.

Gusto salado en la garganta.

90. Presion en la frente y en los arcos supraorbitarios.

Dia quinto.—Por la mañana, lengua cubierta de una capa blanca.

A las cuatro y media de la tarde, calor en la cara.

Dolor de luxacion en la parte posterior de la articulacion coxofemoral derecha.

A las cinco de la tarde, gran afluencia de ideas.

95. A las ocho y media, latidos en la parte media del triceps braquial.

Dia sétimo.—Desde el tercer dia, se despierta muy temprano.

A las nueve de la noche, dolor en la eminencia hipotenar.

Dia octavo.—Despierta muy temprano.

Por la mañana, lengua cubierta de una capa amarilla.

100. Picor en los músculos lumbares, á las seis de la tarde.

Dia noveno.—A las siete de la mañana, picor en el dedo auricular izquierdo.

Picor y punzada aguda en la ingle derecha, cerca del anillo inguinal. Este dolor se ha manifestado al separar con fuerza las piernas para subir tres escalones á la vez; poco despues, una deposicion albina ordinaria.

Latidos en los músculos gluteos, estando sentado.

A las siete y media de la tarde, sueño, y despierta muy temprano al siguiente dia.

105. *Dia décimo.*—A las nueve de la noche, latidos en el hombro derecho.

Gran sueño, á las ocho.

Dia once.—Pesadez en el testículo izquierdo, todo el dia y la noche, estando sentado.

Dia doce.—Violentas pulsaciones semicirculares en la parte inferior del muslo.

Dia trece.—Latidos en los músculos lumbares, á las cuatro de la tarde, que duran hora y media, por la mañana.

Dia catorce.—Cefalalgia.

A las ocho y media de la noche, estornudos repetidos.

Dia quince.—Despues de haber andado, sensacion de gran fatiga en los músculos del muslo derecho, y sin embargo no están fatigados los de la misma pierna.

Distraccion por gran afluencia de ideas estrañas al objeto sobre el cual quiere fijarse la atencion.

Dia diez y seis.—Por la mañana, aparece la lengua cubierta de una capa blanca.

115. Contraccion y latidos en el párpado superior izquierdo; á las siete de la tarde cólico y emision frecuente de flatuosidades por la tarde y toda la noche.

Dia diez y siete.—Sueño muy agitado.

Flatuosidades por la noche.

Cámara dura y corta.

120. *Dia diez y ocho.*—Sueña que vá á caer de lo alto de una torre.

Violentas palpitaciones del corazon al enderezarse.

Punzadas en el borde derecho de la lengua, desde medio dia hasta las tres de la tarde.

Opresion en la garganta, con sed, por la noche.

Tos y espectoracion mucosa, amarilla, toda la noche.

125. *Dia diez y nueve.*—Sueña que vá á caer de lo alto de un tejado.

Hinchazon de la membrana mucosa del borde alveolar interno de los dos dientes incisivos y del camino izquierdo.

Violenta cefalalgia frontal y coriza, todo el dia.

Dolor de luxacion en la articulacion escápulo-humeral derecha, despues de haberse apoyado sobre el codo, por la noche en la cama.

Gran agitacion, toda la noche.

130. *Dia veinte.*—Sueño estremadamente confuso.

Pulso agitado por la mañana.

Coriza.

Dia veintiuno.—Sueños confusos, embrollados.

Cefalalgia frontal.

135. Coriza.

Pulso agitado.

Sudor general, por la mañana en la cama.

Fuertes pulsaciones en el periné, en la espalda y en el dedo anular derecho, á las cuatro y media.

A las cinco, violenta cefalalgia frontal, al andar.

140. Cámara voluminosa, dura, fraccionada.

Emision continua de orina, todo el tiempo que duró la cámara.

Dia veintitres.—Fuertes pulsaciones en la region vertebral, por la mañana en la cama.

A las cinco de la tarde, silbidos en la oreja izquierda.

Gran disposicion á recordar viajes pasados; afluencia de ideas teóricas.

145. *Dia veinticuatro.*—Dolor presivo en la region hipogástrica derecha, cerca del anillo inguinal, despues de una larga carrera.

Dia veinticinco.—Orinas rojas, con mucosidades en suspension.

Tercer experimentador : MME. AL. J.

Veintiseis años, temperamento sanguineo, buena constitucion.

Dia primero.—Inmediatamente despues de tomado el medicamento, sensacion de rasgadura en la garganta y el pecho.

Dia segundo.—Sueño erótico y voluptuoso.

Cólicos en la region hipogástrica, durante la noche.

150. *Dia tercero.*—Sueños de hechicerías, de magia.

Digestion difícil, acompañada de retortijones de estómago, despues de almorzar y comer.

Cámaras duras, esféricas y difíciles; despues de la cámara, tenesmo, con violento escozor en el ano.

Procidencia del recto.

Contraccion del esfínter.

155. Despues de las cámaras, el recto sale y entra alternativamente.

Los descensos del recto van acompañados de escalofrios generales, durante diez minutos.

Dia quinto.—A las once de la noche, en la cama, palpitaciones del corazon.

Dia sexto.—A las siete de la mañana, palpitaciones del corazon.

A las seis de la tarde, calambres de estómago, despues de comer.

160. *Dia sétimo.*—A las siete de la mañana, sensacion de rasgadura en la garganta.

Lengua cubierta de una capa blanca.

Dia octavo.—Sueño agitado: sueña que ha comido carne humana.

La cosa mas insignificante la irrita y contraría.

A medio dia, palpitaciones de corazon.

165. A las once de la noche, palpitaciones del corazon tres veces distintas.

Dia noveno.—A las diez de la mañana, lengua cargada y pegajosa.

Dia once.—Sueño muy agitado.

Sudor frio, por la noche en la cama.

Dia doce.—Sensacion de dislocacion en la articulacion ileo-femoral, correspondiendo dolorosamente á la matriz, al mas leve esfuerzo.

170. Emision de flatusidades, con dificultad muchas veces para espulsarlas.

Cefalalgia.

Contraccion del esfinter del ano.

Dolor lancinante en la frente, por la tarde despues de comer hasta las nueve y media de la noche.

Cólicos con retortijones.

175. Cámaras siempre duras y difíciles.

Gran calor en el ano, despues de la cámara.

Lagrimo del ojo derecho, durante algunos minutos.

Deseo frecuente de deponer.

A las nueve de la noche, escalofrios que recorren todo el cuerpo.

180. Eructos, por la tarde.
 Flatuosidades, por la tarde.
 Disposicion á encolerizarse.
Dia trece.—Insomnio.
 Calor general con sudor.
85. Agitacion en el pulso.
 Sueña que está nadando en un rio, del cual no puede salir.
 Caloradas á la cara de tiempo en tiempo, y sobre todo despues de la comida.
 Frio despues de las caloradas.
 Imposibilidad de cerrar las manos.
190. Pulso muy irregular, tan pronto débil como fuerte.
 Cefalalgia frontal con vértigos y tendencia á caer hácia adelante.
 Pereza.
 Cansancio general; se ve en la necesidad de acostarse á medio dia.
 Falta de apetito.
195. Presion en el pecho.
 Sed.
 El agua fria le causa una sensacion de encogimiento, ya bebiéndola, ya lavándose la cara.
 Cefalalgia, que cesa por algun tiempo para reaparecer despues.
 Punzadas en el cerebro, como si el cráneo fuera á estallar, al subir escaleras.
200. Rubicundez de la mejilla derecha.
 Granitos rojos en las mejillas.
 Escalofrios de rato en rato.
 Inyeccion sanguinea en la esclerótica.
 Rubicundez de la cara, á las tres de la tarde.
205. Gran calor en todo el cuerpo, á las tres y media.
 Sensacion, al bajarse, como si el cerebro oscilase en el cráneo.
 A las cuatro, calor en el vértice de la cabeza que se hace luego general.

- Sensacion como si un resorte se disparase en el hipocondrio izquierdo.
- Sensacion de debilidad; tiene que pararse para no caer en desfallecimiento.
210. Dolor al respirar en el músculo gran dorsal derecho.
 Borborigmos y flatuosidades en el abdómen.
 Retortijones de los intestinos, á las diez y media.
 Cólicos y escalofrios.
 Tos seca por la noche.
215. Por la tarde, disminucion de la cefalalgia.
 Emision de flatuosidades.
 Rubicundez y calor en la cara.
 La piel de la cara se descama ligeramente.
Dia catorce.—Gran calor por la noche, que turba el sueño.
220. Al despertar, sensacion de cansancio en todo el cuerpo.
 Peso en la frente.
 La lengua se presenta cubierta de una capa blanca.
 Por la mañana, gusto á patatas crudas en la boca.
 La sangre de las reglas es de color rosado.
225. Por la mañana, borborigmos en el vientre.
 Sensacion como de un cuerpo hueco que se moviera con ruido dentro del pecho; entonces cree que va á marearse, á las ocho de la mañana.
 Cefalalgia frontal, todo el dia.
 Ardor y dolor por el roce de los vestidos, en la quinta vértebra dorsal.
 Poco apetito.
230. Rigidez de los músculos posteriores del cuello.
 Fuerte rubicundez y calor en las mejillas.
 Gran calor por todo el cuerpo, aunque la atmósfera está fria y húmeda.
 Suspension de las reglas.
 Estornudos repetidos, seguidos de tos, todas las tardes á las cinco desde el segundo dia de experimentacion.
235. Olor á sangre, y deseo de arrojarla por la nariz, á las siete de la mañana.

Dia quince.— Sueño muy agitado.

Mala digestion de la comida de la vispera; eructos agrios por la noche.

Boca pastosa, por la mañana.

Cansancio general, al levantarse.

240. Dolor tractivo en la parte posterior del muslo derecho hasta el talon.

Continúa la suspension de las reglas.

Dolor tractivo en los músculos de la parte posterior é interna del muslo, al doblar la pierna.

Hipocondria.

Tristeza.

245. Todo le fastidia, y quiere marchar lejos de su casa.

Granos pequeños en la parte inferior del cuello y en la rodilla derecha, muy rojos en su base y con un punto blanco en el centro: duran una hora.

A las once y media, pesadez en la nuca y los músculos posteriores del cuello.

Pesadez de cabeza hasta el punto de tener que hacer esfuerzos para sostenerla derecha.

Dolor de cansancio en toda la region dorsal y los músculos posteriores de los muslos y los brazos.

250. Pesadez de cabeza.

Dolor de quebrantamiento, que lo impide volverse en la cama.

Gran calor en las manos.

A las once de la mañana, ligera epistaxis.

Anda con dificultad y teme quedar paralítica.

255. Agravacion de los dolores por el dia y disminucion por la noche.

Continúa la suspension de las reglas.

Descamacion del epidermis de la cara.

Erupcion considerable de granitos en la cara.

Necesidad de estirar los miembros.

260. *Dia diez y seis.*—Insomnio, sueño interrumpido.

Caloradas por la mala digestion de la comida del dia anterior,

que la obligan á levantarse á las tres de la mañana. Eructos seguidos de borborismos en el estómago, que desaparecen despues de beber un vaso de agua azucarada.

Lengua blanca con una línea amarilla en su parte media.

Una frase que no ha podido comprender, le irrita hasta el punto de querer romperlo todo y morderse las manos.

265. Por la noche, boca pastosa.

Calor y escalofrios alternados, toda la noche.

Gusto en la boca, toda la noche, á las patatas que comió por la tarde.

Latidos en la sien izquierda.

Rigidez en los músculos posteriores del cuello.

270. Dolor en el sacro, por el tacto y el movimiento.

Dificultad de respirar y sensacion de estrangulacion causada por escesiva sequedad de la boca.

Granitos microscópicos y picor insoportable en los grandes lábios de la matriz.

Dia diez y siete.—Sueño agitado.

Despierta á las cuatro de la mañana con dolor de estómago acompañado de eructos. Dura una hora este estado.

275. Cefalalgia en un semisueño.

Pesadez en el vértice de la cabeza, por la noche.

Escalofrios y calor quemante, por la noche en la cama.

Palpitaciones del corazon, setando acostada.

Zumbido de oidos, como si fuera á marearse.

280. Dolor agudo en el costado izquierdo, que le impide volverse en la cama.

El vello de las axilas se pega en melenches.

Dia diez y ocho.—Pesadez en el vértice de la cabeza.

Sueño interrumpido.

Dolores de estómago y rubicundez en las mejillas, despues de almorzar.

285. *Dia diez y nueve.*—Sentimiento de bienestar general.

Picor, como por millares de pulgas, sobre la cara interna y derecha del esternon.

Dia veinte.—Inflamacion de la garganta con imposibilidad de tragar la saliva, por la noche.

Dolor insoportable en la region lumbar, con dificultad de enderezarse.

Dia veintiuno.—Sensacion en la garganta como si hubiera atravesada en ella una tajada de carne.

290. Dolor lancinante en la region iliaca izquierda, y mas débil en la derecha.

Gran apetito.

Imposibilidad de andar derecha.

Dolor en la region lumbar.

Dia veintidos.—Despierta por una tos violenta y estridente, que dura cinco minutos.

295. Los dolores lumbares reaparecen con mas violencia al bajarse.

Dolor muy agudo como por desviacion del sacro.

A las once, aumento del dolor de la region lumbar que le obliga á andar encorvada hácia adelante.

El mas pequeño movimiento le causa un dolor muy vivo en la articulacion sacro-lumbar.

Dolor punzante en la parte posterior de la pierna derecha.

300. Dolor en el músculo gluteo izquierdo, acompañado de náuseas.

Sensacion, como si fuera á desprenderse alguna cosa del sacro.

Imposibilidad de estar de pié, ni sentada.

Presion como por una barra de hierro aplicada sobre la articulacion sacro-lumbar. Esto le produce dolor tan agudo, que la obliga á acostarse, en cuya posicion se alivia.

Sensacion de hormigueo en el sacro.

305. Tos, como por obstruccion de la faringe.

Dia veintitres.—Sueño agitado.

Dolor vivo, lancinante encima de la mama derecha, durante dos minutos, por la mañana.

Dolor de luxacion en toda la estension de la columna vertebral, propagándose á todos los músculos posteriores de los miembros abdominales hasta los talones.

Fuerte rubicundez de la cara.

310. Anda encorvada hácia adelante.

A las nueve de la noche, pesadez de estómago é indigestion.

Dificultad de andar á causa del dolor de las vértebras lumbares.

Gran deseo de tomar café.

Dia veinticuatro.—Indigestion toda la noche.

315. Palpitaciones del corazon, que repiten tres veces en la noche.

Cólicos, con emision de ventosidades quemantes.

Sueños desconcertados.

Disminucion del dolor lumbar.

Dolor compresivo en la matriz, á las nueve de la noche.

320. *Dia veinticinco.*—Picor general, que la hace despertar á las cuatro de la mañana.

Sueños de magia, de actores que se vuelven alternativamente verdes, amarillos y negros.

Sensacion de dislocacion en el anillo inguinal derecho.

Epistaxis ligera, á las seis de la tarde.

Orinas espesas, que poco tiempo despues de escretadas se cargan de mucosidades blancas.

325. *Dia veintiseis.*—Sueño de incendios, despues, de comedias.

Continúan las orinas cargadas de mucosidades blancas poco despues de la emision.

Dia veintisiete.—Epistaxis ligera, despues de la comida de la tarde.

A las dos, violento picor en los lábios de la vulva.

Dia veintinueve.—Cámaras duras, dificiles y muy voluminosas.

330. *Dia treinta.*—Sueño de revolucion, de ataques á sangre y fuego.

Eruetos agrios, que provocan tos.

A las dos de la tarde, ardor y prurito en la vulva.

Dia treinta y dos.—Hambre devoradora.

Eruetos agrios, amargos y regurgitacion de los alimentos, despues de comer.

335. Cámaras muy duras y voluminosas.

Cámaras muy difíciles: despues de un cuarto de hora de grandes esfuerzos, no puede espulsar mas que algunos fragmentos endurecidos.

La cámara es tan dolorosa, que le arranca lágrimas, y se inyecta de sangre la esclerótica, por la violencia de los esfuerzos que se vé obligada á hacer.

Orinas jabonosas de un amarillo pálido.

Cólico en el trayecto del intestino grueso, á las nueve y media de la noche.

340. *Día treinta y tres.*—A las dos de la mañana, calambres de estómago.

Sequedad de la boca.

Cámaras duras, secas, muy voluminosas y difíciles de espulsar sin grandes esfuerzos.

La espulsion de la cámara no es completa.

Dolor y escozor en el recto, causado por los esfuerzos hechos para la espulsion de la cámara.

345. A las ocho de la noche, ineptitud para el trabajo.

Sueño irresistible.

Orinas turbias de color amarillo, cubiertas de una película oleosa.

Sueño de persecuciones.

Pinchazos en la médula espinal, como si le clavaran alfileres estando durmiendo. La violencia del dolor le hace despertar.

350. Estremecimientos durmiendo.

Sequedad de la boca con sensacion de desgarramiento en el pecho, á las dos de la mañana.

Se levanta por la noche creyendo que hay ladrones escondidos detras de las cortinas, pero no se atreve á averiguarlo por sí misma y ruega á otra persona que registre aquel sitio.

Día treinta y cuatro.—Sueño agitado.

Ansiedad al despertar.

355. Lengua grieteada, por la mañana.

- Palpitaciones y pulsaciones violentas; le parece como si el corazón diera vueltas en el pecho.
- Sensacion de presion sobre el útero, por flatuosidades.
- Cámaras duras, secas, voluminosas, que no pueden ser espelidas sino por grandes esfuerzos, que le arrancan lágrimas.
- A las tres, regurgitacion y eructos.
360. A las nueve de la noche, ventosidades ardientes.
- Día treinta y cinco.*—Sueño muy ligero.
- Ronquera al despertar.
- Lengua blanca y cargada.
- Deseo de beber licores y comer naranjas.
365. Tos seca, durante el día y la noche.
- Día treinta y siete.*—Tos seca al despertar.
- Calor ardiente en las manos y en todo el cuerpo.
- Dureza y tension del pulso.
- Lengua roja en su punta, y blanca en el centro.
370. Dolor en el vértice de la cabeza.
- Sensacion, como si se moviera agua dentro del cerebro.
- Rigidez de los músculos posteriores del cuello.
- Rubicundez de las mejillas.
- Agravacion del dolor de cabeza por el trabajo.
375. En la cama, sudor que huele á patatas.
- La lengua está muy roja.
- Manos ardientes, pulso un poco agitado.
- Día treinta y ocho.*—Las mamas han estado doloridas durante todo el tiempo de la experimentacion. El dolor se aumentaba por el movimiento de los brazos, y parecia fijarse en el borde esterno del gran pectoral.
- Sensacion de frio general, sin poder entrar en calor, á las cinco y media de la tarde.
380. Coloracion escarlata en las mejillas.
- Después de comer, inflamamiento de vientre; los vestidos la oprimen mucho y la digestion no puede verificarse.
- A las diez y media de la noche, tos seca durante diez minutos.
- Preocupaciones sobre su porvenir, que cree miserable.

Dia cuarenta.—Tos seca, por la noche.

385. Cólicos en el bajo vientre.

Dia cuarenta y uno.—Las reglas se adelantan.

Espulsion de cuajarones de sangre negra.

Durante cinco dias, la sangre de las reglas es de un olor muy fétido, semejante al del pescado podrido.

Orinas turbias, amarillas, con abundante sedimento blanquizco.

390. *Dia cuarenta y dos.*—Sed ardiente con gusto salado en la boca.

Estremecimientos en la pierna derecha.

Sensibilidad dolorosa del cuero cabelludo y de la raiz de los cabellos.

Dolor en el vértice de la cabeza; no puede soportar el peso de la gorra.

Dia cuarenta y tres.—Al levantarse, ronquera, que desaparece al instante. Reaparece por la noche, pero dura poco.

395. *Dia cuarenta y cuatro.*—Sensacion de arañamiento en la garganta con acumulacion de mucosidades muy dificiles de espulsar.

La espectoracion forma coágulos amarillos.

Las mucosidades acumuladas en la garganta, parece que cubren toda su parte anterior.

El cuero cabelludo continúa dolorido y no puede sufrir el peine.

400. Espectoracion de coágulos de sangre negra.

Las mucosidades que espele por la nariz, están por la mañana teñidas de sangre.

Epistaxis por la mañana, los dias cuarenta y dos, cuarenta y tres y cuarenta y cuatro.

Sueño de batallas, de cadáveres y de un inmenso mar de sangre.

Dia cuarenta y cinco.—Sueña que ve hombres verdes, cubiertos de moho, viviendo en el agua, que luego se transforman en perros.

405. *Dia cuarenta y seis.*—Los alimentos le parece que amargan como la hiel.

Dia cuarenta y siete.—Siente en la garganta como un obstáculo, que no puede espectorar; despues arroja un coágulo duro de color gris amarillento.

La orina, aunque siempre turbia, deposita menos sedimento. Violentas palpitaciones de corazon, que le impiden al cantar articular sonidos, le cortan la respiracion y parece que va á perder el conocimiento.

Rubicundez escarlata de la cara.

410. *Dia cincuenta.*—Fuertes palpitaciones de corazon, con caloradas á la cabeza y disposicion á marearse.

Principio de mareo, que se pasa bebiendo un vaso de agua.

Dia cincuenta y uno.—Palpitaciones de corazon.

Dia cincuenta y dos.—Gran calor en las mejillas y la frente, al aire libre.

Fuertes palpitaciones de corazon, despues de la comida de la tarde.

415. Las palpitaciones se hacen irregulares, se contienen un momento para reaparecer despues con mas fuerza, y son semejantes á una botella que se destapara de repente.

Caloradas acompañando á las palpitaciones: cesan acostándose.

Pulsaciones y latidos subcutáneos en ambas piernas, por encima de las rodillas.

Dificultad para comprender, y esto la irrita en extremo.

Rubicundez de la cara é inyeccion sanguinea de la esclerótica.

420. *Dia cincuenta y tres.*—Palpitaciones de corazon todo el dia.

La deglucion provoca las palpitaciones.

Las palpitaciones son instantáneas y corresponden á la parte superior del torax.

Temblor de las piernas, causado por el hambre.

PLUMBAGO LITORALIS (Nobis).

P. Lit. *Picao de praia.*

Planta rastrera que crece en la orilla del mar en la bahía de Rio Janeiro, de tallo herbáceo redondeado, cubierto de pelos cortos y rígidos. Sus hojas son sencillas, opuestas, sostenidas por un pequeño pecíolo acanalado, unido al del lado opuesto y formando de distancia en distancia especies de ramilletes, de donde nacen raíces adventivas. El limbo es lampiño, trapezoide, con gruesos dientes en su ápice. Las flores forman pequeños ramilletes axilares presentando cada uno de quince á veinte de aquellas, que nacen de un involucreo con cinco divisiones, y se hallan sostenidas por un pedúnculo algo filiforme. El cáliz tubuloso, morófilo con cinco dientes y mucho mas corto que el tubo de la corola. Esta es monopétala, de color blanco amarillento, tubulosa, abultada en su estremidad, y presenta cinco divisiones, cinco estambres con anteras bilobulares, conniventes, mas largas que la corola. Ovario unilobular, achatado en su vértice, del que nace un estilo rugoso terminado por un estigma glanduloso, que sobresale á los estambres. El fruto es prolongado, monospermo con tegumento crustáceo, cuya superficie erizada de un número considerable de pelos rígidos y encorvados, presenta surcos longitudinales irregulares. La raiz es vivaz y ramosa.

Se usan las hojas.

Dia primero.—Debilidad en las articulaciones de los miembros abdominales, inmediatamente.

Vértigos.

Ligero dolor en el lado derecho del cuello, durante cinco minutos.

Calor general escesivo.

5. Frio en las estremidades.

A las once, violentos deseos venéreos, que desaparecen al momento.

Dia segundo.—Por la mañana, dolor de cabeza.

Dolor en las partes laterales del pecho.

Debilidad en los miembros abdominales.

10. Fastidio y disgusto por todo.

Taciturnidad.

Dolor agudo en la oreja izquierda, durante algunos minutos.

Calor en la cara y dolor en el corazon.

Dolores pasajeros en el brazo izquierdo.

15. Dolor pasajero en la pierna izquierda, durante diez minutos.

Sueño escesivo, despues de mediodia.

Dolor de cabeza, despues de paseo.

Por la noche, dolor agudo en la pierna izquierda.

Por la noche, dolor general en los miembros.

20. Dolor de cabeza.

Calor interior.

Por la noche, gran calor interno.

Pulso duro y pequeño.

Dolores lancinantes pasajeros en diferentes partes del cuerpo.

25. Punzadas en la cabeza.

Dolor lancinante en los riñones.

Dolor en el hombro derecho.

Picor ardiente y muy doloroso en la pierna derecha.

Inflamacion catarral en la garganta.

30. Salivacion frecuente y poco abundante.

Dolores pasajeros en el cuello.

Dolor continuo de cabeza.

Débil sensacion de peso en el estómago.

Sensacion de frio al moverse.

35. Vértigos despues de la comida, que duran tres ó cuatro minutos.

Ardor en los ojos.

Olfato muy fino todo el dia.

Cefalalgia frontal continua.

Dolor en la region lumbar izquierda.

40. Pesadez de cabeza con vértigos.

Deseo de dormir, á las nueve.

Constipacion de vientre, orinas rojas.

Dia tercero.—Por la mañana, dolor en el muslo derecho.

Dolor en el cuello.

45. Pesadez en la cabeza y sobre los párpados.
 Taciturnidad.
 Tristeza.
 Languidez escesiva.
 Punzadas en diferentes partes del pecho.
50. Imposibilidad de apoyarse sobre el brazo, por causa del dolor del pecho.
 Dolores en las sienas.
 Debilidad de estómago.
 Palpitaciones dolorosas de corazón.
 Calor en los miembros torácicos y abdominales.
55. Ardor en los brazos y frío en las manos.
 A las nueve de la noche, pulso pequeño y duro, dolor en la pierna derecha durante todo el día.
 Vértigos.
 Continúa pesadez de cabeza.
 Soñolencia.
60. Ardor en los ojos.
 Dolores momentáneos y pasajeros en diferentes partes del tronco.
 Dolor pasajero en el húmero.
 Dolor constante en el muslo y cadera derecha.
 Dolores pasajeros en el cuello.
65. Nuevos deseos venéreos, como en el primer día.
 Calor interno, que desaparece y reaparece momentáneamente.
 Dolores en los costados al inclinarse: pulso débil.
 Dolor de constricción en la garganta.
70. Después de pasear, dolor de cabeza, que dura todo el resto del día.
 Dolores en diferentes partes del cuerpo, que pasan de uno á otro lado.
 Orinas rojas.
 Calor escesivo en la cabeza.
Día cuarto.—Por la mañana, aversión á todo.
75. Dolor en el cuello.
 Dolor en la espalda.

- Dolor de cabeza.
 Calor en la cara.
 Dolor en el estómago.
80. Dolor en el corazón.
 Dolor en el pecho, al verificar cualquiera esfuerzo.
 Dolor en el húmero, al levantar un objeto pesado.
 Ligero dolor de cabeza, sobre las cejas.
 Palpitaciones de corazón.
83. Pulso agitado.
 Ulceracion en las comisuras de los labios.
 Dolor constante en la region iliaca.
 Esputos color de leche.
 Emision fácil de orinas.
90. Dolor al respirar debajo de las costillas falsas del lado izquierdo.
 Igual dolor en el lado derecho, pero mas pasajero.
 Cámaras duras, sin olor.
 Dolores de cabeza por la noche.
 Dolor y dificultad de respirar.
95. Sequedad de la boca.
 Agravacion de un antiguo dolor de pecho.
Dia quinto.—Por la mañana, salivacion abundante.
 Inflamacion del ojo derecho con lagrimeo.
 Labios secos y agrietados por las comisuras.
100. Pesadez de estómago.
 Languidez escesaiva.
 Fiebre ardiente, vértigos, pulso agitado.
 Dolores agudos por todo el cuerpo, durante tres cuartos de hora.
 Dolor en los costados y en la nuca, por la tarde.
105. Terrible dolor en los ojos.
 Cefalalgia frontal.
 Taciturnidad durante algun tiempo.
 Dolor punzante en el corazón.
 Dolor de estómago.
110. Dolor en las articulaciones, que imposibilitan el movimiento.

- Dia sexto.*—Dolor de estómago.
 Dolor en la espalda, estando sentado.
 Languidez y abatimiento general.
 Salivacion abundante.
415. Ligero amargo de boca.
 Dolor en el hueso frontal.
 La pierna derecha está siempre dolorida.
 Dolores de cabeza.
 Dolores en diferentes partes del cuerpo.
420. Esputos blancos.
Dia sétimo.—Dolor en el muslo.
 Dolor en el abdomen.
 Dolor en el hombro derecho.
 Sueños diversos, pero espantosos, terribles, de muertos.
425. Cefalalgia frontal.
 Pesadez en el estómago.
Dia octavo.—Dolor en las articulaciones.
 Dolor en las costillas del lado derecho.
 Dolor en la frente.
430. Débil dolor en el hombro derecho.
 Dolor en la pierna.
 Dolores pasageros encima de la oreja derecha.

SOLANUM OLERACEUM (Velloz).

SOL. OL. *Solanos. Gyquirioba, Juquerioba.*

Planta herbácea con tallo rastrero, algo leñoso, cilíndrico, cubierto en sus ramas superiores de espinas cortas y retorcidas. Las hojas, que tienen un color verde de sombra, son alternas y pinnadas con impar; las hojuelas largas, lanceoladas, casi sesiles con un raguis espinoso, se hallan en número de siete á nueve y aumenta su tamaño en la estrechidad de las hojas. Las flores descansan en pedúnculos ramosos exaxilares; el cáliz acampanado, con cinco divisiones; la corola de color blanco verdoso, monopetala, con cinco divisiones iguales, rotáceas, inclinadas, alternas con las del cáliz. Cinco estambres con anteras erizadas, conniventes y biloculares: sus filamentos son cortos, á escepcion de uno

que escede á los demas. Ovario oval , sobre el cual hay un estilo filiforme. Baya esférica con dos celdillas de color verde oscuro, veteadas de blanco. El solanum oleraceum crece en los sitios húmedos y sombríos.

Se tritura la flor.

4. Emision poco abundante de orina.
Reglas de corta duracion.
Dolor de muelas, por la noche.
Catarro agudo.
5. Tos con sofocacion.
Dolor en la cara.
Dolor de dientes.
Dolor é hinchazon de la cara y de la garganta con inflamacion.
Insomnio durante dos noches.
10. Orzuelo en el párpado inferior del ojo derecho.
Hinchazon de una glándula del cuello.
Rubicundez continua de la cara.
Digestion difficil.
Dolor en el ángulo interno de los ojos.
15. Inflamacion del párpado superior del ojo izquierdo.
Prurito en las piernas.
Erupcion pustulosa en todo el cuerpo. Las pústulas aparecen blancas, se hacen luego rojas y producen de vez en cuando un picor insoportable.
Dolor lancinante de corta duracion en el estómago.
Sensacion de frio en el lado izquierdo del pecho, despues de haber bebido agua.
20. Dolor muy violento en la megilla izquierda, que luego se estiende á toda la cara.
Flujo de mucosidades fétidas por la nariz izquierda.
Aflicion.
Irritabilidad é impaciencia.
Soñolencia y dolor de cabeza.
25. Erupcion herpética en el maleolo.
Fiebre urticaria.
Inflamacion de la garganta.

Prurito.

Salivacion.

30. Falta de apetito.

Lengua cargada de mucosidades blancas.

Insomnio.

Soñolencia durante cuatro horas, al mediodía.

Flujo mucoso blanquecino por la vagina.

35. *Hinchazon de las glándulas mamarias, con gran flujo de leche, el segundo día.*

Soñolencia todo el día.

Poco despues de haber tomado el medicamento una negra de sesenta años, se le hincharon las mamas y secretaron gran cantidad de leche.

PAULLINIA PINNATA (D. C.)

PAUL. *Sapindaceas. Paulinia timbo*, (VELL.) *Guaratimbo, Timbo-sipo, Cururu-apé.*

Esta hermosa enredadera se encuentra abundantemente en los bosques del Brasil. Su tallo, que es leñoso, flexible y tenaz, produce ramos rugosos ligeramente pubescentes y presentan en toda su longitud profundos surcos paralelos. Las hojas son alternas, con peciolo alado, compuestas de cinco hojuelas casi sexiles, ovado-lanceoladas, dentadas, viyugadas, con impar. Las flores son pequeñas, en espiga, colocadas sobre ejes que nacen de la axila de las hojas. Cáliz de cinco hojuelas; corola con cuatro petalos, alternos con las anteriores. Ocho estambres; ovario con tres divisiones uniovuladas. Cápsula piriforme, aguda, en la que se observan tres tubérculos en su parte superior. La raiz presenta largos ramos fasciculados, que terminan en cabellera.

Se tritura la raiz fresca.

1. *Día primero.*—Disgusto, lengua espesa y pastosa, despues de algunos minutos.

Sueña con una mujer leprosa, que le repugna.

Día segundo.—Gran frio.

Cólico, seguido de diarrea rojiza, mezclada con flemas.

5. Cefalalgia, como si la cabeza estuviese cubierta con un gorro de plomo, sobre el cual se dieran golpes.
 Repugnancia á los alimentos.
 Deseo de fiambres.
 Deseo frecuente, pero inútil, de orinar.
 Dolor en la planta del pié al andar, que se aumenta por la presion.
10. Dolor lancinante en el talon.
Dia tercero.—Quebrantamiento de miembros.
 Aturdimiento; la cabeza se inclina hácia adelante.
 Adormecimiento de los piés, despues de haber subido una escalera.
 Gran frio en los brazos, en el pecho y toda la cabeza, á escepcion de las orejas.
15. Conatos á vomitar.
 Cree que la lengua ha disminuido de volúmen.
 Gran ardor en la orina
 Desea estar tranquila y encerrada.
 Sueña que ve leprosos, cuyas llagas brotan sangre.
20. Siente crugirle el pecho y abrírsele.
 Picadura, como por un insecto, debajo del ojo derecho.
Dia cuarto.—Escalofrios, al levantarse.
 Dolor agudo, como por instrumento punzante en el bajo vientre, durante una cámara.
 Picazon en el ojo izquierdo, con inflamacion y lagrimeo.
25. Inyeccion de la esclerótica.
 Ruido en el oido izquierdo durante un cuarto de hora.
 Dolor en el anillo inguinal, como si le cortaran los nervios del muslo.
 Dolor calambroide en el lado izquierdo del hipogastrio.
 Picor y hormiguelo en la garganta.
30. Dolor en las cejas hasta la raiz de la nariz.
 Calor en la planta de los piés.
 Ardor y caloradas en el pecho.
 Presion en el hipogastrio.
 Dolor como si una cuerda apretara alrededor de los hipocondrios.

33. Picazon insoportable con sensacion de quemadura en el pecho.

Martilleo en la sien y encima del ojo izquierdo.

Dolor punzante en el ombligo.

Sensacion muy dolorosa, como por una barra de hierro que le obligase á inclinar la cabeza hácia adelante.

Desvanecimiento continuo.

40. Repugnancia á los alimentos.

Gran deseo de tomar café.

Fatiga general.

Dia quinto.—Dolor en las piernas con rigidez al andar.

Calambre en las yemas de los dedos de la mano izquierda, que se estiende hasta los brazos.

45. Violento dolor presivo en el costado.

Gran picor y supuracion en la parte posterior de la cabeza.

Dia sexto.—Sensacion de martillazos en el vértice de la cabeza, que corresponden dolorosamente á las sienes.

Sueño muy agitado.

Sueña que quiere abrirse el pecho, para ver lo que hay dentro.

50. Presion como por una faja en el pecho y costados, con dolor insoportable como de pinchazos.

Fuertes náuseas.

Dolor lancinante y punzante de tiempo en tiempo en el mamelon del pecho izquierdo.

Dolor cortante, como si le dividieran el cartílago de la oreja izquierda, que se estiende hasta el cuello.

Picor como por millares de agujas en la parte superior del muslo izquierdo, durante cuatro ó cinco minutos.

55. *Dia sétimo.*—Presion como por un aro de hierro alrededor de la cintura, con picor en la parte superior del pecho, que se aumenta con el movimiento.

Dolor calambroide, instantáneo, en la mano izquierda.

Sensacion dolorosa en el estómago, como si hubiera en él una piedra. Se aumenta al hablar, dura una hora.

Dolor como si le clavaran un puñal en el costado derecho.

Dia octavo.—Sueña que ve venir hácia ella un perro sarnoso

- cubierto de llagas , que al fin la muerde , haciéndola prorrumpir grandes gritos , en medio de los cuales se despierta , resintiéndose de un gran dolor en el pecho.
60. Quebrantamiento de cuerpo , como si le hubieran dado una paliza.
Cefalalgia , como si se le abriera la cabeza en dos pedazos.
Lagrimo , sobre todo del ojo izquierdo.
Grande hambre.
Pinchazos en los ovarios.
65. Punzadas dolorosas en los dos lados del vientre.
Dia noveno.—Ardor en el pecho.
Dolor en el maleolo del pié derecho , como por torcedura.
Hormigueo en la garganta.
Dolor de quebrantamiento en la espalda. No puede enderezarse con facilidad.
70. Dolor en el hombro derecho , que desaparece frotándose.
Adormecimiento del hombro.
Vivo picor en el brazo izquierdo.

Segunda experimentacion.

- Dia primero.*—Sensacion de arañamiento en la garganta.
Ardor en la parte anterior del pecho.
75. Respiracion corta.
Dolor pasagero en el hígado.
Dolor agudo en la muñeca izquierda.
Borborismos en el hipocondrio derecho.
Dolor en el hipocondrio izquierdo.
80. Dolor presivo en la region parietal derecha.
Temblor interno en la region umbilical y en el hipocondrio izquierdo.
Dolor en todo el abdómen , aumentado por el tacto.
Dolor en la region del corazon , á las dos de la tarde.
Punzadas en la region precordial.
85. Frio en la parte superior del cuerpo primero y despues general.

Calor y frio en la cara alternativamente.

Sequedad en la boca.

Lengua torpe, voluminosa.

Desvanecimiento.

90. Picor en la boca, como si hubiera mascado un clavo de especias. Este sintoma es persistente.

Entorpecimiento en los brazos.

Temblor en las piernas.

Al andar parece que se cae hácia adelante.

Pereza, ineptitud para el trabajo.

95. Deseo de acostarse.

Ronquera.

Espectoracion amarilla, amarga, difícil y tenaz.

Inapetencia.

A las seis, el dolor del corazon se estiende hasta las últimas costillas.

100. Dolor en la mitad derecha de la cabeza y en el vértice.

Dolor en el lado izquierdo de la cabeza.

Pereza y soñolencia.

Dolor encima de los ojos, que penetra hasta el cerebro.

Dolor en la mama izquierda.

105. A las siete y media, dolor en el costado derecho.

Melancolia.

A las ocho y media, pesadez en la frente, encima del ojo izquierdo.

Dolor en la sien derecha.

Debilidad y pesadez en las piernas.

110. Adormecimiento en la planta del pié derecho y de la rodilla.

Dolor en los omoplatos.

Manchas rojizas en la cara y el pecho.

Punzadas en las mandíbulas.

Tristeza y soñolencia, todo el dia.

115. *Dia segundo*.—Conatos á vomitar, al despertarse.

Dolor en la ingle izquierda, á las ocho.

Sensacion de debilidad en el pecho.

- Dolor en la sien izquierda.
- Dolor en el brazo izquierdo, que se estiende hasta la espalda.
420. Dolor en el vértice de la cabeza, como si se introdujera un clavo.
- Prurito en la mano y los dedos, insoportable hasta el punto de levantarse el epidermis rascándose.
- Profundo disgusto.
- A las cuatro de la tarde, dolor en el costado derecho.
- Calor en las orejas.
425. Dolor en la nuca, á las siete de la noche.
- Dolor en el muslo izquierdo.
- Dolor en las muelas del lado derecho.
- Dolor contusivo en el hígado al tocar las costillas del lado derecho. Se agrava con el movimiento.
- Frio general, por la noche.
430. Dolor junto al codo del brazo derecho, á las nueve de la noche.
- Dia tercero.*—Punzadas agudas debajo del brazo derecho, por la mañana al levantarse.
- Dolor en el cuello.
- Punzadas en el costado izquierdo.
- Pesadez de cabeza con dolor en la sien derecha.
435. Calor en la cara.
- A la una, punzadas debajo de la mama derecha.
- A las dos, dolor sordo en la oreja izquierda.
- Punzadas en el hígado.
- Dolor de cabeza, por la noche.
440. *Dia cuarto.*—Dolor en todo el vientre.
- Deseo extraordinario de café y frutas.
- Constipacion de vientre.
- Continuacion del dolor de muelas.
- Dolor debajo del brazo derecho.
445. Dolor en la parte interna del brazo derecho.
- A las cuatro de la tarde, punzadas en el costado derecho.
- Dia quinto.*—Sueño de muertos.
- Vision de cadáveres.

Cefalalgia y vivo dolor en la sien derecha.

450. A las ocho de la mañana, dolor desde el brazo hasta el pecho.

Ardor en el pecho, alrededor de las mamas, que parecen oprimidas por un aro de hierro.

Vacilacion al marchar.

Amargo de boca.

Saliva abundante.

455. Respiracion corta.

Dolor en el brazo izquierdo, al estenderlo.

Dolor en el cuello, que se alivia al aire libre.

Dolor debajo de la clavícula y axila derechas, á las seis de la tarde.

Insomnio.

460. *Dia diez y seis.*—Diarrea.

Dolor en el costado derecho.

Dolor reumático en las rodillas.

Dolor alrededor del ombligo.

Dolor en el pecho.

465. Cefalalgia, todo el dia.

Deseo de pasear.

Punzadas en la region del bazo, á mediodia.

Dolor en el hombro derecho, á la una.

Frio, á las tres.

470. Escalofrios con soñolencia y dolores artríticos

A las tres y media, punzadas en el costado derecho.

A las seis de la tarde, punzadas debajo de la mama derecha.

Pesadez en la cabeza y la frente.

Dia sétimo.—Respiracion corta.

475. Dolor en la cara interna del esternon.

Dolor en la muñeca derecha.

Dolor en las articulaciones.

Dolor en la oreja derecha.

Espustos estriados de sangre.

180. Por la noche, dolor de cabeza con imposibilidad de bajarla.

Tos violenta, con inflamacion de la garganta.

Temor de hacerse tísica.

Sueños muy tristes.

Dia octavo.—Parece que el pecho se le abre al respirar.

185. Tos seca y corta.

Dia noveno.—Por la mañana, cefalalgia.

Cansancio en las piernas.

Dolor, como si le arañaran, desde el costado izquierdo hasta el brazo.

Dia décimo.—Dolor alrededor del ombligo.

190. Punzadas en el costado derecho.

Punzadas en el ojo derecho con lagrimeo.

Ardor en toda la espalda.

Gran apetito todo el dia.

Sueño de muertos, y llanto al despertarse.

195. Tos seca y corta.

Dia once.—Opresion de pecho.

Tos seca.

Dolor en el costado derecho.

Inapetencia.

200. Ulceracion de las piernas con prurito.

BLATTA AMERICANA.

BLAT. *Kakerlat americana.* (SAR.) *Baratta.*

Este insecto ortoptero, que abunda mucho en el Brasil, se cria en el interior de las casas. Su cuerpo es prolongado, oval, algo achatado, de 32 á 33 milímetros, de color pardo rojizo, algo mas claro en el abdomen. El protorax es liso, reluciente, de color amarillo de ocre, y presenta dos grandes manchas pardas, que á veces se reunen y constituyen una sola. Los elitros del macho esceden en longitud al abdomen en unos nueve milímetros, mientras que los de la hembra son un poco mas cortos: presentan numerosas estrías longitudinales, que se bifurcan cerca del borde puntiagudo en que termina el elitro. Las alas son estriadas y reticuladas, de igual longitud que los elitros. Las antenas, que son mas largas que el resto del cuerpo, presentan en su base una pequeña man-

cha amarillenta. Las patas están guarnecidas de espinas negras, y terminan por un tarso con cinco articulaciones.

Se tritura el insecto entero y vivo, si es posible, durante un cuarto de hora. Se unen dos ó tres granos de esta masa con ciento de azúcar de leche para hacer la primera dinamizacion.

4. *Dia primero.*—Dolor presivo en las sienes.

Aturdimiento y pesadez de cabeza.

A las siete de la mañana, hormigueo en los dedos de los piés.

Dolor, que pasa de la espalda al omoplato.

5. Pinchazos, como de agujas en el lado izquierdo del cuello.

Ardor en la uretra al orinar.

Picadura como de mosquito en el lagrimal izquierdo, á las diez de la mañana.

Sensacion de flogedad en las pantorrillas.

Color amarillo de la cara.

10. Color amarillo de la esclerótica.

(Cuando el esperimentador padeció una ictericia, para la cual se considera empíricamente en el Brasil á la *Blatta* como específico, esperimentó una série de síntomas, reproducidos ahora por la presente esperimentacion).

Bostezos frecuentes.

Flujo acuoso por la nariz.

Lagrimeo.

Hinchazon pasagera de la boca del estómago.

15. Soñolencia, despues de mediodia.

A las cuatro de la tarde, dolores agudos en las sienes, que se reproducen á intervalos aproximados.

Frio y escalofrios, durante media hora.

Dolor en el pié derecho, desde la estremidad de los dedos hasta las rodillas.

Colico ligero.

20. Dolor en el lado derecho de la espalda.

Escalofrios; sensacion de calor y ligera escitacion general.

Dolor en el colon transverso, en el duodeno y la boca del estómago.

Dolor en el dedo pequeño del pié izquierdo.

Dolor en el costado derecho.

25. Nueva aparicion de escalofrios, durante una hora.

Continuacion del dolor de las sienes.

Color amarillo de la orina, cada vez mas pronunciado.

Saliva muy salada.

Dia segundo.—Dolor en la sien, con punzadas de vez en cuando.

30. Sensacion de laxitud en las pantorrillas.

Dolor en distintas partes de los piés, y algunas veces en las plantas.

Pereza.

Bostezos frecuentes.

Dolor agudo en el pecho, despues de mediodia.

35. Calambre en la pantorrilla derecha.

Laxitud estrema al subir escaleras.

Dolor muy fuerte en el pecho, con dificultad de la respiracion.

Orina muy albuminosa, de color amarillo fuerte.

(Se suspendió la esperimentacion por un accidente imprevisto).

DELPHINUS AMAZONICUS.

DELPH. *Delphinus Geofroyi* (DESM.) Peixe boi.

—Este delfin, que nos parece ser el *Delphinus Geofroyi* de Desmarest, tiene de tres metros á tres y medio de longitud. Su cuerpo grueso y cilindrico es de un color gris oscuro por encima, y blanco completamente por debajo. Sus mandibulas, iguales en estension, son largas, estrechas, lineares, provistas en cada lado de veintiseis gruesos dientes cónicos, un poco rugosos, con coronas dilatadas. La frente es muy aplanada, y tiene colocados los ojos un poco por encima de la comisura de los labios. Las aletas pectorales son grandes, un poco oscuras, y colocadas muy bajas; la dorsal se eleva en forma de media luna. Este delfin, como su nombre indica, habita en la embocadura del rio de las Amazonas. Su piel, espesa y fibrosa, es la que se emplea para trituracion.

(El experimentador, antes de tomar el medicamento habia padecido accesos de tos con sofocacion, durante los cuales, le salia con gran violencia un asa intestinal por una hernia que padecia).

4. *Dia primero.*—Dolor en el ombligo, á los cinco minutos.
Sensacion de aire en el estómago, con inflamamiento de vientre.
Dolor en la region lumbar, por la mañana al levantarse.
Eructos.
5. Dolores violentos de quemadura y escoriacion desde el muslo derecho hasta el talon; despues, hasta el hombro derecho. Se aumentan por el tacto.
Crugido de las articulaciones de los dedos de los piés, siempre que los mueve.
Dolor en la ceja derecha que pasa con rapidez.
(La hernia no sale con tanta fuerza al toser).
Dia segundo.—Boca pastosa.
10. (La tos y la sofocacion han disminuido).
Cefalalgia.
Fuerte cólico, con deposiciones blandas, de olor ácre.
Dolor en la region lumbar.
Por la noche, dureza de vientre especialmente del lado derecho, donde siente como una bola, dolorosa al tacto.
15. Sequedad de los labios.
Dia tercero.—Sueño agitado é interrumpido.
(Continuacion de la tos).
Dolor en la region lumbar.
La dureza que sentia en el lado derecho del vientre, ha pasado al izquierdo.
20. Epistaxis por la nariz izquierda.
(Antes de tomar el medicamento la tenia frecuentemente por la derecha).
Dia cuarto.—Agrios de estómago.
(Accesos de tos con desvanecimiento).
Erecciones muy fuertes, con gran escitacion del apetito venéreo.
Picor en el ano, como por vermes intestinales.

25. Todos los huesos de la cavidad torácica se encuentran atacados de dolores reumáticos.

AMPHISBOENA VERMICULARIS (Wagl).

AMPH. *Amphisbène*

Esta especie, que marcha indistintamente en sentido de la cabeza ó de la cola, se encuentra en abundancia en los bosques del Brasil. Su cuerpo cilíndrico y largo de 50 á 80 centímetros, está terminado por una cola muy obtusa. No tiene escamas propiamente dichas, pero tiene la piel dividida en compartimientos cuadriláteros, dispuestos en forma de anillos alrededor del cuerpo, en número de doscientos veintiocho para el tronco y veintiseis para la cola. El lábio de la cloaca está dividido en seis láminas largas y estrechas; la cabeza pequeña, un poco aguda, é indistinta del cuello, está defendida por escamitas en forma de escudos. Tiene los ojos muy pequeños, y la mandíbula no es dilatable; los dientes caninos encorvados, desiguales y separados los unos de los otros; las narices laterales y abiertas en una placa única, la naso rostral. El color de la *amphisbena* es pardusco por encima y blanco-rosado por debajo.

Obtuvimos el veneno de este reptil cortando una porción de la mandíbula, estando vivo, y triturándola inmediatamente.

Afecciones generales.

4. Desfallecimiento.

Tristeza y gran laxitud por la mañana, que se disipa andando al aire libre.

Sentimentalismo que inclina á la dulzura.

Gran dolor en la columna vertebral, que se aumenta andando, moviendo los brazos y bajándose.

5. Grano muy doloroso y voluminoso en el lado izquierdo del labio superior, que termina por supuración.

Erupción miliar rosácea, (sarna seca curada), caracterizada por placas estensas de figura elíptica. Cuando se ha curado la erupción tiene lugar una descamación furfurácea en el sitio correspondiente á las placas.

Despierta á media noche precisamente, diez dias seguidos

- Sueño interrumpido.
 Abatimiento.
10. Abandono.
 Impaciencia.
 Pesadez en la frente y los parietales.
 Pesadez sobre la frente.
 Gran aturdimiento y vértigos con valanceo, que parece como si le empujaran alternativamente ya de uno ya de otro lado.
15. Dolor como de orzuelo en el ángulo interno del ojo derecho.
 Latidos en la sien derecha, como si la azotara el granizo.
 Sudor en la cabeza.
 Perturbacion de las sensaciones; experimenta horribles dolores de cabeza, y cree que los piés se le han subido al cerebro.
 Aturdimiento como por embriaguez, al volver la cabeza.
20. Temblor continuo de los párpados superiores, especialmente del izquierdo.
 Constriccion del ojo derecho.
 Dolor y punzadas en el ángulo esterno del ojo izquierdo.
 Sensacion de un grano de arena en el ojo derecho.
 Fatiga de los ojos por la noche con imposibilidad de mirar la luz.
25. Lagrimeo y contraccion del ojo izquierdo.
 Dolor en el oido como por introduccion de aire.
 Punzadas y calor sobre el pómulo derecho.
 Dolores sordos *en el hueso de la mandibula inferior derecha*.
 Punzadas y dolores con desvanecimiento en todo el lado derecho de la cabeza.
30. Dolores *en la mandibula inferior derecha* é inchazon considerable, que se agrava con el aire y la humedad.
Hinchazon de la mandibula inferior derecha, que se agrava al aire libre.
 Sensacion de alargamiento de los dientes y dentera, sobre todo en los molares inferiores del lado derecho.
 La odontalgia es mas fuerte por la tarde y la noche.

- Imposibilidad de mascar sin experimentar dolores ; pero los líquidos no le impresionan.
33. Hinchazon de las amígdalas.
Dificultad de déglutir , especialmente la saliva.
Salida de una hernia umbilical.
Frio y dolores en el epigastrio.
Dolor desgarrador alrededor del ombligo.
40. Supuracion de una hernia inguinal.
Dolor en la hernia , donde se siente y oye aire encerrado.
Punzadas como por instrumento afilado alrededor del ombligo.
Constipacion.
Las placas de la erupcion miliar de pequeños granos rosáceos , se estiende sobre todo el pecho , el cuello y la espalda con gran picazon , mas fuerte por la mañana que por la tarde y noche.
45. Poco á poco se forma una perla blanca en cada grano , la que segrega una serosidad clara , despues de lo cual la erupcion se deseca al quinto dia.
Erupciones miliares de pequeños granos , sobre todo en el antebrazo.
Hinchazon muy dolorosa del brazo derecho.
Calambre en la pierna izquierda.
Retraccion de las piernas sin dolores.
50. Calambres en la pierna izquierda , que la dejan inclinada hácia adelante , como paralítica.

RESINA ITU.

ITU.

Esta resina , importada de la provincia de San Pablo , se empieza empíricamente en el Brasil contra las hernias.

1. *Dia primero.*—Dolor sordo en la cabeza , que se agrava inclinándola.
Vértigo , con tendencia á caer del lado derecho.

- Dolor en la cabeza á la menor humedad, que desciende hasta la articulacion de la mandíbula.
- Entorpecimiento de la articulacion del tarso, estando sentada.
5. Dolor de dentro á afuera en el bajo vientre.
- Sensacion de frio en el hipogástrio, sobre todo por la noche.
- Dia segundo.*—Sueño ligero por la noche, pero continuo.
- Bostezos prolongados.
- Dolor de cabeza presivo en la frente y sobre los ojos.
10. Latidos en la sien derecha.
- El dolor se propaga hasta la oreja y la articulacion de la mandíbula.
- Torticolis del lado izquierdo.
- Punzadas en el lado derecho de la frente.
- Náuseas, aumentadas por el movimiento.
15. Dolor en el hipocondrio izquierdo, inclinándose hácia adelante.
- Dia tercero.*—Gran picor en la estremidad esternal de la clavícula derecha, seguido de un herpe húmedo, que desaparece á las seis horas.
- Dia cuarto.*—Gran prurito en el brazo derecho, que se cubre de granitos muy encendidos, redondos, como cabezas de alfiler.
- El prurito desaparece en el dia, pero subsiste la erupcion.
- Erupcion de granos en la parte lateral izquierda del cuello, que aunque menos inflamados, causan el mismo prurito.
20. Adormecimiento de las piernas, que le impide estar de pié.
- Dia quinto.*—Gran rigidez en la nuca, con dificultad de mover la cabeza.
- Dolor en la nuca, que atraviesa hasta la frente, haciendo inclinar la cabeza hácia adelante, y produciendo pesadez y adormecimiento.
- Desaparicion de los granos del brazo y del cuello.
- Dia sexto.*—Calambre en la articulacion del pié izquierdo.
25. Cámaras involuntarias.
- Dia sétimo.*—Sensacion de un pistoletazo en la oreja, con dolor insoportable hasta en los dientes, durante dos ó tres

minutos. Este síntoma se reproduce de hora en hora, hasta cuatro veces en la mañana.

Entorpecimiento muy marcado en la articulacion de la garganta del pié, siempre que la levanta.

Diarrea abundante sin dolor.

Cámaras abundantes, amarillas, diarréicas.

30. *Dia octavo.*—La sensacion de pistoletazo en las orejas se reproduce hasta ocho veces durante el dia.

Sudor abundante despues de las detonaciones.

El viento agrava los sufrimientos.

Dolor lancinante en la region del hígado, agravado por el movimiento.

Aturdimiento; la cabeza se cae hácia adelante.

35. Pesadez sobre los ojos.

Dolor quemante en el ano, despues de haber estado sentado.

Cosquilleo en los ojos.

Ardor quemante en los párpados: vision de puntos negros voltigeantes, como cabezas de alfiler.

40. Acceso de dolor desde la oreja hasta los dientes, menos violento pero mas prolongado, que el precedente.

Dolor lancinante en la órbita del ojo izquierdo, que obliga á contraer la ceja.

Odontalgia, aumentada por beber agua fria.

Dia noveno.—Calor quemante seguido de gran picor en la vulva.

Calambre doloroso en el tendon de Aquiles.

45. Cámara amarilla muy clara.

Estornudos repetidos.

Coriza.

Calambre doloroso desde la pantorrilla hasta el talon.

Torpeza y laxitud en las piernas, por la noche.

50. *Dia doce.*—Fuerte dolor en la articulacion de la rodilla.

Sensacion de engrosamiento de la lengua, como si llenase toda la boca, aunque en realidad no ha aumentado de volúmen.

Lengua encendida.

Gran dificultad de hablar y mover la lengua.

Inflamacion de las amígdalas.

55. Dolor en la garganta, con sensacion de un tapon que obstruyera la faringe.

Dolor en la mama izquierda.

Gran prurito en el mamelon de la mama izquierda, sobre todo por la mañana

Dolor repetido en la fosa iliaca izquierda, al estender la pierna ó ponerse de pié, muchos dias seguidos.

JANIPHA MANIHOT.

JAN. *Jatropha manihot.* (LINN.) *Manihot utilisima* (POHL.) *Manioca mandi.* *Euforbiaceas.*

El manihot, muy cultivado en toda la América del Sur, por su raiz alimenticia, es un arbusto de tallo redondeado y ramoso de la altura de un metro. Sus hojas de un verde oscuro, colocadas en largos pecíolos, son alternas, palmeadas, con cinco ó siete lóbulos lanceolados, lisos y muy enteros. Flores monóicas, formando panículas ramosas terminales ó axilares; su perianto es calicoideo, acampanado, con cinco profundas divisiones de color amarillo pálido, manchado de oscuro en la estremidad de las divisiones. Las flores machos tienen diez estambres, cuyos filamentos, alternativamente largos y cortos, vienen á ingerirse sobre un disco carnoso, que en las flores hembras rodea la base de un ovario subglobular con tres celdillas uniovuladas. No tienen estilo, pero tres estigmas presentan seis ó siete lóbulos espesos, achatados, formando una masa compacta y sinuosa. Las raices, que son tuberculosas y muy gruesas, contienen en abundancia un jugo lechoso, muy venenoso en estado reciente, que se estrae por la presion primero y despues por la desecacion, quedando la parte feculenta que sirve de ordinario alimento á los agricultores brasileños.

Este zumo es el que se emplea para la trituracion.

En la sesion pública del Instituto del dia 2 de julio de 1845 se esprimió una gran cantidad de este zumo peligroso, que tomó á presencia de todos y en cantidad de una onza, Juan Vicente Martins. Muchos discípulos siguieron su ejemplo, y en igual dosis lo tomaron Chedifer y Antonio de Souza Diaz. Habiendo obligado la violencia de los síntomas á la mayor parte de los esperimentadores á tratarse activamente, el número de los fisiológicos recogidos ha sido poco considerable.

Esperimentador: JUAN VICENTE MARTINS.

4. *Dia primero.* Eructos, á las seis y media de la mañana.
Sensacion de sequedad en el exófago.
Pesadez en el estómago.
Deseo de dormir por el dia.
5. Sed.
Sueño tardío.
Cámaras mas fáciles que de ordinario.
Dolor en el velo del paladar.
Dolor en el interior de las órbitas.
10. Dolor en el interior del pecho.
Debilidad de las rodillas al subir escaleras.
Tristeza.
Debilidad.
Aturdimiento.
15. Dolor agudo en el brazo izquierdo, por la noche.
Dia segundo.—A las seis de la mañana, dolores vagos en el vientre al orinar.
Cámaras abundantes, claras, acuosas, de olor fétido.
A las ocho, nuevo deseo de deponer, pero sin resultado.
Apetito al empezar á almorzar, pero cesa de repente despues de tomar leche.
20. Hinchazon de la amigdala izquierda.
Sudores abundantes durante el sueño. Cesan al despertar.
Cámaras acuosas, verdes y fétidas.
Dolores sordos en el estómago y los intestinos con borborismos.
Dolor con punzadas en la uretra, durante diez minutos.
25. Tenesmo y presion con prurito en el esfínter del ano, á las tres de la tarde.
A las cuatro, pesadéz de cabeza, especialmente en la frente.
A la misma hora, sueño.
Sueña que quiere salvar un niño asfixiado, cuyos padres se oponen á ello.

Aturdimiento.

30. Despierta de mal humor.

Temblor de las rodillas y de todos los miembros, con violenta emocion al oír hablar de enfermedades que él supone y teme que vá á padecer.

Dolor en los costados y en los hombros, agravado por el movimiento.

Dia tercero.—Dolores vagos y pasajeros, aunque muy agudos en el estómago.

Sudor muy fétido en las axilas y el escroto.

35. Boca pastosa y aliento fétido.

Ruido de oídos, como si estuviera al lado de una caldera de vapor.

Ligero ardor en la uretra.

Hinchazon de los maleolos.

Dolor en la espalda.

40. Dolor en el codo izquierdo.

Abatimiento moral y físico.

Dia cuarto.—Pesadez en el estómago toda la noche: se alivia aplicándose las manos.

Ilusiones de la vision.

Boca amarga.

45. Dolor en la frente y las fosas nasales.

Dia quinto.—Dolor en la parte interna del muslo.

Sueña que ve llamas pequeñas, semejantes á las que ofreció la décima atenuacion de *Crotallus cascabella* en el experimento del microscopio solar, hecho en el Instituto homeopático de Rio-Janeiro.

Dia sexto.—Sofolencia.

Diarrea, por la mañana.

50. Dolor en la region lumbar.

Frio glacial en las rodillas.

Dia sétimo.—Frio glacial debajo de los omoplatos, aun estando en la cama bien arropado.

Frio en los piés y las manos.

Dia octavo.—Dolor reumático en el muslo derecho.

55. Frio glacial en el brazo , penetrante hasta el hueso.
Frio en toda la cabeza , y mayor aun en la nuca.

MELASTOMA AKERMANI.

MEL. Tapixirica.

Esta especie, no descrita aun por los autores , es un arbusto con ramos redondeados , que van haciéndose triangulares en su estremidad, cubiertos por una corteza pardusca. Las hojas son opuestas , sobre peciolo cortos y vellosos; su limbo oval , muy reticulado , cubierto de pelos rígidos, y recorrido en su cara inferior por cinco gruesos nervios, casi paralelos desde la base á la punta de la hoja. Las flores son sesiles, colocadas sobre ejes terminales.

Se emplean las hojas.

4. *Dia primero.*—Por la mañana, dolor en el esternon.
Frecuentes estornudos.
Calor general.
Palpitaciones del corazon.
5. Ruido en el oido izquierdo.
Eructos ágrios.
Salivacion abundante.
Escalofrios; despues sudor.
Vértigos.
10. *Dia segundo.*—Dentera.
Pinchazos como de alfiler en el vértice de la cabeza.
Picor en los piés , en los maleolos y en las muñecas:
(Curacion de antiguos cólicos con diarrea).
Calor y prurito por la noche.
Tenesmo con constriccion del esfinter.
15. Dolor en el periné.
Orinas claras y espumosas.
Dureza del miembro , aun sin ereccion.
Orinas de olor punzante.
Hormiguelo en los dientes.
20. Ardor y picor en el ano.
Picor en la uretra.

Debilidad en los muslos.

Orinas abundantes.

Punzadas en el periné, en la uretra y los testículos.

25. Borborigmos.

Orinas mas cargadas y menos espumosas.

Dolor de vientre.

Abatimiento.

Palidez de la cara.

30. Soñolencia por el día.

Sedimento blanco en las orinas.

Orinas albuminosas.

Terrible dolor desde el periné hasta la ingle. Dura seis horas.

Escalofrios violentos durante cuatro horas, seguidos de calor sin sudor.

35. Lengua blanca.

Boca amarga.

Dolor de riñones.

Orinas rojas sin olor, con cuajarones sanguinolentos.

Cefalalgia y sensibilidad del cuero cabelludo.

40. Hinchazon edematosa de las piernas.

Erupcion en los labios, sobre todo en el superior.

Calor interno.

SEDINHA.

Planta hervácea de tallo lampiño, redondeado y pubescente, cuyas hojas son opuestas, lanceoladas y muy agudas. La cara superior es velosa, de un verde mas oscuro que la cara inferior, cuyos pelos son largos y sedosos.

Se emplean las hojas de esta planta, muy comun en los alrededores de Rio Janeiro.

1. Dolor presivo en la articulacion de las cuartas costillas con el esternon.

Prurito interior y deseo de rascarse en el epigastrio.

Pinchazos en la region hepática.

Tenesmo.

- 5 Quemar las orinas , como si fueran agua hirviendo.
Sueños agitados , de asesinatos , de animales monstruosos.
Malestar y repugnancia , al ver otras personas comiendo.
Dolor en el epigastrio , al enderezar el cuerpo.
Presion en las sienes y el vértice de la cabeza.
10. Dolores osteocopos debajo de los ojos.
Bostezos continuados , dos horas seguidas.
Dolores abdominales , despues de comer , que parten de la region epigástrica , con ligeros cólicos.
Gran sensibilidad de los dientes , con dentera , sobre todo en los incisivos derechos superiores.
Picor en la oreja izquierda , con abundancia de cerumen.
15. Dolor hormigueante en el pulmon derecho.
Espectoracion de mucosidades sanguinolentas.
Descamacion de los dedos de las manos , hasta las uñas.
Picor en el pubis.
Granos pruritosos en la espalda , pecho y brazos.
20. Cólicos por la noche con incarceration de flatuosidades.
Dolor de muelas despues de comer , con gran sensibilidad y hemorragia de las encías.
Dolor en las muelas empastadas.
Dolores de cabeza y sensacion como si la cavidad frontal contuviera agua.
Sensacion de escoriacion en la uretra.
25. Dolor ligero al orinar.
Flujo por la uretra de agua mezclada con copos mucosos.
Ardor quemante en el dorso de la mano , como si la hubiera espuesto al sol , con descamacion á los pocos dias.
Sensibilidad escesiva de las encías y dentera en los dientes incisivos.
Sueños estremadamente alegres. Se vé perseguido por codrilos , y los ahuyenta con solo estornudar.
30. Agravacion de los síntomas por el café.
Dentera y sensacion de frio en los dientes incisivos.
Cáries de un diente incisivo.

SPIGGURUS MARTINI. (Nobis).

SPIG. *Spiggurus spinosa* (FR. CUV.) *Hystrix sub-spinosus*.
Cui.

Este animalito es muy comun en el Brasil : habita en los bosques y trepa á los árboles con ayuda de sus patas traseras , sirviéndose de su larga cola para bajar. La longitud del *spiggurus* es de treinta y tres centímetros, desde el hocico hasta el nacimiento de la cola , siendo esta casi tan larga como el cuerpo. Todas las partes superiores de este animal están defendidas por espinas muy agudas, de 30 á 35 milímetros de largas y adheridas á la piel por un pedículo muy fino. Las de la cabeza son blancas en su base, negras en el centro , y pardusco-amarillentas en la punta ; las de la region dorsal de un amarillo de azufre en su base. En las ancas y el tercio anterior de la cola, son negras en su estremidad. Las espinas son muy compactas y están mezcladas con pelos largos y finos; los miembros inferiores cubiertos de un pelage gris, salpicado con algunas espinitas ; la cola , espinosa en su parte superior y cubierta de pelos duros y negros , excepto en su estremidad , que es pelada.

Se trituran las espinas arrancadas de los costados.

Experimentador : JUAN V. MARTINS.

Dia primero.—A las ocho de la mañana tomó una dosis de la tercera dinamizacion.

1. Náuseas con deseo de vomitar al ver cualquier alimento , inmediatamente.

Despues de comer , soñolencia.

Por la tarde , ninguna disposicion para el trabajo.

Por la noche , sensacion de sequedad y plenitud en el estómago.

5. *Dia segundo.*—Se despierta muy temprano.

Sueños alegres y tranquilos.

A las cinco de la mañana , estando acostado , sensacion de plenitud en el abdómen.

Diarrea.

Dolores pasajeros en los dedos de los piés , en la sien derecha y en un diente canino del lado derecho.

10. Dolor en la estremidad inferior del cúbito derecho.
 Dolor en la apófisis cigomática derecha.
 Dolor en el primer diente incisivo.
 Hemorragia por las encías.
 Dolor en el centro de la cabeza.
15. Zumbido de oídos.
 Se le doblan las rodillas y las articulaciones tibio-tarsianas.
 Los dolores de dientes se hacen cada vez mas fuertes.
 Despues de comer desaparecen todos los dolores.
 Escalofrios con castañeteo de dientes.
20. Tos con dolor en el pecho.
 Dolor hácia el lado izquierdo del corazon, que le corta la palabra durante dos minutos.
 Dolor en el brazo derecho, desde la mano hasta el codo, como si tuviese una cuerda que le impidiese estender el brazo.
 Se alivia agitando el brazo en todas direcciones y levantando cuerpos pesados: vuelve la agravacion siempre que cesa de ejecutar estos movimientos
 Despues de almorzar, dolor terebrante en los huesos de la cabeza.
25. Agravacion en la cama y alivio al aire libre.
 Dolor de estómago, como si le oprimiera una faja.
Dia tercero.—Duerme tranquilamente y sueña de cosas alegres. Por la mañana vuelve á dormirse y sueña que ve muchos insectos y una serpiente, que costó gran trabajo matar.
 Sensacion dolorosa en la articulacion de la mandibula.
 Silvidos y zumbido en el oido izquierdo, que penetran hasta la nuca.
30. Pinchazos de larga duracion en la apofisis cigomática.
 Por la mañana, gran disposicion para escribir, que desaparece despues de almorzar.
 Desde las diez á las once, gran pesadez de cabeza.
 Descamacion abundante del lábio superior y la barba.
 Continuacion del silvido de oídos.

35. Por la tarde, paseando á caballo, fuerte dolor en los músculos intercostales.
De tiempo en tiempo, punzadas en el vértice de la cabeza.
Dolor en la estremidad inferior de los cubitos.
Aturdimiento en la parte posterior de la cabeza, al escribir.
Ruido en los oídos, como si hubiera cerca de ellos un moscardón.
40. Amargo de boca hasta la garganta, con gusto salado.
Náuseas con dolor penetrante en la espalda, durante un cuarto de hora.
Día cuarto.—Dolor de cabeza, terebrante, que penetra á través de los huesos.
La misma tos que el día anterior.
Debilidad general.
43. Soñolencia todo el día.
Punzadas en el lado derecho de la cabeza, con imposibilidad de moverla, durante tres minutos.
Dolor en el dedo grueso del pié derecho, que impide andar durante dos minutos.
Inflamamiento doloroso del vientre, antes de comer.
50. Despues de haber tomado té, gran picor en el pubis.
Día quinto.—Salivacion abundante.
Lagrimeo de ambos ojos.
Dolor en el costado izquierdo; dura cinco minutos.
Punzadas en el epigastrio, como por agujas.
53. Dolor en el costado izquierdo, en el momento de bajarse.
Dolor desde la oreja izquierda hasta la mandíbula, durante dos minutos.
Constriccion general desde el cuello hasta el diafragma.
Pesadez de cabeza con desfallecimiento de los brazos.
Entorpecimiento é insensibilidad durante media hora.
60. Dolor en el costado derecho, como si hubiera en él un cuerpo extraño.
Gran dolor en la uretra, despues de haber orinado.
Agravacion de este dolor al doblar el cuerpo para cojer algo del suelo.

Dolor alrededor del ombligo.

Inflamamiento doloroso del vientre hasta el anillo inguinal izquierdo.

65. Soñolencia.

Gran apetito.

Náuseas despues de comer.

Escalofrios de rato en rato.

Calor y hormigueo en los piés.

70. Por la noche, sueños alegres.

Dia sexto.—Picor en todo el cuerpo, que obliga á rascarse hasta hacerse sangre.

Dolor en el brazo derecho, como si los huesos estuvieran quebrantados.

Sordera del oido izquierdo, como si estuviera tapado.

Carácter inconsecuente y caprichoso.

75. *Dia décimo.*—La caspa de la cabeza y de la barba forma una costra tan espesa, que ni el frio, ni el calor, ni el agua del baño, le hacen impresion.

Disposicion irritable hasta el punto de enfadarse por la menor cosa.

Grietas entre los dedos de los piés.

Gran dolor en la region renal izquierda.

Silbidos en los oidos constantemente.

80. Torpeza en la pronunciacion.

Encanecimiento del cabello.

Caída de los cabellos.

Todo le fastidia: deseo de viajar.

JACARANDA CAROBA.

JAC. *Bignonia Caroba.* (WELL). *Carob. Bignoniaceas.*

Arbol de siete á ocho metros de alto, de madera blanca y cima ramosa. Hojas pinnadas, tri ó cuadri yugadas, compuestas de cinco á nueve hojuelas, opuestas, sentadas, lampiñas y ovales. Flores grandes, violadas, colocadas sobre pedúnculos ensanchados en su estremidad formando panojas terminales. Caliz tubuloso, con cinco dientes, lo

mismo que la corola, ligeramente veloso en su parte exterior y un poco patente en su limbo, el cual tiene cinco divisiones obtusas. Cinco estambres, de los cuales uno avorta; ovario ovoideo con un estilo sencillo, terminado por un estigma bilaminar. Legumbres lineares y comprimidas. Esta planta es muy comun en los jardines y plantaciones del Brasil. Florece en setiembre.

Se tritura la flor.

Muchas especies de Caroba se emplean en el Brasil para combatir las enfermedades sifiliticas; pero entre ellas hemos elegido la Jacaranda Caroba, la cual nos ha dado resultados tan satisfactorios como pudiéramos desear, siendo, segun creemos, uno de los mas importantes especificos para la curacion de la sífilis.

4. *Dia primero.*—Dolor en el corazon. Lo siente latir con lentitud, apoyándose sobre el pecho, á las nueve de la mañana.

Dolor tractivo en la parte superior y derecha del epigastrio, á media noche.

Sequedad y picor general.

Dia segundo.—Insomnio por la noche y soñolencia por el dia.

5. Sequedad en la boca, por la mañana en la cama.

No siente latir el corazon, por la mañana en la cama.

Latidos irregulares del corazon, paseando al aire libre.

Dolor en el corazon, casi constantemente.

Pulso lleno y muy lento, por la mañana en la cama.

Cansancio al hablar.

10. Dolor tractivo, desde la axila hasta las costillas falsas del lado derecho, á las nueve de la mañana.

Dolor sordo debajo del esternon, al levantar la cabeza ó al aspirar.

Come poco, aunque tiene buen apetito, á las nueve de la mañana.

Debilidad general, por la mañana.

Débil dolor en la articulacion de la segunda falange de los dedos de la mano derecha, á las nueve y media de la mañana.

13. Debilidad de las piernas.

- Dolor de quebrantamiento al andar, en la rodilla derecha, á las diez y media.
- Sensacion continúa de quebrantamiento en los músculos y huesos de las piernas.
- Dolor tractivo desde el ojo hasta la mandíbula inferior derecha; despues, espasmodizacion de la piel de la misma region, á las once de la mañana. Este dolor se reproduce luego, y al fin se hace contusivo.
- Sensibilidad del hueso maxilar, oprimiéndolo con el dedo.
20. Sensacion como si la punta del corazon estuviera dolorida, al mediodia.
- Respiracion precipitada, con sensacion de plenitud debajo del esternon. (Este síntoma se repite muchas veces en el dia.)
- Dolor en las costillas falsas del lado derecho, á mediodia.
- Estreñimiento de vientre.
- Traccion instantánea del flexor comun de los dedos hasta la muñeca izquierda, á las doce y media.
25. Traccion desde la estremidad inferior del cúbito derecho hasta el dedo pequeño, á la una.
- Cansancio con necesidad de estar sentado.
- Debilidad de las piernas y de la region lumbar, á las dos.
- Ligero dolor debajo de las costillas derechas, á las dos y media.
- Dolor de plenitud en la sien derecha; desaparece para presentarse en la izquierda, y despues en el lado izquierdo de la nuca, por la tarde al aire libre.
30. Sensacion de plenitud en la cabeza, despues de mediodia.
- Dolor sordo en el lado derecho de la frente, que desaparece para presentarse en el lado izquierdo, por la tarde.
- Dolor de escoriacion en el borde izquierdo de la lengua.
- Traccion desde la mandíbula inferior derecha hasta en medio del cuello, por la noche.
- Plenitud en el epigástrico con respiracion débil y precipitada: alguna vez aspiracion fuerte y prolongada con espiracion fuerte tambien, pero súbita, despues de mediodia.

35. Dolor lancinante en la region del corazon.

Punzadas prolongadas bajo el esternon.

Dolor en el lado izquierdo del ombligo.

Sensacion al andar como si tuviera entre los músculos glúteos muchas espinas obtusas.

Picor en el ano, estando sentado.

40. Dolor en el codo izquierdo, que penetra hasta casi toda la estension del cubito, por la noche.

Dolor obtuso en la muñeca derecha, que se estiende hasta el medio del cubito; despues, igual sensacion en la muñeca izquierda, pero mas débil.

Dolor de quebrantamiento en los huesos del antebrazo derecho, con punzadas que parten de la muñeca hasta el cubito, á las seis de la tarde.

Dolor agudo, tractivo y profundo debajo de la última costilla izquierda, á las seis de la tarde.

Palpitaciones de corazon al subir ó bajar escaleras, con dolor agudo, como si oprimieran este órgano con la punta del dedo, á las nueve de la noche.

45. *Día tercero.*—Boca pastosa, á las seis de la mañana.

Palpitaciones en el epigastrio: no siente las del corazon, á las seis de la mañana.

El movimiento hace aparecer los latidos del corazon, pero débiles y lentos.

Ruido en las orejas, como por el movimiento agitado de las alas de un moscardon, á las ocho de la mañana.

Estornudos y afluencia de mocos por la nariz, á las ocho y media de la mañana.

50. Picor en la comisura izquierda de los labios, á las nueve de la mañana.

Dolor tractivo en los músculos anteriores del cuello hasta la oreja derecha, á las nueve y media de la mañana.

Cólicos; flatuosidades que recorren el abdómen, seguidas de emision de vientos sin olor, á las nueve y media de la mañana.

Dolor en los tegumentos del abdómen entre el ombligo y el

epigastrio, un poco inclinado al lado derecho, á las diez de la mañana.

Dolor obtuso encima de la muñeca y en el radio, á las diez y media de la mañana.

55. Dolor sordo, calambroide, en el codo derecho primero, despues se pasa al izquierdo.

Dolor de quebrantamiento en el costado derecho, á las once menos cuarto de la mañana.

Dolor punzante en el corazon, que pasa despues al lado derecho, como si tuviera dos corazones, á las once.

Dolor presivo, desde la parte superior derecha de la frente hasta el ojo, á mediodia.

Ligero dolor en la sien derecha como si hubieran aplicado á ella muchas puntas obtusas. Dolor sordo en la órbita del ojo derecho.

60. Coriza, á las doce y media.

Boca seca y pastosa.

Sensacion como si hubiera un garfio prendido en la piel al lado derecho del ombligo, á la una de la tarde.

Estreñimiento de vientre.

Punzadas que parten del codo hasta el medio del cubito, despues hasta la muñeca izquierda, desde las nueve hasta las tres.

65. Obturacion de la nariz, á las tres de la tarde.

Dolor penetrante sobre la carótida esterna derecha, á las tres y media.

Tracciones verticales sobre el epigastrio, á las tres y cuarto.

Dia cuarto.—Rigidez de la region lumbar y dolor de quebrantamiento en el vientre y los hipocondrios, á las seis de la mañana.

Cámara dura y fácil. (Antes de la esperimentacion eran ordinariamente duras y dolorosas).

70. Desaparece la inflamacion del ano.

Coriza, con dolor de fatiga en el vértice de la cabeza, en la frente y los ojos, á las nueve de la mañana.

Coriza con dolor quemante y lancinante en el lado izquierdo

de la frente, correspondiendo al velo palatino del mismo lado, á mediodía.

Sequedad de los labios, de la boca y de la lengua.

Viva picazon entre los dedos anular y auricular de la mano izquierda, con una mancha roja pruritosa sobre la articulacion de la segunda falange del anular.

75. Mancha roja con pelicula amarilla y gran prurito en la parte anterior de las muñecas, á los doce y media.

Calor en la oreja izquierda, con dolor quemante, estendiéndose hasta la nariz del mismo lado, á las dos y media de la tarde.

Dolor contusivo en la uña de un dedo de la mano derecha, á las tres y media.

Dia quinto.—Desaparicion del coriza.

80. *Dia sexto.*—Sueño de objetos que defiende con valor, contra unos ladrones que le tienden mil asechanzas; de frutos desconocidos, que desea comer, pero que desaparecen cuando vá á tocarlos.

Dolor sordo en la parte esterna de la ceja derecha; se disipa al aire libre.

Dolor agudo en el testículo izquierdo, al andar.

Gran apetito.

Dolor reumático en la rodilla derecha; desaparece con el movimiento.

85. Ligera punzada en el borde del prepucio.

Dolor sordo en la region temporal derecha, á las diez de la mañana.

Dia sétimo y hasta el trece.—Ligeros dolores en el testículo izquierdo, al marchar, ó por la presion del pantalon.

Supuracion entre el glande y el prepucio, en el lado derecho.

90. *Dia quince*—Disminucion de la hinchazon del escroto con aumento de la supuracion del glaude.

Dia diez y seis.—Picor en la frente, como por mosquitos.

Dia diez y ocho.—Desaparece la hinchazon del escroto y disminuye el dolor del testículo. La supuracion se estiende al exterior del prepucio, sin afectar al glande.

- Hinchazon, dolorosa al tacto, de la ingle derecha.
 Dolor punzante en el lado derecho de la frente.
95. Violentos estornudos.
 Sueña que hay una espantosa tormenta, que destruye y abrasa los edificios, y hace estremecer montañas gigantes, que se agrietan, lanzando columnas de fuego.
Día diez y nueve.—Flujo abundante de agua por la nariz.
 Gusto insípido ó ácido de los alimentos: el agua azucarada le parece vinagre.
Día veintiuno.—Dolor penetrante en el prepucio, como si le pellizcaran.
100. Picor en el prepucio.
 Supuración abundante por el prepucio de un líquido blanco amarillento, con olor á pus ordinario.
 Calor y dolor en el pubis, cuya inflamación aumenta por el calor de la cama.
 Imposibilidad de arremangar la piel del prepucio.
 Malestar general, náuseas, debilidad de todo el cuerpo.
115. La hinchazon del escroto ha desaparecido completamente.
 El testículo permanece un poco hinchado y dolorido.
 Curación muy pronta de la vegetación del ano, que en ocho días ha disminuido considerablemente.
 Sueños de combates, de muertos: recuerda al despertar que ha visto tres cabezas á medio quemar en una hoguera, que abrían los ojos, le miraban, y le hablaban muy irritadas.
Día veintidos.—Disminución del dolor y la inflamación del prepucio.
140. Disminución del dolor del testículo.
 Gran cansancio, que obliga á acostarse por la tarde.
 La supuración é inflamación del prepucio aumentan por la tarde, estendiéndose á todo él.
 Picor en el escroto.
Día veintitres.—Vivo dolor con punzadas en el ano, como si le clavaran una espina, tres ó cuatro veces.
115. Desfallecimiento; el mas ligero ejercicio le fatiga y le obliga á acostarse.

Cansancio en las rodillas.

Supuracion amarillo-verdosa en el prepucio.

Dia veinticuatro.—Continúa lo mismo la supuracion del prepucio.

Inflamacion de la membrana interna del prepucio.

120. *Dia veinticinco.*—Prurito en el ano, por la mañana.

La inflamacion del prepucio disminuye en el lado derecho, y se aumenta en el izquierdo.

Picor y punzadas en el borde del prepucio.

Emision de orina clara, cuatro ó cinco veces al dia.

Dia veintiseis.—La inflamacion ha desaparecido del interior del prepucio, pero se ha aumentado en el borde principalmente por la noche, hasta agrietarse por muchas partes.

125. El contacto de la orina le hace experimentar dolores desgarradores.

Estos dolores afectan todo el organismo, dejando un gran malestar.

El sistema nervioso, la cabeza y el cuello estan dolorosamente afectados.

La estremidad de la uretra presenta dos lábios inflamados por el interior. El tacto le produce picor, que se estiende hasta la mitad del miembro.

130. *Dia veintisiete.*—Frio interior, como si la sangre se hubiera helado en las venas, al aire libre; dura un cuarto de hora.

Erecciones dolorosas, á causa de la hinchazon del prepucio.

Supresion total del apetito venéreo, con flacidez del miembro.

Dia veintiocho.—Sueño profundo.

La inflamacion y supuracion del glande disminuyen mucho por la mañana.

135. *Dia veintinueve.*—No puede andar mucho sin cansarse.

Segunda experimentacion.

Sensacion de constriccion en la garganta, hasta por la noche.
Dolor reumático en el omoplato izquierdo.

Dia segundo.—Continuacion del dolor del omoplato, hasta la noche.

Dia tercero.—Sueño muy agitado; sueños aterradores.

140. Dolores sordos en la cabeza, todo el dia.

Dia cuarto.—Aparicion de un grano en el glande, sin mas incomodidad que un simple prurito.

Dia quinto.—Sueño muy agitado, con sueños escéncricos.

Supuracion del grano del glande sin dolor, pero con prurito; tiene el aspecto de una úlcera sifilítica.

Pesadez y dolor de cabeza todo el dia.

145. *Dia sexto.*—Muy grande agitacion por la noche; sueño interrumpido, con escesiva dificultad de volver á dormirse.

El grano del glande se ha secado espontáneamente; en su lugar queda una mancha roja, sin dolor.

Gran sequedad de la garganta.

Dia sétimo.—Agitacion muy grande por la noche, siempre con sueño intranquilo y nada reparador.

Dia octavo.—Dolor reumático en la pantorrilla derecha.

Gran agitacion nocturna.

150. *Dia noveno.*—Sueño mas tranquilo.

Persistencia del dolor de la pantorrilla, bastante intenso para impedir la progresion.

Dia décimo.—Incomodidad en la garganta con constriccion de la faringe y dificultad en la deglucion.

El dolor de la pantorrilla se ha trasladado al omoplato, desde las últimas costillas hasta el cuello.

Dolor en el cuello con dificultad de mover la cabeza hácia el lado derecho.

155. *Dia once.*—Continúa el dolor del omoplato y del cuello.

Persistencia de la constriccion de la faringe.

Dia doce.—Los mismos síntomas que el dia anterior, pero algo menos intensos.

- Insomnio por la noche y sueño por el día.
Dolor en la nuca.
160. Dolor debajo del esternon.
Laxitud y abatimiento.
Polaciones nocturnas, todas las noches.
Ardor en el ano.
Pinchazos alrededor del ano.
165. Fiebre.
Abatimiento hasta el punto de no poder hablar.
Tos seca.
Tos con espectoracion blanca y acuosa.
Ulceras en las piernas.
170. Dolores articulares.
Inflamacion de los ojos.
Dolor en la pierna derecha.
Mal gusto de boca, por la mañana.
Dolor de cabeza, todo el día.
175. Catarro.
Presion en el epigastrio.
Náuseas durante la comida.
Dolor en la espalda y el pecho.
Dolor agudo en el hipogastrio, á la presion.
180. Despierta sobresaltado dos veces en la noche.
Sueña y habla alto, por la noche.
Dolor en el brazo izquierdo, por la mañana.
Rubicundez en el brazo izquierdo.
Dolor en las costillas del lado derecho al respirar, durante media hora.

TRADESCANTIA DIURETICA.

TRAD. *Tradescantia commelina* (WELL.) *Commelinæ*.
Trapoeraba.

Planta hervácea, bastante comun en el Brasil. Sus tallos ramosos y cilíndricos se encuentran algun tanto horizontales; las hojas son alter-

nas, envainadoras, un poco lanceoladas, formando en su estremidad ramos densos, de donde nacen largos pedúnculos, que cada uno sostiene de cuatro á seis flores: perianto doble, trifido, el esterno con divisiones agudas y herváceas; el interno petatoideo y de color azul. Seis estambres fértiles, un ovario libre trilocular, con un estilo sencillo.

Se emplean las hojas.

4. *Dia primero.*—Dolor en el lado izquierdo del pecho.
Dificultad de la respiracion, como por resfriado.
Dia segundo.—Orinas amarillas, copiosas, que depositan un sedimento ceniciento muy abundante.
Olor agrio de las orinas.
5. Inflamacion del escroto con dolor y rubicundez.
Vértigos.
Respiracion dificil y anhelosa, como si le faltara aire.
(Estos sintomas se continúan desde el dia tercero hasta el quinto).
Gran dificultad en la respiracion.
La inflamacion del escroto ha disminuido desde el dia doce.
10. Flujo blanquecino por la uretra.
Dolor al orinar.
La orina se escreta en un chorro muy delgado.
Diarrea.
Los testículos entran por el anillo inguinal.

MURURE LEITE.

MUR. L.

Resina empleada en las Amazonas como antisifitica.

4. Flujo blenorragico.
Ulceras en las piernas.
Orina amarilla y fétida.
Sensacion de chasquido en la tibia.
5. Salivacion abundante.
Grano no doloroso, que termina por supuracion.

- Placa en la garganta del pié, dolorosa en el centro é insensible en la circunferencia.
- Entorpecimiento del brazo izquierdo.
- Entorpecimiento en todos los miembros.
10. Dolor ciático.
- Hinchazon de la cara como en la elefantiasis de los griegos.
- Dolor en una antigua cicatriz en el borde izquierdo de la lengua.
- Frio en las manos.
- Pesadez de cabeza.
15. Dolores de cabeza, que se reproducen los dias tercero y cuarto.
- Dolor en la oreja izquierda, el primer dia.
- Cámaras muy fáciles.
- Ardor en los ojos.
- Ojos inflamados.
20. Soñolencia dia y noche.
- Agitacion continua, durante el sueño.
- Exaltacion de las ideas.
- Repugnancia á los alimentos, inapetencia.
- Dolor sobre el hombro izquierdo, que dificulta la respiracion al andar.
25. Erupcion pustulosa en el miembro.
- Erupcion en las piernas.
- Dolores de dientes, durante cuatro dias.
- Erupcion granulosa en el occipucio, el dia catorce.
- Vómitos, el dia diez y seis.
30. Necesidad apremiante de defecar, con evacuacion de materiales blandos.
- Poco apetito.
- Fuerte dolor en los muslos.
- Picotazos en la lengua.
- Aturdimiento de cabeza.

CANNABIS INDICA.

CAN. IND. *Urticeas. Haschich. Pango.*

Planta embriagadora, herbácea, cuyo tallo derecho es asurcado en toda su longitud. Hojas alternas, palmeadas, compuestas de cinco hojuelas casi lineales, aserradas, colocadas sobre un pecíolo lampiño. Flores dioicas, con perianto monofilo, verdoso, en glomerulos de dos á diez colocados en la base de las hojas y formando una espiga terminal. Flores machos, con cinco divisiones patentes, cinco estambres con anteras casi vexiculares; flores hembras, con el perianto entero ún poco hendido en un solo lado. Fruto monospermo, ovoideo. El cultivo del *haschich* está severamente prohibido á la raza negra, que lo ha importado y que lo distingue con el nombre de *pango*. Cuesta alguna dificultad la adquisicion de este vegetal.

Se trituran las hojas.

El uso del *haschich*, tan comun en Africa y entre los negros importados al Brasil, debe escitar á nuestros celosos cofrades á observar los numerosos síntomas que esta sustancia narcótica desarrolla en las personas que la usan; y no creemos escedernos de la verdad asegurando que el *Cannabis indica*, tendrá con el tiempo una importancia tan grande en Homeopatía, como la que gozan el ópio y la belladona, el dia en que sea experimentada aquella sustancia con todo el cuidado que lo han sido ya estas últimas. Nosotros comenzaremos, contribuyendo los primeros con el débil tributo de nuestras observaciones para esta importante patogenesia, siendo nuestra principal intencion, al publicar estos síntomas en medio de la vida agitada á que estamos destinados por la propagacion de la doctrina homeopática, llamar la atencion de los homeópatas sobre la patogenesia de una sustancia, tan interesante, como olvidada hasta hoy.

1. *Dia primero.*—Dolor de cansancio en la flexura del brazo derecho, á las siete de la mañana.

Ligero dolor en el epigastrio.

- Prurito muy pronunciado en el epigastro, despues del dolor.
Estas incomodidades cesan despues de comer.
5. Falta de apetito.
Dolor en el occipucio y las sienes.
Aturdimiento al bajar la cabeza ó al andar.
Lagrimo.
Escalofrios.
10. Palidez de la cara.
Vértigos con inclinacion de la cabeza hácia atrás.
Ojos uraños.
Dia segundo.—Aturdimiento como por embriaguez.
Frio y escalofrios, con calor exterior.
15. Vista abatida, pesadez de cabeza.
Inapetencia.
Dolores en las articulaciones.
Amargo de boca.
Lengua cubierta de una capa blanca.
20. Orinas espesas y rojas.
Mucho sueño aun por el dia.
Contraccion de los párpados.
Gran dolor de cabeza, sobre todo en el vértice, con latidos.
Sueños vivos y animados, algunas veces estáticos.
25. Hambre violenta muchos dias seguidos.

PETIVERIA TETRANDRA.

PET. *Mappa graveolens* (VELL.) *Phitaolceæ*. *Pipi*, *herva de Pipi*. *Raiz de Guinea*.

Arbusto comun en los campos de Rio Janeiro, en donde florece todo el año. Sus ramos derechos, un poco sarmentosos, ligeramente pubescentes en su estremidad, llevan hojas alternas enteras, lisas, un poco onduladas. Las flores son pequeñas, colocadas en largas espigas axilares ó terminales; perianto persistente, herváceo, con cuatro divisiones lineales. Cuatro estambres alternos con las divisiones del perianto, algun tanto salientes. Un solo ovario con un estilo dividido en diez estigmas

patentes. Fruto caja comprimida, y contiene una sola semilla. Sus raíces son bastante fibrosas y exhala un fuerte olor aliaceo.

Se tritura la raíz fresca.

Experimentador: DR. MANUEL DUARTE MOREIRA.

4. Alegría con deseo de cantar.

Sueño regular y profundo mas prolongado que de ordinario, durante los tres primeros días.

Sueño todo el día, con bostezos frecuentes, pero sin gana de acostarse.

Sueños insignificantes ó desagradables, cuyo recuerdo se pierde al despertar.

5. Sueño prolongado por la mañana, el primer día.

Dolor de cabeza al despertar.

Sueño y bostezos despues de almorzar, el día primero.

Soñolencia despues de comer.

Escalofrios por todo el cuerpo, sudor; erizamiento de los cabellos á las nueve de la mañana del segundo día.

10. Pesadez de cabeza al despertar, á las ocho, despues de haber tomado el medicamento.

Pesadez en el vértice de la cabeza que parece comprimir al cerebro, con pesadez tambien en los párpados y dificultad de abrirlos, sin sueño.

Dolor profundo y sordo en la parte superior del cerebro, agravado por el tacto, por la palabra ó por la posicion de sentado; se alivia con la progresion ó cualquiera otro movimiento, el día primero.

Igual síntoma el segundo día, pero algo menos violento.

15. Sensacion de plenitud en la cabeza, el segundo día.

Sensacion como si le arrojaran agua caliente sobre el cuero cabelludo, penetrando hasta el cerebro, el segundo día.

Desaparecen los síntomas de la cabeza, al tercer día.

Vista mas débil y turbada que de ordinario.

Ardor doloroso en el borde de los párpados, que se agrava al cerrar los ojos.

20. Vista turbada, despues de comer, el segundo dia.
 Fetidez del aliento.
 Sensacion en la garganta, como si hubiera comido sustancias astringentes.
 Sensacion en la boca y la garganta como si hubiera comido alguna fruta acre y resinosa, el segundo dia por la mañana.
 Dolor sordo en los intestinos y el epigastrio, el segundo dia.
25. Constipacion durante tres dias.
 Orinas abundantes por la mañana.
 Orinas claras, acuosas, sin olor ni sedimento, el tercer dia.
 Punzadas violentas en el lado derecho del pecho, que se repiten á cada inspiracion.
 Ligero dolor en el esternon.
30. Ronquera con tos.
 Laxitud, y entorpecimiento del brazo izquierdo con dolor en la articulacion húmero-cubital, el primer dia.
 Entorpecimiento de la estremidad de los dedos, sobre todo del anular.
 Sensacion de mordedura de hormiga en el centro del músculo gluteo derecho, con picor y calor, despues de haberse rascado.
 Calambre en las partorrillas durante la noche, el segundo dia.

Segundo experimentador : S. NORMA.

Veintiun años temperamento sanguíneo, buena constitucion, fisonomia pálida, carácter melancólico, cabello castaño.

35. Inclination á la risa y á la broma, el dia primero.
 Tristeza y deseo de llorar; poco tiempo despues, llanto involuntario, el dia sexto por la mañana.
 Sueño regular, prolongado, profundo, los tres primeros dias.
 Sueño todo el dia, con bostezos frecuentes, sin deseo de acostarse.

- Sueño de pendencias, cuyo recuerdo se pierde al despertar.
40. Sueño por la mañana, mas prolongado que de ordinario, el primer dia.
- Dolor de cabeza al despertar.
- Soñolencia, despues de almorzar, con hostezos, el primer dia.
- Soñolencia, despues de comer, el segundo dia.
- Sueños tristes, de personas enfermas de su familia, el quinto dia.
45. Sudor frio, abundante, con frio general y escalofrios, despues del primer sueño, el sexto dia.
- Escalofrios generales, al acostarse.
- Calor febril, palidez de la cara, manos frias, por la tarde del sexto dia.
- Dos pequeñas manchas amarillas oscuras en el cuello.
- Dolor de cabeza, pulso débil y pequeño, calor en la cara, sobre todo en la mejilla derecha, sentido profundamente, mientras que al exterior la piel parece fresca, el primer dia.
50. Pesadez dolorosa en la frente, que se agrava al abrir los ojos, con calor exterior en la cabeza, el primer dia á las dos de la tarde.
- Dolor sordo y latidos en la sien izquierda, el tercer dia.
- Dolor presivo en las sienes.
- Dolor en la frente con sensacion de compresion en el cerebro, agravado por la progresion.
55. Ojos á medio cerrar, hinchados esterioresmente, rodeados de un circulo azulado, sobre todo al lado de la nariz, durante tres dias.
- Pesadez sobre los párpados, que obliga á cerrar los ojos: en este estado ve figuras variadas, el sexto dia.
- Hinchazon de las venas de la nariz, con coloracion azul.
- Rubicundez y calor en la oreja izquierda, durante algunos minutos, el dia tercero.
- Dolor de estómago, con sensacion de frio interior.
60. Dolor agudo y fijo en el estómago, al levantarse.

Sofocacion, con frio en los piés, lo que la obliga á permanecer acostada, la tarde del dia sexto.

Dolores en los músculos de la parte superior é interna del codo, semejantes á mordeduras de hormigas.

Dolor contusivo en los brazos y las piernas.

Rigidez y cansancio de los miembros, la mañana del dia sexto.

65. Entorpecimiento de las piernas, con repugnancia al movimiento.

Dolores contusivos en los brazos y las piernas, el dia sexto.

Frio en los piés, por la mañana en la cama.

Tercer experimentador: S. SILVIA.

Veinte años, temperamento sanguineo, buena constitucion, carácter alegre.

Disposicion á cantar.

Sueño regular y profundo mas prolongado que de ordinario, los tres primeros dias.

70. Sueño todo el dia con bostezos frecuentes, sin deseo de acostarse.

Sueños desagradables, cuyo recuerdo se pierde al despertar. Despierta á las cuatro de la mañana: se duerme un cuarto de hora despues.

Sueño ligero é interrumpido despues de almorzar, el dia primero á las nueve de la mañana.

Sueño profundo, el segundo dia.

75. Abatimiento general, con deseo de acostarse, pero sin sueño, el tercer dia á las nueve de la mañana.

Sueños tristes, cuyo objeto se olvida al despertar.

Insomnio en la cama.

Sudor abundante y frio, despues del primer sueño.

Sensacion de alfilerazos sobre el hombro derecho, seguida de rubicundez inflamatoria durante un cuarto de hora.

80. Punzadas por todo el cuerpo como por puntas de alfiler;

- despues, picor en los antebrazos, con manchitas violáceas en los piés, los brazos y la espalda, el segundo dia.
- Dolor en la parte esterna del brazo izquierdo, con una mancha roja, estensa é inflamada, como erisipela.
- Calor en la piel, como si estuviera espuesta á los rayos del sol, con frio en los piés.
- Dolor contusivo en el vértice de la cabeza como si hubiera recibido un golpe, que se aumenta andando, ó moviendo la cabeza, á las once de la mañana del segundo dia.
- Dolor estupefaciente y profundo, que parece comprimir las dos sienes, con dolor sordo en el vértice de la cabeza, el segundo dia.
85. Sensacion en la cabeza como de una esplosion quemante, cuyo ruido se escapara por las orejas, el tercer dia en el momento de acostarse.
- Dolor profundo, tan pronto en la frente como en la nuca.
- Repugnancia al movimiento; deseo de estar tranquila.
- Entorpecimiento paralítico de los brazos y las piernas, por la mañana del quinto dia.
- Gran pesadez en la frente al bajar la cabeza, el sexto dia, á las doce.
90. Pesadez en los ojos y abatimiento como por sueño, sin tener en realidad necesidad de dormir.
- Gran sensibilidad de los ojos á la luz.
- Inyeccion de la conjuntiva, sobre todo hácia el ángulo interno del ojo izquierdo.
- Inflamacion rápida del ojo izquierdo durante la comida hasta el punto de tener que abandonar la mesa: la oftalmía se desarrolla en los tres dias siguientes.
- La luz de la vela le parece amarilla, y del mismo color su aureola.
95. Rubicundez del ala de la nariz y el carrillo izquierdo, el tercer dia.
- Estornudos frecuentes despues de medio dia, el dia quinto.
- Rubicundez de la mejilla izquierda.

- Punzadas agudas en el epigastrio de dentro á afuera, por la noche del quinto dia.
- Punzadas en el estómago despues de comer, el sétimo dia.
100. Dolor en la garganta, con dificultad de tragar la saliva.
Romadizo, del tercero al quinto dia.
Relajacion en el raquis al acostarse, como si hubiera levantado un gran peso, el primero y segundo dia por la noche.
Se agrava esta incomodidad enderezándose ó echándose hácia atrás, y desaparece inclinando el cuerpo hácia adelante.
- Entorpecimiento en el trayecto del nervio cubital hasta la muñeca, con sensibilidad al tacto, el segundo dia por la noche.
- Punzadas por todo el cuerpo, como picaduras de pulga, seguidas de prurito en la parte posterior, por la mañana del segundo dia.
105. Rubicundez é inflamacion intensa en la parte esterna del antebrazo izquierdo, el segundo dia, á las once de la mañana.
Dolor ardiente en el hueso radial izquierdo, con sensacion de contusion al tacto, el tercer dia.
Fuerte picazon en la eminencia hipotenar de la mano izquierda, seguida de hinchazon inflamatoria, por la noche del tercer dia.
Cansancio de los brazos y de las piernas, como despues de una larga marcha, por la mañana del dia cuarto.
Entorpecimiento doloroso de la parte esterna de los brazos y las piernas.
110. Sensacion de frio en el interior de los huesos, el dia cuarto al mediodia.
Adormecimiento doloroso de los brazos y las piernas con dolor profundo, tan pronto en la frente como en la nuca, con repugnancia al movimiento, la mañana del dia quinto.
Frio escesivo en las manos y los piés penetrando hasta los huesos, el dia sétimo.

Entorpecimiento súbito de las rodillas, con dolor sordo en la tibia, el día primero á mediodía.

Dolor agudo y lancinante en la parte del metatarso que corresponde al dedo pequeño del pié izquierdo.

115. Dolor, como pinchazo de aguja, en el dedo pequeño del pié izquierdo, el octavo día por la madrugada; pocos instantes despues parece como que se tuerce hácia afuera el mismo dedo.

Cuarto experimentador: S. CELIA.

Diez y siete años, temperamento sanguíneo, buena constitucion, fisonomía pálida, carácter alegre, cabello castaño.

Ideas fugitivas y confusas.

Falta de memoria.

Recuerdos pasajeros, que se le escapan de repente.

Tristeza hasta llorar, con dolor de cabeza, el día segundo.

120. Sueño profundo, mas temprano que de ordinario, despertándose tambien mas tarde que otros días, durante tres seguidos.

Sueño todo el día con frecuentes hostezos, sin gana de acostarse.

Sueños desagradables, cuya memoria se pierde al despertar.

Sueño tranquilo á pesar de los sueños desagradables, el segundo día.

Abatimiento como por soñolencia, sin deseo de acostarse.

125. Sueños de muertos, que se recuerdan al despertar, con sudor frio por todo el cuerpo.

Sensacion como si le oprimieran la sien derecha con el dedo, con gran sensibilidad al tacto, el día segundo á mediodía.

Dolor lancinante en la sien derecha, que pasa repentinamente á la izquierda y luego al vértice de la cabeza con sensacion de quemadura, el día segundo.

Dolor y calor en la frente con presion en los ojos, el segundo día á las tres de la tarde.

- Dolor sordo en la raiz de la nariz , por la noche.
430. Entorpecimiento y sensacion de compresion en la cabeza como si estuviera comprimida con una benda caliente.
- Abatimiento general , como por soñolencia.
- La voz le parece venir de lejos.
- Insensibilidad en la cama , como si estuviera aletargada.
- Inseguridad al andar; cree que no llega con los piés al suelo y teme caer.
435. Dolor en los ojos , como si estuvieran comprimidos en las órbitas por cuerpos estraños.
- Sensacion como si le echaran en la cabeza agua caliente.
- Tristeza y llantos; en su aliccion permanece sentada , inmóvil , sin hablar. (Todos estos síntomas de la cabeza se han presentado en menos de una hora, el dia segundo despues de mediodia).
- Dolor de cabeza con pesadez en los ojos, el segundo dia.
- Sensacion de picaduras de pulgas sobre el párpado inferior izquierdo.
440. Nariz inflamada y reluciente.
- Dolor sordo en la raiz de la nariz , la tarde del primer dia.
- Dolor en el ala izquierda de la nariz que se propaga al lado opuesto , el dia segundo á mediodia.
- Sensacion de calor en la cara , pero la piel está fria.
- Sensacion como si le pasaran con una aguja el lábio superior de dentro á afuera , el dia once al levantarse por la mañana.
445. Dolor de muelas.
- Sequedad de la boca.
- Lengua escoriada, como si hubiera bebido agua muy caliente , el segundo dia al levantarse.
- Al acostarse, afluencia de saliva acuosa y fria , que deposita una especie de sedimento como ceniza y granulaciones blancas que tienen el gusto y el olor de bilis , pero no amargan.
- Dolor agudo y lancinante que atraviesa el bazo , el dia segundo.

150. Ligero dolor en el colon descendente.
Desde las once de la mañana hasta la noche orina cada cinco minutos, con gran calor en la uretra, el segundo dia.
Orina cuatro ó cinco veces por hora, sin dolor, el tercer dia.
Orina incolora, los dias siguientes.
Opresion en el lado izquierdo del pecho y palpitaciones, por la noche del cuarto dia.
155. Dolor profundo y sordo en el pecho, debajo el esternon.
Dolor sordo en la region cervical posterior al mover el cuello, el dia segundo á mediodia.
Dolor agudo en la articulacion de la muñeca derecha.
El mismo dolor en la muñeca izquierda, pero menos intenso.
Dolor en la articulacion húmero-cubital, estendiéndose hasta la muñeca.
160. Entorpecimiento en la parte posterior é interna del antebrazo.
Dolor agudo y sensacion de compresion dolorosa en el antebrazo, la noche del dia primero.
Dolor en la mano derecha, convergiendo de la circunferencia al centro.
Dolor repentino en el dedo pequeño de la mano izquierda que se estiende á todo el antebrazo, fijándose en la articulacion húmero-cubital, y creciendo gradualmente, con sensacion de constriccion, por la mañana del segundo dia.
Punzadas y prurito en la parte interna y superior del antebrazo, el segundo dia por la mañana.
165. Dolores en los últimos dedos de la mano derecha, como si les hubiesen dado un martillazo, el dia segundo á mediodia.
Sudor en la palma de las manos, el segundo dia por la tarde.
Sensacion de torcedura en la articulacion escápulo-humeral, el tercer dia.
Sensacion de parálisis en el antebrazo y en las articulaciones de las falanges, el dia tercero por la noche.

- Ardor como por quemadura en la piel de los brazos, que pasa despues á la de la mano.
170. Ligero dolor calambroide en los tendones de las palmas de las manos y en la parte anterior de la muñeca.
Igual dolor en los tendones de los dedos anulares, el sexto dia.
Nuevo dolor calambroide en las manos, el dia noveno.
Calambre en el dedo auricular derecho, el dia segundo.
Ligeros calambres en las manos, el dia doce.
175. Adormecimiento desde las rodillas hasta las plantas de los piés, en donde se fija, el dia primero á mediodia.
Debilidad y entorpecimiento en las piernas, sobre todo al levantarse, el dia segundo por la tarde.
Debilidad en las piernas y las rodillas, al bajarse.
Debilidad en las piernas, hasta el punto de doblarse las rodillas, el dia segundo por la tarde.
Dolor en la parte anterior de la tibia, como si hubiera recibido un golpe.
180. Dolor contusivo en la pantorrilla, agravada por el tacto.
Gran entorpecimiento en todas las sensaciones estando acostada, como si el cuerpo estuviera adormecido.

Quinto experimentador: S. NINA.

Catorce años, temperamento sanguíneo, carácter alegre, fisonomía colorada, cabellos castaños.

- La cosa mas insignificante le escita una alegría escesiva: tiene deseo de cantar.
- Sueño regular, pero mas prolongado que de ordinario, durante tres dias.
- Sueño por el dia con frecuentes bostezos, sin deseo de acostarse.
185. Sueños, cuyo recuerdo se pierde al despertar.
Lagrimeo, con sensacion de arena en los ojos.
Orinas muy abundantes y claras.
Adormecimiento del brazo derecho.

Sesto experimentador: CIPRIANO HUET.

Cincuenta y un años, temperamento sanguíneo, constitucion robusta, carácter grave, conjuntivas inyectadas, vista débil, rubicundez en el borde de los párpados.

Alegría escesiva.

190. Pasa el dia riendo y cantando.

Sueño profundo, que empieza mas temprano y concluye mas tarde que de ordinario, durante cuatro dias.

Sueños de disputas y pendencias, el dia segundo.

Manchas violáceas estendidas horizontalmente en el hipocondrio derecho.

Dolor sordo en un punto estrecho del cuero cabelludo y presion en el lado derecho del occipucio.

195. Dolor terebrante en la parte superior de la frente, el segundo dia.

Dolor contusivo en los arcos cigomáticos.

Violentas punzadas en la parte superior de la frente y en el interior de la parte izquierda de la cabeza, durante un minuto, el dia segundo á mediodia.

Dolor en la parte superior del parietal derecho, como si el cráneo estuviera abierto.

Dolores terebrantes en la parte superior del costado derecho, el dia primero.

200. Dolor sordo como si hubiera recibido un pufetazo en el ojo derecho, aliviado por la presion, el dia segundo á mediodia.

Ligero dolor en el interior de la nariz.

Vivo prurito repentino en la parte exterior de la nariz.

Accesos de sordera en la oreja derecha, como si estuviera tapada.

Dolores contusivos en la parte exterior de las órbitas.

205. Sensacion de una pústula del grueso de un guisante sobre la mejilla, con tension de la piel, durante algunos segundos.

Gran prurito en el mismo sitio.

- Sensacion en la garganta, como si hubiera tragado una sustancia astringente.
- Borborigmos en la cama, estando acostado, por la mañana del segundo dia.
- Punzadas en los hipocondrios.
210. Diarrea mucosa de color oscuro, mezclada de materias fecales en fragmentos duros y divididos, el tercer dia.
- Orinas claras y abundantes, el segundo y tercer dia.
- Calor seco en las palmas de las manos durante muchos dias.
- Sensacion de contusion en los músculos del antebrazo derecho, en la parte interna entre el radio y el cúbito, la mañana del primer dia.
- Dolor calambroide en los músculos de la mano derecha, principalmente en el pulgar, el primer dia por la mañana.
215. Dolor sordo como si le oprimieran el nervio braquial á su paso sobre el condilo interno del húmero, agravado por el tacto, el dia primero á mediodia.
- Punzada y calor en la estremidad del pulgar derecho, como si tuviera un panadizo, estendiéndose hasta la articulacion de la primera falange.
220. Entorpecimiento y pesadez en las estremidades, la tarde del primer dia.
- Dolor contusivo en el antebrazo.
- Prurito en los dos últimos dedos.
- Adormecimiento por tres veces repetido en los miembros superiores é inferiores, despues de haberse levantado el segundo dia.
- Prurito en la palma de la mano izquierda.
225. Dolor en la parte media exterior del antebrazo derecho, como si se hubiera clavado espinas.
- Igual sensacion en el brazo izquierdo, pero menos pronunciada.
- Al salir de la cama, entorpecimiento y prurito en el pié derecho, el primer dia.
- Dolor sordo en la articulacion de la rodilla y en la pantorrilla, especialmente el primer dia.

Entorpecimiento y prurito ligero en la pierna derecha hasta el pié, el día segundo á mediodía.

230. Dolores agudos y circunscritos en las ingles, presentándose á intervalos repetidos.

Calor en la region renal, el segundo dia.

Calor seco en todo el cuerpo, sobre todo en las palmas de las manos.

Accesos de debilidad general, todos los dias despues de levantarse.

CONVOLVULUS DUARTINUS. (*Nobis.*)

CONVOL. DUART. *Calonyction speciosum* (D. C.) *Ipomea bona nox* (LINN.) *Convolvulus pulcherrimus* (WELL.) *Convolvulaceas*
Herva trombeta.

Planta voluble cultivada en los jardines de Rio Janeiro. Hojas grandes, enteras, acorazonadas, alternas, colocadas sobre largos peciolas que nacen ordinariamente en la axila de los ramos floríferos. Cáliz de cinco hojuelas desiguales; las tres exteriores agudas, las dos interiores ovales y foliáceas. Corola blanca, muy grande, cuyo tubo de diez á doce centímetros de longitud, termina en un limbo circular. Los estambres, en número de cinco, están adheridos por sus filamentos al tubo de la corola, de la cual sobresalen bastante. Anteras lineales, muy agudas. El ovario se halla rodeado en su base por un disco glanduloso. El estilo es muy largo, filiforme, terminado por un estigma, veloso, bilobalado; fruto con el epicarpio coriáceo. Las flores son en número de dos á tres y están sostenidas por pedúnculos floríferos; se asemejan por su figura á una trompeta, con cuyo nombre se la conoce en el Brasil. Florece en junio y julio.

Se prepara la flor.

Esperimentador: DR. MANUEL DUARTE MOREIRA.

1. Ardor y calor á la piel, con picor como por pulgas.

Sudor abundante en la cama, muchas noches seguidas.

Mancha roja en la mejilla derecha al levantarse, que desaparece durante el dia.

Escalofrios repetidos, durante el dia.

5. Mancha roja en el lado derecho del cuello.

Soñolencia por la noche, en tres experimentadores.

Abatimiento, en dos experimentadores.

Soñolencia por el dia, en dos experimentadores.

Sueños de pependencias.

10. Distracciones durante el dia.

Sueños de muertos, y de que se le caen los dientes incisivos.

Sueña que le han robado en una calle iluminada: aparicion de un espectro: despierta sobresaltado.

Languidez.

Desfallecimiento moral, en dos experimentadores.

15. Hipocondría.

Languidez de espiritu.

Desaliento.

Dolor en la region temporal izquierda, correspondiendo al ojo.

Dolor en la mejilla derecha.

20. Dolor en la region frontal.

Aturdimiento en tres experimentadores.

Dolor general en la cabeza, principalmente en la línea media.

Dolor en la region frontal con ardor en la raiz de la nariz, en tres experimentadores.

Dos pequeñas manchas en la frente, que desaparecen á los pocos minutos.

25. Dolor en toda la cabeza, desde por la mañana hasta las cinco de la tarde.

Dolor agudo por la mañana en la region temporal izquierda, dos dias seguidos, en dos experimentadores.

Dolor de cabeza, tan pronto en el vértice como en el occipucio.

Dolor en las sienas.

Violento dolor en el vértice de la cabeza, por la noche.

30. Presion en la region frontal.

Dolor en el lado izquierdo de la cabeza.

Pesadez y aturdimiento en la region frontal, dos dias seguidos.

- Color quemante en la region frontal, que desaparece con un baño frio.
- Dolor violento en el vértice de la cabeza, por la mañana.
35. Vértigos con desfallecimiento.
- Ligero dolor de cabeza, en el vértice.
- Inflamacion del ojo izquierdo.
- Rubicundez exagerada de la cara.
- Ardor ligero en la parte superior del exófago.
40. Mal de garganta, durante mas de ocho dias.
- Sensacion en la lengua como si estuviera hinchada.
- Dolor de muelas.
- Hinchazon de las encías.
- Mal gusto en la boca.
45. Espuicion de mucosidades.
- Ardor y sequedad en la parte anterior y superior del exófago, en tres esperimentadores.
- Ligero dolor á los lados del cartilago tiroides.
- Apetito por la mañana al levantarse, en dos esperimentadores.
- Dolor de estómago, durante tres dias.
50. Disminucion del apetito.
- Dolor de vientre con calor interno.
- Cólicos violentos, en dos esperimentadores.
- Constipacion, los primeros dias de la esperimentacion, en ocho esperimentadores.
- Orinas rojas.
55. Sedimento amarillo en la orina.
- Entorpecimiento en la region escapular izquierda.
- Dolor en el hombro izquierdo.
- Entorpecimiento del brazo, cuando se le deja perpendicular.
- Entorpecimiento de ambos brazos.
60. Dolor profundo en el antebrazo izquierdo.
- Entorpecimiento en los dedos indice y medio de la mano derecha.
- Dolor en la articulacion de la muñeca izquierda.

Dolor profundo en la parte inferior derecha del pecho.

Dolor en la rodilla derecha.

65. Profundo dolor en las pantorrillas.

Dolor en la parte anterior de la pierna izquierda, durante cuatro días.

Dolor paralítico en las piernas y muslos, durante muchos días.

Dolor profundo en el muslo izquierdo y luego en el derecho.

Entorpecimiento de la pierna y el talón izquierdo.

Punzadas en la rodilla derecha.

BUFO SAHYTIENSIS. (*Nobis.*)

BUFO. *Bufo-agua.* (LAT.)

Este reptil se encuentra en toda la América meridional, en los sitios húmedos y pantanosos. Su volumen muy variable, es casi como el de los puños. Se le reconoce fácilmente por sus enormes parótidas romboidales, de las cuales segrega una gran cantidad de veneno. La cabeza es achatada, triangular, mas ancha que larga; presenta una gran arista ósea, que partiendo de la estremidad de la boca se dirige hácia el ángulo anterior del ojo, le circunda y termina detrás del párpado. El ojo es grande, así como también la pared timpánica. El tronco muy ancho por delante, por el gran desarrollo de las parótidas, se halla cubierto por cada lado de la espina dorsal de dos series irregulares de glándulas elípticas ó cónicas. Algunas veces existen también en los costados. Los miembros anteriores no llegan á la estremidad del tronco; los posteriores esceden á la longitud del cuerpo en la cuarta parte del pulgar. Los dedos son un poco deprimidos, el primero un poco mas largo que el segundo. La coloración de su piel varía mucho, presentando cierto número de manchas pardas confundidas sobre el dorso y separadas bajo el abdómen por manchitas amarillas.

El horroroso ruido que producen estos animales fué uno de los mayores tormentos que nos estaban reservados en el territorio de la colonia phalanstorianiana de Sahy. A nada puede compararse mejor que al estrépito que produce una larga fila de mazos de nuestros batanes.

Se escita al animal para que lance su saliva, que se recoge sobre azúcar de leche, la cual se somete al momento á la trituración.

Esperimentador : BRUNO VIDAL.

4. *Dia primero.*—Aturdimiento estremo, á las dos horas.
Ineptitud y repugnancia al trabajo, durante toda la tarde.
Dia segundo.—Dolor en el sacro, agravado al levantarse, al sentarse ó al bajarse.
Presion en las órbitas casi continúa, con sensacion de prurito interno y necesidad de frotarse los ojos.
5. Prurito en el pubis.
Prurito en la cara.
Violento picor en los lábios.
Dia tercero.—Dolor en la parte interna de la rodilla derecha.
Cámaras fáciles.
10. Prurito casi general.
Poca disposicion para el estudio.
Menor actividad que la ordinaria.
Presion y picor en las órbitas.
Continuacion del dolor del sacro.
15. *Dia cuarto.*—Alivio del dolor del sacro y desaparicion del de la rodilla.
Presion y prurito en las órbitas.
Prurito casi general.
Erecciones continuas sin deseos venéreos; poca disposicion para ocuparse de trabajos intelectuales, y poca actividad para todo.
Dia quinto hasta el décimo.—La misma falta de actividad y disposicion para todo, que los dias anteriores.
20. Erecciones continuas, pero sin deseos venéreos.
Prurito y presion en las órbitas.
Dia once.—Insomnio.
Dia doce.—Picazon en el dedo grueso del pié derecho.
Dia trece.—Dolor calambroide en la parte esterna de la pierna derecha.
25. Aparicion de un grano rojo que concluye por supuracion, dejando en su lugar una mancha negra.
Picor en el epigastrio.

Punzadas en la parte interna del codo izquierdo.

Dia catorce y quince.—Presion sobre los cartílagos de las costillas falsas.

Repugnancia al estudio.

30. *Dia diez y siete y diez y ocho.*—Rubicundez y escozor en los ojos.

Un fungus antiguo se hace sanguinolento.

Las órbitas parecen mayores y que han ensanchado las paredes orbitarias.

Repugnancia al trabajo.

Se olvida de las cosas de que se acaba de ocupar.

35. *Dia diez y nueve.*—Los ojos están siempre escocientes y dolorosos al tacto.

Dia veinte al treinta y cinco.—Disgusto, fastidio.

Pereza y desaliento.

Poca disposicion y aun repugnancia al trabajo.

Debilidad de la memoria.

40. La parte superior de las órbitas parecen tocar á las paredes orbitarias, particularmente por la noche.

Necesidad de frotarse la cara, por la mañana.

Hormigueo en la mandíbula inferior.

Prurito sobre las vértebras lumbares.

Prurito alrededor del ano.

45. Persistencia de la mancha negra que dejó el grano en el maleolo esterno del pié derecho.

Dia treinta y seis.—Aparicion de un grano rojo y grueso en el occipucio.

Dia treinta y ocho.—Alegria excesiva, por la noche.

Disposicion á hablar de cosas alegres.

Dia treinta y nueve.—Alegria, vivacidad de espiritu.

50. Persistencia del grano de la nuca.

Picor sobre las vértebras lumbares.

Dolor en la parte anterior del lóbulo de la oreja izquierda.

Ganglio en la planta del pié derecho.

Escoriacion sobre el músculo masetero izquierdo, que su-
pura un poco humor sanguinolento.

55. Gran pesadez de cabeza , despues de pasear.
 Escozor doloroso en los ojos , al tacto.
 Duerme una hora en medio del dia , sin haber tenido nunca esa costumbre.
 Tristeza , alejamiento de las gentes.
 Irresolucion para todo : forma proyectos que no realiza.
60. Hormigueo en la region lumbar.
 Sueños continuos por la noche ; pero al despertar no recuerda el objeto sobre que han versado.
 Presion en el lado izquierdo de la frente.
 Humor sombrío y taciturno.
 Sensacion dolorosa sobre las costillas falsas.
65. Prurito en el sacro.
 Sensacion de debilidad , en toda la mitad izquierda de la cabeza.
 Picor en la estremidad de los dedos de la mano derecha y del pié izquierdo.
 Aparicion de granos en la frente.
 Debilidad intelectual y de la memoria , durante el dia.
70. Punzadas agudas en la sien izquierda.
 Dolor agudo en la muñeca derecha.
 Cefalalgia prolongada.
 Dolor en los músculos estensores del brazo derecho.
 Aparicion de un grano en la muñeca derecha.
75. Violentos picores.
 Soñolencia.
 Sueños poéticos y filosóficos.
 Exaltacion de la imaginacion.

ARISTOLOCHIA MILHOMENS.

ARIST. *Aristolochia grandiflora* (GOM.) *Aristolochia symbifera*
 (MART.) *Aristolochias*.

Planta voluble, de tallo lampiño , con hojas alternas , uniformemente acorazonadas , pedatinervadas , presentando entre los nervios venillas reticuladas , colocadas en un largo peciolo , provisto de una estipula

grande, entera, arriñonada, amplexicaule. Las flores son solitarias sobre un pedúnculo asurcado, largo de ocho á diez centímetros. Perianto único, muy grande, amarillo pardusco, tuberculoso, encurvado y dividido en dos labios: el superior, agudo y lanceolado, se retuerce un poco hácia afuera; el inferior, de doble longitud que el primero y dilatado en su base, se estiende en una lámina oval con bordes ondulados. Toda la flor está cubierta de fuertes nervios. Seis estambres epiginios y ovario lampiño, con un estigma de seis lóbulos muy cortos y redondos.

Se emplea la flor.

4. *Dia primero*.—Sueño agitado.

Sueña que no puede beber, ni andar, ni moverse.

Latidos en la protuberancia frontal derecha, durante un minuto.

Boca pastosa, toda la madrugada.

5. Sed.

Dolor en la ingle derecha.

Entorpecimiento de la pierna izquierda.

Entorpecimiento de la parte inferior de la pantorrilla.

Borborigmos en el estómago y los intestinos.

10. Punzadas en toda la pierna izquierda.

Rubicundez é hinchazon en la pierna izquierda.

Aturdimiento de cabeza.

Gran sed, con amargo de boca.

Inapetencia.

15. Picor en la eminencia hipotenar de la mano izquierda, á las tres y media de la tarde.

Sensacion de torpeza en el vértice de la cabeza.

Picor en el testículo derecho.

Picazon en el muslo derecho.

Picadura, como por un alfilerazo, en la parte inferior de la pierna izquierda.

20. Picor en la parte interna del muslo izquierdo.

Picotazos en diferentes partes del cuerpo.

Dolor en la eminencia hipotenar de la mano derecha, á las siete de la tarde.

Sensacion de entorpecimiento en el cerebelo.

Picotazo en el talon.

25. Prurito en el maleolo esterno del pié izquierdo , á las ocho.
 Picor en el prepucio.
 Dolor calambroide en el maleolo interno del pié derecho.
 Dolor contusivo en el músculo pectoral izquierdo , que está muy sensible al tacto , por la noche.
Dia segundo.—Sueño inquieto.
30. Sueña que ve un carnero y un perro, vestidos de colorado.
 Sueño erótico , con polucion.
 Dolor en el omoplato , como por haber recibido un golpe.
 Dolor detrás del maleolo interno de la pierna izquierda.
 Malestar; despues picor en los muslos , á las dos de la tarde.
35. Dolor contusivo en la rodilla izquierda.
 Punzadas en la parte anterior del maleolo interno del pié izquierdo , á las siete de la tarde.
 Plenitud de estómago.
 Dolor punzante en el muslo derecho.
 Hinchazon violácea de la pierna , por la mañana: se inflama con el ejercicio y se pone amoratada por la noche.
40. Falta de apetito.
 Toda la pierna está cubierta de grandes manchas irregulares , formadas por la estravasacion de la sangre.
 Mayor frecuencia de orinar que la ordinaria.
 La cabeza está ardorosa.
 Sed continua , con amargo de boca.
45. Escoriacion en los lábios y las encías.
 Inapetencia completa.
 Dolor como de escoriacion en la pierna izquierda , que despues pasa al maleolo interno de la pierna derecha , haciéndose mas vivo.
Dia tercero.—Dolor desgarrador en la punta del corazon , que corta la respiracion , por la noche.
 Dolor en las sienes al tacto , durante todo el dia.
50. Rigidez en la pierna , con imposibilidad de sostenerse de pié durante algunos minutos.
 Dolor punzante entre los hombros.

Dolor sordo en la parte inferior de la region lumbar é hipogástrica.

Dolores quemantes en el año.

Grietas en los lábios y las encías, como el dia anterior.

53. Picor encima de la flexura del brazo derecho.

Dolor calambroide, en el tendon de Aquiles izquierdo.

Adormecimiento alrededor de los maleolos.

Dolor contusivo en la rodilla izquierda, á lastres de la tarde.

Punzadas en la parte inferior de la pierna derecha y en el maleolo interno, á las tres y media.

60. La parte superior é inferior del brazo izquierdo está dolorosa al tacto, á las cuatro y media.

Punzadas dolorosas en la parte inferior de la rodilla izquierda.

Prurito en la articulacion de la primera falange del dedo pequeño, á las ocho de la noche.

Dia cuarto.—Dolor en el dorso del índice izquierdo.

Cólico, seguido de una cámara blanda primero, despues diarrea, dos veces seguidas, por la mañana.

65. Malestar, como si se formara algun tumor en la parte interna de la pierna derecha, encima de la rodilla, por la tarde y el principio de la noche.

Dia quinto.—Pesadez en la region lumbar.

Sensacion como si la piel de la parte inferior de la pierna cayese sobre los maleolos, obligando á echar la mano con frecuencia como para suspenderla.

Prurito en la parte anterior de la pierna derecha.

Picor en la cara interna de la pierna derecha.

70. Sueños desagradables.

Dia sétimo.—Malestar despues de haberse despertado por la mañana, sin poder volver á dormirse. Siente como si le tirasen de los maleolos, durante muchas horas.

Este dolor va en aumento y se hace contusivo, á las tres de la tarde.

Los maleolos parece que están hinchados.

75. Dolor agudo en la region sacro-lumbar.

Dolor en el hipocondrio derecho.

Dia octavo.—Dolor en el epigastrio.

Continuacion de los dolores de las piernas.

Dolor permanente encima del maleolo interno de la pierna izquierda.

80. Escozor en la parte interna y superior del muslo derecho, por la tarde.

Punzadas agudas en la cabeza, por la noche.

Dia noveno.—Punzadas agudas en el lado izquierdo de la cabeza, por la tarde y noche.

Dia décimo.—Fuerte punzada en el occipucio.

Dolor al tacto en la parte anterior de la pierna izquierda.

85. Punzadas en el cerebelo.

CROTALLUS CASCABELLA.

CROTAL.

Se cria esta terrible serpiente en la provincia de Céara, de donde se hizo venir á Rio Janeiro. Aunque la longitud comun de este reptil es de un metro á metro y medio, el individuo del cual recogimos el veneno tenia dos metros y medio. Su cabeza, aovada triangular, semi-escutelada, presenta una depresion redonda delante de los ojos, que están cubiertos por un gran escudo elíptico formando la placa surciliar. El cuerpo, que se mueve con poca agilidad, es grueso, cónico, y está cubierto de escamas por encima, las dorsales aquilladas, sublancooladas; las de la cola cuadrangulares y mas pequeñas. El vientre está provisto de ciento setenta grandes placas transversales: las de la cola son veinticinco y las tres primeras están subdivididas. La estremidad de la cola tiene de siete á ocho cajas apergamizadas, las cuales producen un ruido estridente por el movimiento. El color del crotallus es pardo amarillento, mucho mas claro en el abdómen, y á cada lado del dorso marcado con 24 á 26 grandes líneas romboidales. Cuando se irrita este reptil y en tiempo de los grandes calores, exhala un olor muy pronunciado á almizcle. Los dientes maxilares poco numerosos, grandes y todos muy venenosos, están colocados en mandíbulas muy dilatables. La espantosa actividad del veneno de estas serpientes es demasiado conocida para que nos detengamos mas sobre su carácter.

Se obtuvo el veneno, comprimiendo en el animal vivo la glándula que lo contiene.

Mordedura en el dedo.

4. Hinchazon de la mano con extravasacion de sangre por la herida.
Dolor en la palma de la mano, estendiéndose hasta la muñeca.
Despues de una hora, hinchazon espantosa de la mano con sensacion de frio, asi como en los piés y piernas.
Pulso lleno, desde 110 hasta 140 pulsaciones por minuto.
5. Sensacion de plenitud en el trayecto de las yugulares, que luego se estiende á los costados y detrás de la nuca.
Alteracion de la vista.
Hormiguelo en la cara.
Despues de hora y media, el dolor y la hinchazon se estienden á los dos tercios del antebrazo.
Adormecimiento de todo el cuerpo.
10. Temblor visible de todo el cuerpo, una hora y veinte minutos despues.
Turbacion de la vista.
Frecuencia de pulso.
Dificultad de mover los labios.
Propension al sueño.
15. Constriccion en la garganta.
Aumenta la hinchazon de la mano.
Hinchazon y dolor en todo el brazo.
A la hora y treinta y ocho minutos, frio que le obliga á abrigarse.
A la hora y cuarenta y ocho minutos, dolor en la lengua y en la garganta, que se propaga hasta el vientre.
20. Sensacion de frio en los piés.
A las dos horas y cinco minutos, dificultad de hablar.
A las dos horas y veinte y cinco minutos, dificultad de tragar.
Ansiedad.

Sudor copioso en el pecho.

25. A las dos horas y cincuenta minutos, adormecimiento de los brazos, y salida de algunas gotitas de sangre por las narices.

Gran inquietud y ansiedad.

Noventa y seis pulsaciones por minuto.

A las tres horas y cuatro minutos, sudor general.

Gemidos involuntarios.

30. Abatimiento.

Cien pulsaciones por minuto.

A las tres horas y cuarto, dolores en los brazos, inquietud.

A las tres horas y media, noventa y ocho pulsaciones por minuto.

Rubicundez de la cara.

35. Sangre por las narices.

Rubicundez de todo el cuerpo.

Salida de sangre por una pústula debajo del brazo.

A las cuatro horas, aumento de la rubicundez.

Fuertes dolores en los miembros torácicos, que no permiten al enfermo reposo alguno á pesar de su profundo abatimiento.

40. Constricción de la garganta: dificultad de la respiración.

A las cuatro y media, ciento cuatro pulsaciones por minuto; gran dolor en toda la superficie del cuerpo.

Salivación.

A las cinco horas y media, continúa el mismo estado del pulso.

Entorpecimiento.

45. Orinas abundantes.

Saliva espesa, viscosa y oscura, que con dificultad puede echarse de la boca.

Postración muscular.

Los dolores arrancan frecuentes gemidos.

Respiración tranquila.

50. La piel está húmeda.

A las siete horas, soñolencia y gemidos.

Se aplacan los dolores del pecho y los brazos.

Sensacion de un nudo en la garganta.

Orina copiosa.

55. Deglucion dificil.

Saliva blanca y viscosa.

Serosidad sanguinolenta por la nariz.

A las nueve horas y cuarto, sueño.

Primera experimentacion.

Dia primero.—Dolor gravativo en el fondo de la órbita y sobre el párpado del ojo izquierdo.

60. *Dia segundo.*—Dolor en la órbita derecha y en el mismo lado de la frente.

Dia tercero.—Tos seca con cosquilleo en la garganta, por la noche.

Dia cuarto.—Cefalalgia, primero en la frente y luego en toda la cabeza.

Dia quinto.—Olor todo el dia al mismo *Crotallus*, asqueroso, nauseabundo, parecido al de un hospital.

Dia sexto.—Punzadas en diversas partes del cuerpo.

65. *Dia sétimo.*—Contraccion presiva sobre el globo del ojo derecho, que parece lo tiran hácia afuera.

Dia octavo.—Diarrea amarilla.

Dia noveno.—Dolor en medio de la frente.

Dia décimo.—Dolor reumático en el hombro derecho.

Dia once.—Dolor reumático en la muñeca izquierda.

70. *Dia doce.*—Calambres violentos en el talon.

Segunda experimentacion.

(El medicamento se tomó á las diez de la noche).

Espujo de sangre negra.

Picor por todo el cuerpo.

Sobresaltos durante el sueño.

Insomnio.

75. Miedo, por la noche, á cosas indeterminadas.
 Sueño por la mañana.
 Tirantez en la nariz, como si la punta estuviese cogida con una cuerda que la tirase hácia la frente.
 Hormigueo en la garganta, como si bebiera cerveza.
 Boca muy salada, por mas que bebe agua con azúcar.
80. Pulso lento.
 Aparicion de granitos rojos, cónicos, en la muñeca.
 Sacudidas dolorosas en las partes laterales del cuello al volver la cabeza.
 Sensacion de frio en el estómago, despues de haber comido.
 Sensacion de una clavija en la parte media del hígado.
85. Dolor presivo en la encía izquierda.
 Dolor en el vientre como si un aro que se cerrara en el ombligo lo comprimiera.
 Punzadas debajo de la axila derecha, correspondiendo al pecho é impidiendo la respiracion.
 Sensacion de un grano de arena en el ángulo esterno de los ojos.
 Punzadas quemantes en el piloro.
90. Constriccion en la glándula tiroides.
 Sensacion de retraccion de la pierna derecha, desde la cadera hasta el talon, y cojera producida por la ilusion de haberse acortado la pierna.
 Traccion en el ojo izquierdo hácia la sien.
 Ardor y constriccion en la garganta.
Dia segundo.—Dolor interior en la cabeza.
95. Frio en los piés.
 Debilidad en los brazos.
 Sensacion de contusion en la parte interna del omoplato derecho.
 Pesadez dolorosa en la region lumbar.
 Deslumbramiento: los objetos aparecen azules.
100. Borborigmos.
 Presion dolorosa en las sienes.
 Náuseas.

- Sensacion de llagas internas, debajo de las mamas.
 Sensacion como alfilerazos, en la espina dorsal.
105. Cree que andan gentes detrás de ella.
 Toda la caja ósea del cráneo parece oprimir al cerebro como un casco de hierro.
 Sacudidas en el epigastrio.
 Picor en los muslos.
 Frurito en las orejas.
110. Hinchazon de la oreja derecha.
 Sordera.
 Sueños de bailes con iluminaciones. Disputas, batallas.
 Cefalalgia frontal como si fuera á estallar la cabeza, con pesadez sobre los ojos, sobre todo por la noche.
 Dolor de estómago, correspondiendo al ombligo.
115. Cansancio en los brazos y las piernas.
 Escozor en las narices.
Sensacion de cortadura circular, como si le sacaran el globo del ojo con un cortaplumas.
 Dolor en la mejilla izquierda.
 Sudores y debilidad, despues de haber comido.
120. Esputos verdosos, por la mañana.
 Sensacion de un cuerpo vivo, que marchase circularmente por su cabeza.
 Sacudidas en el cerebro, que hacen perder el equilibrio.
 Temblor continuo de los párpados, sobre todo del izquierdo.
 Espuma sanguinolenta oscura alrededor de los labios, por la mañana.
125. Lengua roja escarlata.
 Sacudidas en los dedos.
 Dolor en el codo, como si los huesos estuviesen contundidos.
 Sensacion de un hilo que rodease al ojo, y tirase del globo hácia la sien.
 Sacudidas agudas en el muslo derecho con parálisis momentáneo del mismo.
130. Punzadas muy agudas en la sien derecha.
 Gran sed.

Dolor de vientre despues de haber bebido.

Dolor alrededor del ombligo.

Sensibilidad escesiva del vientre.

135. Gran deseo de comer, que desaparece á la vista de los alimentos.

Repugnancia á la carne.

Ojeras.

Tenesmo; despues de grandes esfuerzos arroja por el ano una cantidad de flemas como claras de huevo.

Procidencia del recto durante diez minutos.

140. Dolor en la palma de la mano.

Dia tercero.—Dolor en el pecho, que atraviesa á la espalda.

Sensacion como si hubiera en el epigastrio un agujero por donde penetrase el aire.

Insomnio con agitacion.

Cefalalgia, como si la frente fuera á estallar.

145. Cefalalgia, epistaxis, y violenta emocion por haberse despertado sobresaltada.

Retraccion de las piernas desde la cadera hasta los piés, con dolor de calambre.

Flores blancas.

Granitos en el cuero cabelludo.

Encorvamiento de los dedos de los piés.

150. Coloracion roja de las uñas.

Sensacion de agua en el pecho, con esfuerzos para vomitar, y desfallecimiento, como si el corazon nadara en un liquido.

Bostezos continuos.

Picor en la lengua.

Escozor en las puntas de los dedos.

155. Sensacion de polvo en la garganta.

Los granos comienzan por un punto rojo en la piel, como picaduras de pulga; despues se elevan en punta, haciéndose el centro de una esfoliacion menos estensa que la causada por el *Elaps Corallinus*, y en medio de la cual persiste un punto negro.

Picor en el ángulo interno del ojo.

- Sensacion de quemadura con rubicundez de la piel en la ventana derecha de la nariz, que está sensiblemente deprimida.
- Cree oír gemidos.
160. Compresion de la cabeza, la cara, la espalda y el pecho, como por una armadura de hierro.
- Sensacion de ligaduras alrededor del vientre.
- Dolor en los codos.
- Dolor en las yugulares, al mover el cuello.
- Mucosidades abundantes por la nariz derecha, por la noche.
165. Gusto pútrido y de cebollas en la boca, hasta despues de enjuagársela.
- Ardor y picor en la punta de la lengua.
- Desfallecimiento, que desaparece al aire libre.
- Anorexia por el día y gran apetito por la noche.
- Dolor encima del pecho derecho.
170. El bolo alimenticio cae de golpe en el estómago y permanece como una piedra, con dolor hasta en la espalda.
- Dolor en el costado izquierdo, al respirar despues de haber bebido.
- Punzadas en el costado.
- Día cuarto.*—Violentas punzadas en la matriz, habiéndose lavado con agua fria, y grandes punzadas si está el agua caliente; pesadez sobre el útero.
- Picor en las plantas de los piés.
175. Hormigueo en los piés hasta los maleolos.
- Pinchazos como de agujas en las corbas.
- Desfallecimiento de estómago.
- Enorme peso en la region hipogástrica.
- Habla con una persona que cree tener delante, que ni le responde ni existe.
180. Miedo por la noche.
- Siente subir la sangre á las arterias carótidas con fuerza, despues desfallecimiento, y por último un golpe como el de una válvula que se abre.
- Punzada violenta en el epigastrio.

Tembler en todos los miembros.

Grán frio, que no se quita por mas que se arropa.

185. Fuerte dolor de cabeza, principalmente en el vértice, con sensibilidad del cuero cabelludo al tacto.

Estincion de la voz.

Gran debilidad.

Abatimiento, tristeza.

Sófocacion y temor de otro segundo ataque.

190. Sensacion de un hierro candente sobre el vértice de la cabeza.

Pesadez sobre los párpados.

Dolor en las encias inferiores, como si las hubiera tocado un hierro ardiendo.

Peso enorme en el diafragma.

Dolor continuo de contusion entre los hombros, y alguna vez punzadas lentas y acompasadas, como si una vértebra se hubiera fracturado.

195. Dolor constrictivo, como si una cuerda oprimiera la glándula tiroides.

Dia quinto.—Despues de haber comido, frio en la espalda.

Traccion desde el cuello al epigastrio.

Dolor en la clavícula derecha.

Pesadez sobre las órbitas.

200. Frio glacial en los piés.

Dolor en la frente, á las diez de la mañana.

Dolor de estómago, comiendo, como por vacuidad.

Le parece que las palpitations del corazon se verifican de alto á abajo.

Dolor interior entre los hombros.

205. Ulceracion en el interior de la nariz.

La idea de la muerte le persigue á todas partes, sobre todo cuando está sola.

Piensa continuamente en la muerte con gran tristeza.

No puede llorar por mas que lo desea.

Punzadas en el conducto auditivo.

210. Metrorragia de color muy bajo.

Parálisis de la lengua con imposibilidad de hablar.

Durante diez minutos está subida sobre la ventana, á donde se la sujeta en el momento en que iba á precipitarse.

A las tres, se levanta de repente lanzando gritos agudos y encorvando el cuerpo hácia adelante.

La metrorragia que tenia desde por la mañana se suspende repentinamente.

215. Muchas lágrimas.

Frio en las manos.

Temblor en las manos.

Falta absoluta de memoria.

A las seis, segundo ataque; despues, se tiende en una butaca.

220. Ardor en la frente.

Palpitaciones de corazon.

Llantos.

Juega con sus dedos como un niño.

Gran sofocacion.

225. Estado de perturbacion mental; no se le puede hacer comprender nada y vé de nuevo el fantasma de la muerte: inmenso esqueleto, negro, descarnado. Aumento de la demencia y los llantos.

Vista uraña.

Pellizcos en el vientre.

Dia sexto.—Dolor osteocopo é hinchazon de la clavícula izquierda.

Sueña que vé un caballo nadar en el mar y que vá poco á poco ahogándose.

230. Gemidos dolorosos durante el sueño.

Estando despierta, cree que se cae de la cama.

Dolor en la articulacion sacro-lumbar.

Pérdida de conocimiento y de la vista.

Frio en la espalda.

235. Opresion; le parece que no hay aire en la casa.

Contraccion de los dedos de los piés.

Gran deseo de tomar hielo, pero no agua, ni vino.

Escozor en el epigastrio.

Ardor en los muslos.

240. Gritos repetidos: supone estar en una jaula de leones, pero que no le muerden.

A las seis de la tarde, nuevo acceso de demencia. No responde á lo que se le pregunta, pero oye una voz estraña á la izquierda y hácia atrás, á la cual sigue, golpeando y arañando las puertas que se encuentra cerradas.

Se repiten, á cortos intervalos, tres ataques semejantes. Alguna vez se interrumpen por risas estúpidas y concluyen siempre con un torrente de lágrimas.

Nuevos gritos: permanece aun en la jaula de los leones, sin que le hagan daño alguno.

Día sétimo.—Antes de comer, desfallecimiento, como por hambre.

245. Dolor contusivo en el occipucio.

Soñolencia toda la madrugada.

Nuevo acceso de enagenacion mental, oyendo siempre la misma voz que la persigue. Llantos.

Aturdimiento de cabeza y estupidez.

La estremidad humeral de la clavícula izquierda continúa hinchada.

250. Metrorragia muy roja, intermitente, alternando con los ataques de demencia.

Emision involuntaria de orina.

Dolor transversal en la region umbilical, con sensacion de tracciones y punzadas alternativas.

Hinchazon de los tres últimos dedos del pié izquierdo.

255. Sofocacion.

Dolor en los huesos, sobre todo en las articulaciones de los codos y omoplatos, de las falanges de los dedos de la mano, de las rodillas, de la cadera y debajo de las uñas de los piés.

Presion en la cadera derecha, como por una hoja de cuchillo.

Supresion de la metrorragia.

No puede sentir á nadie á su derecha, sin tener al instante palpitaciones de corazon.

260. *Dia octavo.*—Sueña con enormes arañas, velludas como migales, que la persiguen y quieren subirse sobre ella.

Dolor punzante en el gran psoas.

Sofocacion.

Mancha circular en la parte media y anterior del pecho, negra en la mitad superior y roja en la inferior.

Efelides de un amarillo muy vivo, en el dorso de la mano derecha.

265. Granitos rojos en el pié izquierdo, como los que tuvo en la mano el segundo dia.

Gran constipacion.

Punzadas en la matriz y el ano, sobre todo lavándose con agua fria.

Dolores en el bajo vientre bebiendo líquidos frios.

Sensibilidad escesiva del epigastrio, con imposibilidad de recibir la presion de los vestidos.

270. Dentera y sensibilidad escesiva de las muelas.

Vómitos despues de almorzar, por haber bebido agua templada.

Llamaradas de calor á la cara.

Violento picor en las pantorrillas.

Granitos rojos con un punto blanco en el centro.

275. Coloracion negra de las venas de las corvas, cuando bebe agua fria.

Zumbido de oidos, al hajar escaleras.

Dia décimo.—Dolor en las muelas superiores, por la noche, con inflamacion de las encías.

Espuito de sangre mezclada á mucosidades espesas.

Sueños de muertos y aparecidos.

280. Repugnancia á los alimentos.

Despues de un mes, sordera.

Sensacion como si se le saltaran los ojos.

Dolores pasajeros debajo de las cejas.

Mucosidades blancas por la boca.

285. Epistaxis de sangre clara.

Las últimas falanges están como rotas.

Coloracion azul de las estremidades de los dedos.

Las uñas están descarnadas.

Coloracion amarilla.

290. Dolor en el costado izquierdo.

Malestar antes de presentarse las reglas, y mal humor cuando se han presentado.

Taciturnidad.

Susceptibilidad.

Deseo de mudar continuamente de lugar.

291. No responde á nada que se le pregunta.

Granitos rojos por todo el cuerpo.

Opresion en el vértice de la cabeza.

Calambres en los brazos, como si los nervios estuvieran anudados en las flexuras.

ELAPS CORALLINUS.

Este reptil se encuentra en los bosques de todo el litoral brasileño, siendo muy temible por su peligrosa mordedura. Entre las serpientes del Brasil es la que presenta mas hermosos colores y dispuestos mas agradablemente. La cabeza, pequeña, manchada en su parte posterior hasta el cuello, del cual difiere poco en grueso, está cubierta por dos grandes escamas poligonales. Los ojos son redondos y pequeños; las mandíbulas poco dilatables, con dientes agudos, acompañados de colmillos, que descansan sobre glándulas venenosas. La longitud del cuerpo es de 80 centímetros, redondo, bastante grueso relativamente á la cabeza y terminado por una cola aguda. Su parte superior está cubierta de escamas lisas romboidales; el abdómen de 200 escamas transversales. La coloracion es muy variada, y está formada de anillos de color rojo de cinabrio, que alternan con otros negros, pero separados por líneas circulares de un blanco verdoso. La parte superior de la cabeza es negra, asi como tambien el primer anillo del cuello. Las escamas de las mandíbulas son blancas, separadas por líneas negras. El veneno de este reptil se recogió del mismo modo, no sin peligro, que el del *Crotallus cascabella*.

1. *Dia primero, segundo y tercero.*—Desvaríos por el dia: se figura que le dan golpes.

Cree oír hablar.

Oye hablar sin comprender.

Distraccion.

5. Pesadilla y congestión á la cabeza.

Sueños angustiosos.

Pesadez en la region parietal derecha, con dolor penetrante hasta la nuca.

Latidos isócronos en la nuca, como la péndola de un reló.

Pesadez en la frente y en las órbitas.

10. Dolor terebrante desde el vértice de la cabeza hasta la ceja derecha.

Dolor en el lado derecho del cerebelo.

Sudor en la frente y la nuca.

La cabeza se cae hácia adelante.

Constricción muy dolorosa en las sienes y los ojos.

13. Latidos violentos de la carótida esterna.

Dolores insoportables, echando la cabeza hácia atrás; se alivian inclinándola hácia adelante.

Tension en la *nuca*.

Rigidez, que impide volver la cabeza.

Sensacion en la sien derecha, como si hubiera un cuerpo extraño.

20. Punzadas en el ángulo esterno del ojo izquierdo.

Dolor terebrante desde la mandíbula inferior hasta el ojo derecho, y despues desde la ceja derecha hasta la oreja.

Necesidad de cerrar los ojos, como en la fiebre.

Picor muy vivo en el ángulo interno de los ojos.

Dolores presivos alrededor de los ojos, con desvanecimiento.

25. Zumbido prolongado de oídos, como si un moscardon se hubiera entrado en ellos.

Sordera prolongada.

Tintineo en los oídos.

Flujo de serosidad por la oreja izquierda.

Gran picor en la cavidad nasal superior.

30. Hinchazon de las encías correspondientes á las tres últimas muelas.

- Gusto picante como á pimiento , despues de haber triturado el medicamento.
- Picor en la punta de la lengua.
- Eruetos agrios ; deseo de agua fria y helados.
- Repugnancia á los alimentos ; eruetos agrios á cada bocado.
35. Constriccion presiva en la garganta.
- Ardor con necesidad de aire fresco , desde la laringe á la estremidad de la lengua , como por la accion de la menta.
- Los alimentos bajan al exófago como si cayeran en espiral.
- Otras veces, el bolo alimenticio se precipita, como por un tubo metálico, y cae bruscamente en el estómago, que tiembla con violencia.
- Diarrea acuosa con borborismos, amarilla, mezclada con flemas.
40. Orinas casi rojas.
- Orinas abundantes.
- Orinas rojas.
- Constriccion del esfinter.
- Flujo prolongado de licor prostático.
45. Engrosamiento é inflamacion de la piel del prepucio.
- Escoriacion en el dorso del miembro con picor continuo.
- Debilidad de los órganos genitales, impotencia.
- Punzadas en el pene.
- Hinchazon y peso en los testículos.
50. Esputo de sangre coagulada en cuajarones negros, con dolor, como si procediese del corazon.
- Tos casi continua.
- Sensacion en la cavidad torácica y el esternon, como si las pleuras estuviesen rasgadas y los pulmones separados con violencia el uno del otro.
- Imposibilidad de inclinarse al lado derecho, sin experimentar una violenta tirantez muy dolorosa en el mismo pulmon.
- Violento picor, traccion y punzadas en el epigastrio, que impiden respirar profundamente.
55. (Curacion al segundo dia de experimentacion de un antiguo ahogo crónico al subir escaleras).

Acceso muy violento de tos seca , que termina con espectoracion de sangre negra, con atroces dolores de arrancamiento en toda la estension de los pulmones , especialmente en la parte superior *derecha*.

Gusto á sangre en la boca antes del acceso, y conatos á vomitar cuando ha pasado.

Ardor en las manos , al preparar el medicamento.

Picor en el dorso de la mano derecha.

60. Tracciones en la mano derecha , hasta el dedo anular.

Dolor en los codos.

Constriccion calambroide en las falanges de los dedos y debajo de las uñas.

Punzadas en el dorso de la mano.

Aflujo de sangre á la mano , que está violácea y como paralizada, viéndose obligado á tenerla levantada , para evitar este efecto.

65. Salida de sangre negra por el dedo, al mas leve pinchazo.

Erupcion vexiculosa en los piés.

Dolor en las rodillas.

Dolores de contusion y fractura en las rodillas, especialmente en la izquierda, á la que no puede tocarse sin producir dolores como de luxacion.

Dia tercero, hasta el sétimo.—Sensibilidad del *costado derecho*.

70. Imposibilidad de levantar la mano , á causa del dolor del costado derecho.

Aparicion de algunas flictenas en diferentes partes, especialmente en las piernas , que concluyen por hacerse el centro de una esfoliacion del epidermis.

Soñolencia por el dia é insomnio por la noche.

Desvaríos , que versan sobre las ocupaciones domésticas.

Dolor en la frente.

75. Rubicundez de los párpados.

Sensibilidad estrema de los ojos al agua fria.

Obturacion de la nariz derecha, que se alivia echándose del mismo lado.

- Mal olor de las narices.
 Sacudidas en el exófago.
80. Dolor de cabeza siempre que tarda un poco en satisfacer la necesidad de comer.
 Caloradas despues de comer.
 Hinchazon del estómago, despues de la comida.
 Tracciones en el epigastrio.
 Hambre devoradora.
85. Presion en el hipocondrio derecho.
 Presion en el costado derecho, hasta la columna vertebral.
 Dolor sordo en el pulmon *derecho*, agravado por el movimiento.
 Aflujo de sangre á la garganta, causado por el dolor del pulmon.
 Sensacion de rigidez y luxacion en la articulacion de la *rodilla*.
90. *Dia sexto*.—Dolor en la nuca, como por cõmpresion del cerebelo.
 Inflamacion, con inyeccion roja en los ojos.
 Hemorragia por los ojos.
 Ojos vidriosos.
 Boca amarga y salada.
95. Borborigmos ardientes.
 Dolores punzantes en los costados.
 Procidencia del recto.
 Ronquera.
 Palpitaciones violentas.
100. Sensacion de fractura en las partes laterales del cuello.
 Fraccion dolorosa en la parte interna del brazo, desde la muñeca hasta la axila, pero mas sensible en la flexura.
 La mano derecha está como paralizada.
 Escalofrio en la espalda, lavándose las manos con agua fria,
 Malestar en los miembros abdominales.
105. Hinchazon del pié izquierdo con coloracion azulada y manchas rojas.
 Retraccion de los piés.

Traccion en las glándulas parótidas.

Saliva salada.

Erupcion costrosa en la oreja y una parte de la mejilla.

410. Picor en el interior de la oreja , por la noche.

Orinas rojas con copos mucosos.

Punzadas en el elix y en el lóbulo de la oreja.

Flujo de un líquido amarillo-verdoso por el oido.

Dolor en la glándula parótida.

415. Granos pruritosos en las piernas.

Flujo de sangre , por la oreja.

Hinchazon de las glándulas inguinales.

Dolor al tacto en la ingle izquierda.

Cólicos , con necesidad apremiante de defecar.

420. Diarrea negruzca y espumosa.

Orinas muy espesas , que depositan abundante sedimento rojo.

Segunda experimentacion.

Dia primero.—Tension en la nuca con imposibilidad de volver la cabeza.

Rubicundez muy pronunciada de la cara.

Dolor en la uretra al orinar.

425. Pinchazos en las encías del lado izquierdo.

Hambre , con repugnancia á los alimentos.

Laxitud en los miembros.

Pinchazos debajo de las uñas de los piés.

Sensacion de escoriacion en la nuca.

430. Violento dolor en la region lumbar , formando cintura hasta la matriz.

Peso sobre el útero.

Peso en el estómago , despues de haber comido.

Agrios , náuseas y sensacion de desfallecimiento.

Peso en el lado izquierdo de la matriz.

435. Sed inestinguible.

Sensacion de frio en el pecho , despues de heber.

Temblores de las piernas.

Dolor en la garganta del pié, como despues de haber corrido mucho.

Cólico que pasa sucesivamente toda la estension del colon, despues el ciego y por último el recto.

440. Insomnio con inquietud.

Pesadez sobre la vagina, á consecuencia de cólicos histéricos.

Despues de una congestion prolongada en los miembros torácicos, la sangre parece dirigirse á los abdominales.

Pinchazos en el útero, en la vagina y en la region pubiana, que se propagan al epigastrio, con latidos muy dolorosos.

Punzadas en el ombligo, de alto á abajo, hasta el útero.

445. Vómitos de bilis verde, seguidos de diarrea biliosa.

Zumbido de oidos.

Salida de bolitas de cerumen negro, endurecido, por el oido.

Dia segundo.—Dolor sordo en el pulmon derecho, agravado con el movimiento, con malestar y aflujo de sangre á la garganta.

Prurito y traccion en el pulmon derecho.

150. Ojos lagañosos.

Presion en el pecho, como por un corsé.

Presion en la axila derecha.

Leucorrea blanca, albuminosa, como clara de huevo.

Sensacion de arena en los ojos.

155. Flujo de mucosidades blancas y acuosas por la nariz.

Prurito continuo en la nariz.

Peso muy grande sobre la matriz, agravado por el movimiento.

Coriza á la mas leve impresion de aire: estornudos.

Dolor contusivo en la parte interna de la pierna izquierda, con sensacion como si subiera y bajara por la tibia un cuerpo extraño.

160. Dificultad de abrir los ojos.

Cree ver filamentos largos y blancos que voltigean delante de los ojos.

Cuando cierra los ojos, lo ve todo colorado con puntos negros.

Prurito en el conducto auditivo derecho.

Despues de comer, impedimento en el exófago, como si hubiera detenida en él una esponja.

465. Los líquidos se detienen en el exófago, como si este órgano estuviera espasmódicamente contraído; despues caen al estómago bruscamente.

Punzadas de alto á abajo en los músculos posteriores del tronco, y despues desde el occipucio hasta el sacro, acompañadas de dolores en las sienes.

Punzadas en las plantas de los piés, estando sentada; desaparecen andando.

Dolor en la frente.

Flujo de sangre negra, fuera del tiempo de las reglas.

470. Sensacion de desolladura en la protuberancia occipital, por la mañana.

Violento prurito en la vagina.

Picor, como por alfilerazos.

Dolor presivo en el costado izquierdo.

Calambres en las pantorrillas, por la tarde.

475. *Dia tercero*.—Buena digestion del almuerzo, pero indigestion de la comida.

Mucha sensibilidad al frio.

Calor en el epigastrio, despues de comer.

Frio en la espalda.

Ojos lagañosos.

480. Ve delante de los ojos una gasa blanca azulada ó nacarada.

Sensacion de rigidez y luxacion en la rodilla.

Tendencia al síncope.

Desfallecimiento con sudores.

Insomnio ó soñolencia, con desvaríos penosos de las ocupaciones del dia.

485. Punzadas en la vagina.

Ardor en la nariz, é hinchazon de la ventana izquierda.

- Peso en el lado izquierdo de la vagina, con dolor que impide subir escaleras.
- Siente afluir como una columna de líquidos al abdómen, donde se desarrollan borborignos muy violentos.
- El párpado del ojo izquierdo está dolorido y péndulo.
190. Espuctos con olor á huevos podridos.
- Punzadas que parten simultáneamente de las ingles y vienen cruzándose á la sínfisis del pubis.
- Diarrea de mucosidades sanguinolentas y de bilis amarilla, en vez de verde que era antes.
- Ve delante del ojo izquierdo á distancia de algunos pasos, un disco negro de cuatro pulgadas de diámetro.
- Evacuacion de sangre negra en los escrementos, con cólicos agudos, como si se hicieran nudos en los intestinos.
195. Orzuelo en el ojo izquierdo, con fuertes punzadas.
- Cosquilleo y estrias rojidas en la esclerótica.
- Mancha roja en la rodilla.
- Cólico violento, como si los intestinos se anudaran unos con otros.
- Disenteria sanguinolenta, seguida de sueño.
200. Aparicion de las reglas, fuera de su época ordinaria.
- Presion entre los hombros.
- Velo gris delante de los ojos, como una nube espesa: comienza por ser de la estension de una pulgada y concluye por cubrir todo el espacio de la vision.
- Sensacion en los riñones, como si aplicaran á ellos una barra de hierro.
- Punzadas en el orzuelo del ojo izquierdo.
205. Punzadas en los músculos del cuello, sobre todo al levantar los brazos.
- Entorpecimiento paralítico de todo el lado derecho, desde el hombro hasta la rodilla.
- Traccion en el orificio cardiaco, con sensacion de hambre y dolor terebrante hasta la columna vertebral.
- Dolor en la médula espinal, desde la nuca hasta la articu-

lacion sacro-lumbar ; rigidez del cuello, con constrictcion en la glándula tiroides.

Constrictcion y calambre en la flexura de los brazos al moverlos.

210. Peso en el estómago, despues de comer, con esfuerzos para arrojar los alimentos.

Dolor constrictivo en la flexura del brazo y en la corva.

Picor en el conducto auditivo.

Prurito en el oido , que se propaga al interior de la mejilla, siguiendo el trayecto del conducto de Stenon.

Saliva acuosa.

215. Saliva viscosa muy abundante.

Dolores á cualquier cambio de posicion , con deseo de conservar siempre una, sea cualquiera.

Diarrea de alimentos no digeridos.

Conmocion de la dentadura, que impide mascar.

Tos crasa.

220. *Dia cuarto.* — Parálisis completa del lado derecho, con imposibilidad de levantarse de la cama.

Violento picor en el ojo izquierdo.

Ceguera absoluta, durante cinco minutos.

Adormecimiento de la mano derecha: pinchazo que atraviesa el espesor del metacarpo.

Escozor en las uñas.

225. Traccion dolorosa de la parte interna del brazo , desde la axila hasta la muñeca, pero mas sensible en la flexura.

Rigidez en la traquea, como despues de una tos violenta.

Mancha herpética, roja y pruritosa en la ventana de la nariz derecha , que llega hasta la mejilla.

Obturacion de las dos narices.

Caloradas, estando comiendo.

230. Malestar en los miembros torácicos.

Cianosis y manchas rojizas en los miembros.

Gran picor en la axila y aparicion de un herpe.

Aflujo de sangre á la mano derecha, que está morada y como paralitica.

Metiéndola en agua, escalofrios hasta el hombro.

235. Hinchazon en la mano, brazo, pierna y pié derecho, con coloracion azulada y manchas rojas.

Calambres en todo el lado derecho.

Calambres en la pantorrilla.

Inflamamiento en el estómago.

Punzadas agudas, de vez en cuando, como alfilerazos, en el cuarto dedo del pié izquierdo.

240. Punzadas rápidas y pasajeras en la espalda, los costados y los brazos.

Dolores en la raiz del cabello del occipucio.

Las frutas y los helados permanecen en el estómago como un hielo.

Cólicos repentinos con diarrea.

Punzadas en la parte superior de los pulmones.

245. Hinchazon en la region del diafragma.

Escalofrio general y castañeteo de dientes, despues de beber agua fria.

Punzadas en la parte interna de las rodillas.

Punzadas en la raiz de la nariz hasta la oreja.

Sensibilidad en el epigastrio.

250. Dolor en la estremidad de los dedos.

Rubicundez y dolor debajo de las uñas.

Se muerde la mano, soñando, sin despertarse.

Presion entre los hombros.

Los líquidos caen al estómago haciendo gló-gló.

255. Hinchazon de la nariz, con dolor que se estiende hasta la oreja.

Picor en los párpados, especialmente en el izquierdo.

Dolores muy agudos en el hueso iliaco del lado derecho, como si la cresta estuviera hinchada y el periostio inflamado.

Frio glacial en la pierna izquierda, hasta la rodilla.

Cefalalgia frontal.

260. Evacuacion de sangre negra y líquida.

Borborigmos y ventosidades ardientes.

Estrangulacion del esfinter , por un cuarto de hora despues.
 Movimiento peristáltico en sentido inverso en los intestinos;
 la sangre parece refluir hácia el abdómen , con gran dolor
 y palpitaciones de corazon, seguidas de punzadas, que im-
 piden la progresion.

Dia quinto.—Sueño de muertos; tropieza con cadáveres y cae
 en la fosa, donde se le enredan los piés, y se ve en la
 necesidad de marchar arrastrándose.

265. Humor pendenciero , irritable; agitacion de espíritu.

Gran apetito.

Descamacion del talon y de los dedos de la mano.

Durante el sueño, se ha mordido en el antebrazo.

Vértigo con tendencia á caer hácia adelante.

270. Aunque está inmóvil , le parece que se cae hácia adelante.

Aplicándose la mano á la nuca, siente un dolor penetrante
 que se propaga hasta la oreja.

Dolor en el costado, todo el dia.

Respiracion interrumpida por la nariz.

Cree que está oyendo hablar , cuando todo está en silencio.

275. Gran picor en el cuero cabelludo.

Dia sexto.—Ilusiones singulares de la audicion: cree oír sil-
 bidos y campanillazos , y se levanta para ver quién toca.

Sueños espantosos: amortaja un cadáver y escarba con un
 puñal en sus heridas.

Despues tiene grandes remordimientos y derrama abundan-
 tes lágrimas.

Sueña que se bate con un presidario.

280. Deseo de batirse y buscar pendencias.

Agitacion de espíritu.

Picor y descamacion en la planta de los piés.

Grano pequeño, con gran prurito.

Flujo de mucosidades claras por la uretra.

285. A la menor contrariedad, el cuerpo se escalofria, la san-
 gre hierve y siente punzadas en todas partes.

Laxitud de todos los miembros.

Dia sétimo.—Deseo de ir al campo, de jugar en la yerba.

Deseo de estar sola; se esconde dias enteros en un rincon de su cuarto.

Sueño profundo. Proyectos de viajes.

290. Oye silbidos de distintos tonos.

Comiendo pan, le encuentra un gusto soso, análogo al del veneno triturado, que tomó para la experimentacion.

A la hora de acostarse quiere salir de casa.

Se esconde para trabajar en una habitacion retirada.

Siente una irresistible necesidad de gritar con todas sus fuerzas.

295. Repugnancia á las carnes, á las bananas y al pan.

Deseo de naranjas, ácidos y huevos con aceite y vinagre.

Sudor abundante y frio en todo el cuerpo.

Dia octavo.—Durante un mes, todo el pan que toma lo arroja por las narices sin mezclarse con los demas alimentos. que son ó digeridos, ó vomitados por la boca.

Metrorragia.

300. Gran aversion á la luz: busca siempre los sitios oscuros.

Continuacion de la diarrea.

Erupcion de granitos redondos, que se secan, descamándose luego al epidermis.

Dia noveno.—Pierde completamente el apetito, y no come mas que naranjas.

Dolor de quebrantamiento en la parte superior del deltoides como si hubiera recibido un fuerte golpe en el hombro.

305. Lengua negra ó morada.

Descamacion del herpe del ala de la nariz.

Manchas amarillas, irregulares, muy estensas en la mano y alrededor de las puntas de los dedos.

Vé una barra roja, trasversal, de una pulgada de larga, cuando abre los ojos, y un disco rojo, cuando los cierra.

Forúnculos en los brazos.

310. Profundo fastidio.

Desaliento; quisiera estar metida en una cueva, donde nadie la viera.

Abolicion de las ideas.

- Anonadamiento completo, sin apercibirse del tiempo que pasa.
Dia décimo.— Despues de haber comido una naranja con pan, vomita la naranja por la boca y el pan por las narices.
315. Frio en la parte posterior de los muslos.
 Herpes furfuráceos pruritosos en el cuero cabelludo.
 Tiene hambre y no puede comer.
 Granitos miliares rojos en la punta de la nariz.
 Hambre devoradora.
320. Ardor en el estómago y el duodeno.
 Caloradas despues de comer.
 Dolor pleurítico en el costado derecho, debajo de la axila.
 Hambre continua, que los vómitos impiden satisfacer.
 Granitos supurantes en las manos, en los dedos, en las muñecas, en las encías y en la parte interna de los carrillos.
321. Prurito atroz en el bajo vientre, especialmente al andar.
 Innumerables granos blancos en la parte interna de los muslos, que inflamándose por el dia, impiden andar por la noche.
 Ardor en los párpados.
 Soñolencia por el dia e insomnio por la noche.
 Cosquilleo en la nariz, como si le anduviera en ella un gusano.
330. Lengua agrietada y blanca, por la mañana.
 Hinchazon alrededor de los ojos, por la mañana.
 La impulsión arterial hace brotar sangre por la nariz y los oídos.
 Hormigueo en el ano, como si se le picase un gusano.
 Supresion de orina.
335. Prurito y hormigueo en la vulva.
 Sed con deseo de beber leche.
 Sudor frio general.
 Digestion muy lenta; á cada bocado tiene necesidad de beber.
 Horror extraordinario á la lluvia.
340. Metrorragia de sangre negra.
 Ruido como de una válvula, que cerrándose en la traquea hiciera refluir una columna de aire á la faringe.

Dia once.—Hemorragia por los oídos.

El pan sale siempre por la nariz.

Dia doce.—Repugnancia al pan y á otros alimentos.

345. Afición á las naranjas y alimentos salados.

Vómitos acuosos, por la mañana.

Granos elípticos, llenos de serosidad.

Dolores muy agudos en el colon descendente.

Granitos rojos en las puntas de los dedos.

350. *Dia trece.*—Descarnamiento de las encías.

Rugido tumultuoso de los intestinos, que parece que están cogidos con una cuerda que los oprime y forma nudos, que estrangulan violentamente el abdómen en toda su estension.

Sensacion extraordinaria de frio, despues de haber bebido.

Sensacion de una abertura cilindrica en el pulmon izquierdo, por donde bajase y subiese agua helada, despues de haber bebido.

Vómito de los alimentos.

CANNA ANGUSTIFOLIA.

CAN. ANG. *Amoméas. Canna glauca. Imbiri.*

La *canna angustifolia* crece en los sitios húmedes y en las orillas de los arroyos. Su tallo es recto, cilíndrico, de unos dos metros de longitud, con un rargo rizoma, cubierto de numerosas raicillas. Presenta gruesos nudos, de donde nacen grandes hojas alternas, envainadoras, cuyo limbo lanceolado tiene un gran nervio en el centro, del que parten nervicillos transversales paralelos. El tallo lleva en su ápice ramos floríferos. Flores alternas, sostenidas por pedúnculos cortos y acompañadas de bracteas: corola con doble perianto, con tres divisiones adherentes al ovario, el cual es triangular, verdoso y muy glandular. Los estambres presentan los caracteres metamórficos comunes en esta familia.

Se emplean las hojas.

La infusion de las hojas del *Imbiri* se ha recomendado mucho contra la lepra; pero despues de numerosos esperimentos, se ha renunciado á este medio, como á tantos otros.

4. Espectoracion blanquecina, por la mañana.
Entorpecimiento en el empeine del pié.
Sueños de medicina, de tratamientos.
Vértigos al despertar.
5. Calor en el ano.
Punzadas en los piés, en las piernas y en las manos.
Dolor en el pecho.
Hinchazon en los dedos de las manos.
Debilidad de la vista.
10. Prurito en la piel.
Cansancio en el pecho.
Descamacion de la piel.
Opresion en la garganta.
Escitacion del apetito venéreo.
15. Evacuacion demasiado pronta y sin placer.
Calor en las orejas.
Constipacion.

HEDYSARUM ILDEFONSIANUM. (*Nobis.*)

HED. ILL. *Desmodium. Leguminosas. Amor do campo. Barba de boi. Carapiche.*

Planta de tallo pardusco, leñoso, de un metro de altura, ramoso, pubescente, sobre todo en su parte superior. Hojas alternas, pinnadas, trifoliadas con hojuelas ovales, ligeramente tomentosas, sostenidas por un peciolo velludo biestipulado. Flores pequeñas, sostenidas por pedúnculos filiformes y unifloros, en espigas laxas terminales. Fruto oval, muy veloso, sostenido por pedúnculos encorvados, el cual se adhiere con gran fuerza á los vestidos y á los pelos de los animales, por cuya razon los brasileños le llaman *barba de boi*.

Se trituran las hojas.

1. Traccion muy dolorosa desde los riñones hasta el ombligo.
Alivio al segundo dia.
Aparicion repentina de un flujo amarillento.

Insomnio muchas noches seguidas.

3. Prurito en el pene.

Dolor y picor en los ojos.

Dolor y contraccion en los dedos.

Rubicundez y escozor en el pene.

Diarrea.

10. Orinas abundantes.

Dolor en los brazos y las piernas.

Escozor en los ojos con lagrimeo.

Inyeccion de la esclerótica.

Dolores reumáticos con fiebre.

15. Constipacion.

Hinchazon dolorosa del pene con inflamacion erisipelatosa.

Espulsion de la orina en chorro muy delgado, á causa de la inflamacion del glande.

MYRÍSTICA SEBÍFERA. (SWARTZ.)

La myrística sebifera es un árbol muy elevado, cuyo tronco y ramas están revestidas de una corteza gruesa, pardusca y reticulada. Hojas alternas, oblongas, acorazonadas, algo tomentosa por el envés y sostenidas por un corto peciolo. Flores en panojas, vellosas, ramosas, que nacen de la axila de las hojas, ó de la estremidad de las ramas, dioicas con perigonio simple, urceolado, con tres divisiones. Flores machos con seis estambres, cuyos filamentos unidos, están insertos sobre un disco glanduloso; flores hembras mas pequeñas; un ovario unilocular; estigma pentado y bilobulado. Baya abierta en dos valvas, que contienen una semilla oleaginosa, rodeada de un arilo laciniado. Este árbol crece en las provincias de Para y Rio Negro.

Se tritura el jugo rojo, acre y muy venenoso, que se obtiene haciendo incisiones en su corteza.

1. *Dia primero*.—Vértigo; parece que los objetos dan vueltas de derecha á izquierda, por la mañana al despertar.

Dificultad de tragar la saliva.

Constriccion del istmo de la faringe.

Dolor presivo de dentro á fuera en la protuberancia frontal derecha.

5. Este dolor se hace intermitente y se alivia al aire libre.

Dolor en las uñas de las manos, con hinchazon de las falanges.

Dolor punzante en la pantorrilla derecha.

Dia segundo.—Imposibilidad de dormir en la cama.

Sueños de construccion de casas, empezando por los pisos superiores.

10. Toda la cavidad bucal, las amígdalas y la parte superior de la faringe, están doloridas y muy sensibles al tacto. El bolo alimenticio parece que hiere las paredes, durante la masticacion y la deglucion.

Sensacion de quemadura en el fondo de la garganta.

Disminucion de la frecuencia de orinar.

Vértigos, por la mañana.

Indiferencia y abandono de sus negocios.

15. Sensacion de un cuerpo extraño, del grueso de una nuez, en la region inguinal izquierda, toda la mañana.

Rubicundez de la cara.

Hormigueo en la articulacion del pulgar de la mano izquierda.

Rigidez de las manos, como si hubiera apretado alguna cosa por mucho tiempo.

Dolor en la mano izquierda. Sed.

20. Menos dificultad en la deglucion de la saliva.

Orinas tardías, amarillo-rojizas y poco abundantes, aunque bebe mucho.

Dolor en las manos, que se aumenta por el tacto.

Ordinariamente bebe dos vasos de agua al acostarse y orina inmediatamente: el segundo dia ha bebido la misma cantidad y no ha orinado.

Punzadas en el lado derecho del cuello.

25. *Dia tercero.*—Sueño muy agitado; despierta con grandes risas.

Gusto muy pronunciado á cobre en la boca, con espuicion de sangre, durante veinte minutos.

No ha orinado desde el segundo dia á las cinco de la tarde.

Desde las cuatro de la tarde, le es imposible fijar las ideas en nada: repite mentalmente á cada instante un refran que

- le irrita mucho, sin poderlo separar de la imaginacion.
 Dolor en toda la boca.
30. Aparicion de dos granos en el carrillo izquierdo; desaparecen una hora despues.
- Dia cuarto.*—Fuerte presion en las partes laterales del pecho durante la noche, sin afectar á la respiracion.
 Sueño agitado; sueños de ocupaciones, estrañas á las de su vida ordinaria; despues, de pependencias.
 Lengua blanca y agrietada.
 Aturdimiento.
35. Cámaras mezcladas de mucosidades amarillas.
 Amargo de boca.
 Insensibilidad del paladar, con pérdida del gusto.
Dia quinto.—Sueño muy agitado.
 Grandes estremecimientos, durmiendo.
40. Dolor en la protuberancia frontal, á mediodia.
 No puede fijar la atencion en nada, ni aun en negocios muy importantes.

OCIMUM CANUM. (D. C.)

OCIM. *Ocimum incanescens*. (MART.) *Ocimum fluminense* (WELL.)
Labiadas. Alfavaca.

Planta hervácea muy aromática, con tallo derecho de 30 á 40 centímetros, muy pubescente, cuadrangular y escotado en sus ramos superiores. Hojas opuestas, ovales y finamente dentadas, colocadas sobre un peciolo de la misma longitud que el limbo de la hoja. Flores verticiladas, formando espigas terminales, y cada verticilo acompañado de dos bracteadas foliaceas. Cáliz con cinco divisiones, la superior oval, larga y entera; las cuatro restantes agudas. Corola tubulosa con su limbo bilabiado. El superior cortado en cuatro lóbulos, el inferior compuesto de uno solo, pero mucho mas largo. Cuatro estambres con sus filamentos libres; los dos mas cortos, están un poco encorvados en su base. Estilo bifido, raiz perpendicular, fibrosa y un poco ramosa.

Se emplean las hojas.

1. Entorpecimiento de la pierna derecha, durante dos horas.

- Orinas turbias, que depositan un sedimento blanco y aluminoso.
- Ardor al orinar.
- Orina amarilla azafranada.
5. Diarrea, muchos dias seguidos.
- Dolor calambroide en la region renal.
- Cólicos *nefríticos*, con vómitos violentos, cada cuarto de hora, y grandes dolores, que hacen lanzar gritos y prolongados gemidos.
- Orinas rojas, con sedimento latericio.
- Prurito en las mamas.
10. Infarto de las glándulas mamarias, con dolor en los mame-
lones, que arranca gritos al menor contacto.
- Dolor de compresion en las mamas, como el de las mujeres que lactan.
- Sueños de envenenamientos.
- Sueña con sus parientes, sns amigos y sus hijos.
- Puñazadas en los grandes lábios.
15. Hinchazon de la vulva.
- Procidencia de la vagina, hasta el punto de salir por la vulva.
- Orinas espesas, purulentas, con olor á almizcle.
- Infarto de las glándulas inguinales.
- Calor, hinchazon y sensibilidad escesiva del testículo izquierdo.

SOLANUM ARREBENTA. (Vell.)

SOL. AR. *Arrebenta cavallos.*

Este arbusto crece espontáneamente en las orillas de los caminos y en los desmontes de la provincia de Rio Janeiro. Tiene de alto de 80 centímetros á un metro, y sus ramos, que se ahorquillan regularmente, estan, durante la juventud de la planta, cubiertos de fuertes espinas, dirigidas de arriba á abajo. Las hojas, ligeramente pubescentes, son acorazonadas, con cinco lóbulos obtusos; los nervios presentan algunas espinas, irregularmente distribuidas. Las flores están colocadas en pedúnculos, que nacen de la axila de las hojas, por grupos de dos á tres.

Cáliz con cinco divisiones muy espinosas exteriormente; corola con otras cinco; cinco estambres y un estilo. Baya roja, carnosa, con dos celdillas, conteniendo cada una un gran número de semillas. Raíces fibrosas, que parten de un rizoma comun.

Se trituran las hojas.

4. Falta de apetito.

Ulceracion superficial debajo del mamelon izquierdo.

Vértigos, despues del baño.

Forúnculo doloroso en la axila derecha.

5. Dolor en el músculo gran pectoral.

Supuracion de los forúnculos.

Cefalalgia.

Fiebre ligera.

Inflamamiento del estómago.

10. Digestion dificil.

Erupcion urticaria.

Sueños de disputas y asesinatos.

Despierta asustada.

Boca pastosa, por la mañana.

13. Sed continua.

Se impacienta é irrita, hasta por bagatelas.

Rubicundez de la cara y aflujo de sangre al cerebro.

Calor fugaz por todo el cuerpo.

Palidez, con coloracion verdosa de la piel, despues de algunos días de experimentacion.

20. Hinchazon de las glándulas axilares.

Punzadas en las mamas.

Aparicion de un tumor glanduloso debajo de la mama derecha.

FIN.

Medicamentos que se hallan en la Farmácia homeopática especial de D. CESÁREO MARTIN SOMOLINOS, calle de las Infantas, núm. 26.—MADRID.

Absinthium.	Arum maculatum.
Acidum benzoicum.	Asa-fœtida.
Acidum citricum.	Asarum europeum.
Acidum fluoricum.	Asparagus.
Acidum hydrocyanicum.	Asterias.
Acidum muriaticum.	Athamanta.
Acidum nitricum.	Atriplex.
Acidum oxalicum.	Aurum fulminans.
Acidum phosphoricum.	Aurum foliatum.
Acidum sulfuricum.	Aurum muriaticum.
Acidum tartaricum.	Aurum sulfuricum.
Aconitum.	Barbus.
Actæa spicata.	Baryta carbonica.
Æthusa cynapium.	Baryta acetica.
Agaricus muscarius.	Barita muriatica.
Agnus castus.	Belladonna.
Allium sativum.	Berberis.
Aloe-spicata.	Bichromas potasæ.
Alumina.	Bismuthum.
Ambra grisea.	Blenorrhinum.
Ammonium carbonicum.	Boletus satanas.
Ammonium causticum.	Boras sodæ.
Ammoniacum guma.	Bovista.
Ammonium muriaticum.	Branca ursina.
Anacardium orientale.	Bromum.
Anagallis.	Bryonia alba.
Angelica archangelica.	Cainca.
Angustura spuria.	Caladium.
Angustura vera.	Calcarea acetica.
Anisum.	Calcarea carbonica.
Anisum stellatum.	Calcarea caustica.
Antimonium crudum.	Calcarea phosphorata.
Anthrokokali simplex.	Calendula officinalis.
Anthrokokali sulfurata.	Caltha palustris.
Apis mellifica.	Camphora.
Aquilegia vulgaris.	Cannabis sativa.
Argentum foliatum.	Cancer fluvialis.
Argentum nitricum.	Capsicum annuum.
Aristolochia clematidis.	Cantharis.
Armoracia.	Carbo animalis.
Arnica montana.	Carbo mineralis.
Arsenicum album.	Carbo vegetalis.
Arsenicum cetrinum.	Cardus benedictus.
Artemisia vulgaris.	Cardus Marianus.

Cascarilla.
Castoreum.
Castor equi.
Causticum.
Cedri resina.
Cedron.
Chamomilla.
Chelidonium majus.
Chenopodium glaucum.
China.
Chininum sulfuricum.
Chininum.
Chlorum.
Cicuta virosa.
Cimes lectularius.
Cina.
Cinamomum.
Cinnabaris.
Cistus canadensis.
Clematis erecta.
Coccus cacti.
Coccinella septempunctata.
Cocculus suberosus.
Cocculus palmatus.
Cochlearia armoracia.
Coffea arabiga.
Colchicum autumnale.
Colocynthis.
Conium maculatum.
Convulvulus arvensis.
Copaiva.
Corallia rubra.
Creosotum.
Croceus sativus.
Crotontiglium.
Cubeba.
Cuprum aceticum.
Cuprum arseniosum.
Cuprum carbonicum.
Cuprum metallicum.
Cuprum sulfuricum.
Cyclamen europeum.
Daphne indica.
Diadema aranea.
Dictamus albus.
Digitalis purpurea.
Diosma crenata.
Drosera rotundifolia.
Dulcamara.
Erysimum officinale.
Eugenia jambos.

Eupatorium.
Euphorbia cyparissias.
Euphorbia lathyris.
Euphorbia officinarum.
Euphrasia.
Evonymus europeus.
Farfara tusilago.
Ferrum aceticum.
Ferrum borusicum.
Ferrum carbonicum.
Ferrum magneticum.
Ferrum metallicum.
Ferrum muriaticum.
Ferrum sulfuricum.
Felix mas.
Fragaria vesca.
Galanga minor.
Galbanum.
Gin-seng.
Genista scoparia.
Gentiana lutea.
Granatum.
Graphites.
Gratiola.
Guaco.
Guayacum.
Gutti.
Hæmatoxylo.
Heleborus niger.
Hepar sulfuris.
Heracleum spondilium.
Hidrophovinum.
Homulus lupulus.
Hyosciamus.
Hypericum.
Ignatia amara.
Imperatoria.
Indigo.
Ipecacuanha.
Iris foetidissima.
Jalapa.
Jatropha-curcas.
Jodum.
Juncus effusus.
Juncus pilosus.
Kadmium sulfuretum.
Kali carbonicum.
Kali cloricum.
Kali hydriodicum.
Kali hidrobromicum.
Lachesis.

Lactuca virosa.
Lamium album.
Lauro cerasus.
Ledum palustre.
Liquor Lampadius.
Lobelia inflata.
Lonicera.
Lycopodium clavatum.
Magnesia carbonica.
Magnesia muriatica.
Magnesia sulfurica.
Manganum aceticum.
Manganum carbonicum.
Majorana.
Marchantia.
Margarita.
Meloe proscarabæus.
Menyanthes trifoliata.
Mephitis.
Mercurialis perenis.
Mercurius aceticus.
Mercurius bi-iodatus.
Mercurius corrosivus.
Mercurius cyanatus.
Mercurius dulcis.
Mercurius præcipitatus albus.
Mercurius proto-iodatus.
Mercurius nitricus.
Mercurius præcipitatus ruber.
Mercurius solubilis.
Mercurius vivus.
Mezereum.
Millefolium.
Millepedes.
Morphium.
Morphium aceticum.
Morphium sulfuricum.
Moschus.
Murex purpurea.
Natrium carbonicum.
Natrium muriaticum.
Natrium nitricum.
Natrium sulfuricum.
Nicolium carbonicum.
Nigella sativa.
Nitrum.
Nux juglans.
Nux moschata.
Nux vomica.
Oleum animale.
Oleum jecoris morhu

Oleum terebenthinæ.
Oleander.
Oniscus assellus.
Ononis spinosa.
Opium.
Paris quadrifolia.
Petroleum.
Petroselinum.
Phellandrium.
Phosphorus.
Pichurim.
Pimpinella alba.
Pinus silvestris.
Platina.
Platina muriatica.
Plumbum aceticum.
Plumbum metallicum.
Pœonia.
Poterium saxifraga.
Prunus spinosa.
Psoricum.
Pulsatilla.
Ranunculus acris.
Ranunculus flammula.
Ranunculus repens.
Ranunculus bulbosus.
Ranunculus sceleratus.
Raphanus sativus.
Ratanhia.
Rheum.
Rhododendron.
Rhus toxicodendron.
Rhus vernix.
Ruta graveolens.
Sabadilla.
Sabina.
Sambucus.
Sanguinaria canadensis.
Sasafras.
Sassaparrilla.
Scrophularia.
Secale cornutum.
Sedum acre.
Selenium.
Senna.
Senega.
Sepia officinalis.
Serpentaria.
Silicea.
Solanum lycopersicum.
Solanum mammosum.

Solanum nigrum.
Spigelia.
Spiræa ulmaria.
Spiritus nitri dulcis.
Spongia tosta.
Scilla maritima.
Stannum.
Staphisagria.
Stramonium.
Strontiana.
Strychninum.
Strychninum nitricum.
Sulfur.
Symphytum.
Tabacum.
Tanacetum.
Tarantula.
Taraxacum.
Tartarus emeticus.
Taxus baccata.
Terebentina.
Teucrium marum verum.
Thea chinensis.
Thuya occidentalis.

Theridion.
Tilia.
Tymus serpyllum.
Tonko.
Tusilago petasites.
Ulmus.
Urtica urens.
Uva ursi.
Vaccinum.
Valeriana.
Variola.
Veratrum album.
Verbascum.
Verbena.
Veronica.
Vinca.
Vincetoxicum.
Viola odorata.
Viola tricolor.
Zincum metallicum.
Zincum sulfuricum.
Zincum oxidatum.
Zingiber.

MEDICAMENTOS BRASILEÑOS.

Amphisbœna vermicularis.
Aristolochia milhomens.
Blatta americana.
Bufo sahytiensis.
Canna angustifolia.
Cannabis indica.
Cervus brasiliicus.
Convulvulus Duartinus.
Crotallus cascavella.
Delphinus amazonicus.
Elaps corallinus.
Elais guineensis.
Guano australis.
Hedysarum ildefonsianum.
Hippomane mancinella.
Hura brasiliensis.
Janipha manihot.
Jacaranda caroba.

Lepidium bonariense.
Melastoma Akermani.
Mimosa humilis.
Murure Leite.
Myristica sebifera.
Ocimum canum.
Panacea.
Paullinia pinnata.
Pediculus capitis.
Petiveria tetrandra.
Plumbago littoralis.
Resina itu.
Sedinha.
Solanum arrebenta.
Solanum oleraceum.
Solanum tuberosum ægrotans.
Spiggurus Martini.
Tradescantia diuretica.

Precios corrientes en la Farmacia Homeopática especial de D. CESAREO M. SOMOLINOS, calle de las Infantas, núm. 26, Madrid.

Cajas de bolsillo, con medicamentos en glóbulos, á la 6.^a, 12.^a ó 30.^a dilucion.

N.º 1.	24 tubos	60 rs.
N.º 2.	45 tubos	90 »
N.º 3.	60 tubos	120 »
N.º 4.	100 tubos	180 »
N.º 5.	150 tubos	250 »
N.º 6.	240 tubos	380 »

Cajas de reposicion en chagrin, tafilete, palosanto y caoba, con glóbulos á las mismas diluciones, en tubos de 35 milímetros de alto con 8 de ancho.

Núm. 1.	240 tubos con todos los medicamentos, de la 5. ^a edicion del <i>Manual de Jhar.</i>	640
Núm. 2.	480 tubos, con los mismos medicamentos, á dos diluciones.	1,100
Núm. 3.	720 tubos con las mismas sustancias, á tres diluciones.	1,500
Núm. 4.	383 tubos con todos los medicamentos usados hasta hoy, á la dilucion 12. ^a	960
Núm. 5.	Con tres divisiones, conteniendo la primera 766 tubos, con glóbulos de todos los medicamentos usados, á dos diluciones; la segunda, 50 frascos, de cabida de 180 á 200 gotas, con las tinturas madres mas usadas, y otros 50 con 100 granos cada uno de trituraciones; y la tercera, con seis frascos de glóbulos cristalizados, inertes, otros seis de alcohol anhidro, seis de tinturas de arnica y urtica urens, para las heridas, contusiones y quemaduras, y otros seis frascos de azúcar de leche durificada.	3,500

Objetos diversos, tomados aisladamente.

Un tubo de 35 milímetros de alto y 7 de ancho, lleno de glóbulos, á dilucion baja.	4
Un tubo de 4 centímetros de alto y 8 milim. de ancho.	6
Un tubo de 5 centímetros de alto y uno da ancho.	8
Los mismos tubos con glóbulos de altisimas diluciones, 8, 12 y 16 respectivamente.	

Un frasco de tintura madre, de 150 gotas.	12
Un frasco de dilucion, 400 gotas.	6
Un frasco de trituracion, 400 granos.	12
Glóbulos cristalizados de azúcar de leche pura, sin almidon, libra.	40
Glóbulos comunes, libra.	12
(Estos glóbulos comunes del comercio, no admitimos que puedan servir para la preparacion genuina de los medicamentos homeopáticos. Son generalmente de azúcar de caña, y tienen almidon.)	
Alcohol rectificado, libra.	10
Azúcar de leche purificada, en polvo finísimo, libra. . .	30
Azúcar de leche del comercio.	40
Tintura de árnica, preparada con el zumo de la planta fresca, libra.	60
Id. id., onza.	5
Tintura de urtica urens, para las quemaduras, onza. . .	5
Tafetan de árnica para las heridas recientes, cada 6 cen- tímetros en cuadro.	2
Tubos vacíos, de varios tamaños, tapados con corchos; desde 20 rs. hasta 60 rs. cada 100.	
Frascos con tapones de corcho ó de cristal, desde 400 gotas de cabida hasta una libra, y desde 60 reales cada 100, hasta 40 rs. cada frasco.	

PATOGENESIA BRASILEÑA: un tomo en 8.º, en Madrid.	20
En provincias, franco.	22
Cajas de chagrin, con los 36 medicamentos del Brasil, a la dilucion 12. ^a	80
Id. con los mismos medicamentos á las dilucio- nes 6. ^a y 30. ^a	130
Tomando el libro y la caja á la vez.	90
y 440 respectivamente.	
<i>Hering</i> , medicina doméstica, traduccion por el doctor Perez Vals: en Madrid.	20
En provincias.	24

